

**А.С. Рылов,  
А.А. Сапожников**

# **Домашняя работа по алгебре и началам анализа за 11 класс**

к учебнику «Алгебра и начала анализа: Учеб.  
для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /  
А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и  
др.;  
Под ред. А.Н. Колмогорова, — 12-е изд. —  
М.: Просвещение, 2002 г.»

## ГЛАВА III. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ

### § 7. Первообразная

#### 26. Определение первообразной

**326.** а)  $F(x) = x^5$  – первообразная для  $f(x) = 5x^4$  на  $\mathbb{R}$ ;

б)  $F(x) = x^{-3}$  – первообразная для  $f(x) = -3x^{-4}$  на  $(0; \infty)$ ;

в)  $F(x) = \frac{1}{7}x^7$  – первообразная для  $f(x) = x^6$  на  $\mathbb{R}$ ;

г)  $F(x) = -\frac{1}{6}x^{-6}$  – первообразная для  $f(x) = x^{-7}$  на  $(0; \infty)$ .

**327.** а)  $F'(x) = -\cos x \neq \cos x$ ,  $F(x) = 3 - \sin x$  на  $\mathbb{R}$ ;

б)  $F'(x) = (5 - x^4)' = -4x^3$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ , таким образом

$F(x) = 5 - x^4$  является первообразной для  $f(x) = -4x^3$  на  $\mathbb{R}$ ;

в)  $F'(x) = (\cos x - 4)' = -\sin x$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ , таким образом

$F(x) = \cos x - 4$  является первообразной для  $f(x) = -\sin x$  на  $\mathbb{R}$ ;

г)  $F'(x) = (x^{-2} + 2)' = -\frac{2}{x^3}$  для любого  $x \in (0; \infty)$ , таким образом

$F(x) = x^2 + 2$  не является первообразной для  $f(x) = \frac{1}{2x^3}$  на  $(0; \infty)$ .

**328.** а)  $F(x) = 3,5x + 10$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

б)  $F(x) = \sin x + 3$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

в)  $F(x) = x^2 + 2$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

г)  $F(x) = 8$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ .

**329.** а)  $F(x) = \cos x + 4$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

б)  $F(x) = 3 - \frac{1}{2}x^2$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

в)  $F(x) = 4(5 - x)$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

г)  $F(x) = 1 - \sin x$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ .

**330.** а)  $F'(x) = (\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x = \sin 2x$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ,

б)  $F'(x) = \frac{1}{2}(\cos 2x)' = \frac{1}{2}(-2)\sin 2x = -\sin 2x$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ,

в)  $F'(x) = (\sin 3x)' = 3\cos 3x$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

г)  $F'(x) = \left(3 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2}}$  для любого  $x \in (-\pi; \pi)$ .

**331.** а)  $F'(x) = \left(2x + \cos \frac{x}{2}\right)' = 2 - \frac{1}{2}\sin \frac{x}{2} = f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ ;

$$6) F'(x) = \left( \sqrt{4-x^2} \right)' = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2}} = f(x) \text{ для любого } x \in (-2;2);$$

$$b) F'(x) = \left( \frac{1}{x^2} \right)' = -\frac{2}{x^3} \text{ для любого } x \in (0;\infty);$$

$$r) F'(x) = 4(x\sqrt{x})' = 4\left( x^{\frac{3}{2}} \right)' = 4 \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} = 6\sqrt{x} = f(x) \text{ для любого } x \in (0;\infty).$$

**332.** a)  $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 8$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in R$ ;

б)  $F(x) = x + \cos x + 2$ , т.к.  $f(x) = \left( \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)^2 = 1 - \sin x$  на  $R$  и  $F'(x) = 1 - \sin x$  для любого  $x \in R$ ;

в)  $F(x) = x - 12$ , т.к.  $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$  на  $R$  и  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in R$ ;

г)  $F(x) = x^3 + x = 5$ , т.к.  $F'(x) = f(x)$  для любого  $x \in R$ .

**333.** а)  $F_1(x) = x^2 + 7$  и  $F_2(x) = x^2 + 13$  – первообразные для  $f(x) = 2x$  на  $R$ ;

б)  $F_1(x) = x + \cos x + 12$  и  $F_2(x) = x + \cos x - 1$  – первообразные для  $f(x) = 1 - \sin x$  на  $R$ ;

в)  $F_1(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3$  и  $F_2(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4$  – первообразные для  $f(x) = x^2$  на  $R$ ;

г)  $F_1(x) = \sin x + 2x + 2$  и  $F_2(x) = \sin x + 2x - 7$  – первообразные для  $f(x) = \cos x + 2$  на  $R$ .

**334.** а)  $g(x) = -\frac{1}{x}$  – первообразная для  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  на  $(-\infty;0) \cup (0;\infty)$ ,

$$f(x) = -\frac{2}{x^3} = h(x);$$

б)  $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x$  – первообразная для  $h(x) = x + \sin x$  на  $R$ ,

$$h'(x) = 1 + \cos x = g(x);$$

в)  $h(x) = \frac{x^2}{2} + 2x$  – первообразная для  $g(x) = x + 2$  на  $R$ ,  $g'(x) = 1 = f(x)$ ;

г)  $g(x) = 3x + 2\cos x$  – первообразная для  $f(x) = 3 - 2\sin x$  на  $R$ ,

$$f(x) = -2\cos x = h(x).$$

## 27. Основное свойство первообразной

- 335.** а)  $f(x) = 2 - x^4$ ; б)  $f(x) = x + \cos x$ ;  
 $F(x) = 2x - \frac{1}{5}x^5 + C$ ;  $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + \sin x + C$ ;  
 в)  $f(x) = 4x$ ;  $F(x) = 2x^2 + C$ ; г)  $f(x) = -3$ ;  $F(x) = -3x + C$ .
- 336.** а)  $f(x) = x^6$ ;  $F(x) = \frac{1}{7}x^7 + C$ ; б)  $f(x) = \frac{1}{x^3} - 2$ ;  $F(x) = -\frac{1}{2x^2} - 2x + C$ ;  
 в)  $f(x) = 1 - \frac{1}{x^4}$ ;  $F(x) = x + \frac{1}{3x^3} + C$ ; г)  $f(x) = x^5$ ;  $F(x) = \frac{1}{6}x^6 + C$ .
- 337.** а)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ,  $F(x) = -\frac{1}{x} + C$ ;  $F\left(\frac{1}{2}\right) = -2 + C = -12$ ,  $C = -10$ ;  
 $F(x) = -\frac{1}{x} - 10$ ;  
 б)  $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ ,  $F(x) = \operatorname{tg} x + C$ ;  $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + C = 0$ ,  $C = -1$ ;  $F(x) = \operatorname{tg} x - 1$ ;  
 в)  $f(x) = x^3$ ,  $F(x) = \frac{x^4}{4} + C$ ;  $F(-1) = \frac{1}{4} + C = 2$ ,  $C = 1\frac{3}{4}$ ;  $F(x) = \frac{1}{4}x^4 + 1\frac{3}{4}$ ;  
 г)  $f(x) = \sin x$ ,  $F(x) = -\cos x + C$ ;  $F(-\pi) = 1 + C$ ,  $C = -2$ ;  
 $F(x) = -\cos x - 2$  – первообразная для  $f(x) = \sin x$ ;  $F(-\pi) = -1$ .
- 338.** а)  $F'(x) = (\sin x)' - (x \cos x)' = \cos x - \cos x + x \sin x = f(x)$ ;  
 $F(x) = \sin x - x \cos x + C$  – общая первообразная;  
 б)  $F'(x) = \left( \sqrt{x^2 + 1} \right)' = \frac{1}{2} \left( x^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2)' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = f(x)$ ;  
 $F(x) = \sqrt{x^2 + 1} + C$  – общая первообразная;  
 в)  $F'(x) = (\cos x)' + (x \sin x)' = -\sin x + \sin x + x \cos x = x \cos x = f(x)$ ;  
 $F(x) = \cos x + x \sin x + C$  – общая первообразная;  
 г)  $F'(x) = x' - \left( \frac{1}{x} \right)' = 1 + \frac{1}{x^2} = \frac{1+x^2}{x^2} = f(x)$ ;  
 $F(x) = x - \frac{1}{x} + C$  – общая первообразная.
- 339.** а)  $f(x) = 2 \cos x$ ,  $F(x) = 2 \sin x + C$ ;  $F\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2 + C = 1$ ,  $C = 3$ ;  
 $F(x) = 2 \sin x + 3$  – искомая первообразная;  
 б)  $f(x) = 1 - x^2$ ,  $F(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + C$ ;  $F(-3) = -3 + 9 + C = 6 + C = 9$ ,  $C = 3$ ;  
 $F(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + 3$  – искомая первообразная;

$$b) f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right), F(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + C; F\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\pi + C = 1 + C = -1, C = -2;$$

$$F(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 2 - \text{искомая первообразная};$$

$$r) f(x) = \frac{1}{x^4}, F(x) = -\frac{1}{3x^3} + C; F\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{8}{3} + C = 3, C = 5\frac{2}{3};$$

$$F(x) = -\frac{1}{3x^3} + 5\frac{2}{3} - \text{искомая первообразная}.$$

**340. a)**  $f(x) = 2 - \sin x, F_1(x) = 2x + \cos x$  и  $F_2(x) = 2x + \cos x + C$ ;  
 $F_2(x) - F_1(x) = C = 4$ ;  $F_1(x) = 2x + \cos x$  и  $F_2(x) = 2x + \cos x + 4$  – две  
 искомые первообразные;

$$b) f(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, F_1(x) = \operatorname{tg} x + C \text{ и } F_2(x) = \operatorname{tg} x; F_1(x) - F_2(x) = C = 1;$$

$F_1(x) = \operatorname{tg} x + 1$  и  $F_2 = \operatorname{tg} x$  – две искомые первообразные;

$$b) f(x) = \sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} = -\cos x, F_1(x) = -\sin x \text{ и } F_2(x) = -\sin x + C;$$

$$F_2(x) - F_1(x) = C = \frac{1}{2};$$

$F_1(x) = -\sin x$  и  $F_2(x) = -\sin x + 0,5$  – две искомые первообразные;

$$r) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, F_1(x) = 2\sqrt{x} \text{ и } F_2(x) = 2\sqrt{x} + C; F_2(x) - F_1(x) = C = 2;$$

$F_1(x) = 2\sqrt{x}$  и  $F_2(x) = 2\sqrt{x} + 2$  – две искомые первообразные.

$$\text{341. a)} a(t) = -2t, v(t) = -t^2 + C_1, x(t) = -\frac{t^3}{3} + C_1t + C_2;$$

$$v(1) = -1 + C_1 = 2, C_1 = 3; x(t) = -\frac{t^3}{3} + 3t + C_2,$$

$$x(1) = -\frac{1}{3} + 3 + C_2 = 4, C_2 = 1\frac{1}{3}; x(t) = -\frac{t^3}{3} + 3t + \frac{4}{3};$$

$$b) a(t) = \sin t, v(t) = -\cos t + C_1, x(t) = -\sin t + C_1t + C_2; v\left(\frac{\pi}{2}\right)' = C_1 = 1;$$

$$x(t) = -\sin t + t + C_2, x\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 + \frac{\pi}{2} + C_2 = 2, C_2 = 3 - \frac{\pi}{2}; x(t) = -\sin t + t + 3 - \frac{\pi}{2};$$

$$b) a(t) = 6t, v(t) = 3t^2 + C_1, x(t) = t^3 + C_1t + C_2; v(0) = C_1 = 1;$$

$$x(t) = t^3 + t + C_2, x(0) = C_2 = 3; x(t) = t^3 + t + 3;$$

$$r) a(t) = \cos t, v(t) = \sin t + C_1, x(t) = -\cos t + C_1t + C_2; v(\pi) = C_1 = 0;$$

$$x(t) = -\cos t + C_2, x(\pi) = 1 + C_2 = 1, C_2 = 0; x(t) = -\cos t.$$

## 28. Три правила нахождения первообразных

**342.** а)  $f(x) = 2 - x^3 + \frac{1}{x^3}$ ; поэтому

$$F(x) = 2x - \frac{x^4}{4} - \frac{1}{2x^2} + C \text{ — общий вид первообразных для } f(x);$$

б)  $f(x) = x - \frac{2}{x^5} + \cos x;$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^4} + \sin x + C \text{ — общий вид первообразных для } f(x);$$

в)  $f(x) = \frac{1}{x^2} - \sin x;$

$$F(x) = -\frac{1}{x} + \cos x + C \text{ — общий вид первообразных для } f(x);$$

г)  $f(x) = 5x^2 - 1;$

$$F(x) = \frac{5}{3}x^3 - x + C \text{ — общий вид первообразных для } f(x).$$

**343.** а)  $f(x) = (2x - 3)^5$ ;  $F(x) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} (2x - 3)^6 + C = \frac{1}{12} (2x - 3)^6 + C$  — общий вид первообразных для  $f(x)$ ;

б)  $f(x) = 3\sin 2x$ ;  $F(x) = \frac{1}{2} \cdot (-3) \cdot \cos 2x + C = -1,5 \cos 2x + C$  — общий вид первообразных для  $f(x)$ ;

в)  $f(x) = (4 - 5x)^7$ ;  $F(x) = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{8} (4 - 5x)^8 + C = -\frac{1}{40} (4 - 5x)^8 + C$  — общий вид первообразных для  $f(x)$ ;

г)  $f(x) = -\frac{1}{3} \cos\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{4}\right)$ ;  $F(x) = -\frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \sin\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + C = -\sin\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + C$  — общий вид первообразных для  $f(x)$ .

**344.** а)  $f(x) = \frac{3}{(4 - 15x)^4}$ ;  $F(x) = -\frac{1}{15} \cdot \left( -\frac{1}{(4 - 15x)^3} \right) + C = \frac{1}{15(4 - 15x)^3} + C$  — общий вид первообразных для  $f(x)$ ;

б)  $f(x) = \frac{2}{\cos^2\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}$ ;

$$F(x) = -2 \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + C \text{ — общий вид первообразных для } f(x);$$

в)  $f(x) = \frac{4}{(3x-1)^2}$ ;  $F(x) = \frac{1}{3} \cdot \left( -\frac{4}{(3x-1)} \right) + C = -\frac{4}{3(3x-1)} + C$  – общий вид первообразных для  $f(x)$ ;  
 г)  $f(x) = -\frac{2}{x^5} + \frac{1}{\cos^2(3x-1)}$ ;  
 $F(x) = \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{3} \operatorname{tg}(3x-1) + C$  – общий вид первообразных для  $f(x)$ .

**345.** а)  $f(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$ ;  $F(x) = 2x^2 - \frac{1}{x} + C$  – общая первообразная;  
 $F(-1) = 2 + 1 + C = 4$ ,  $C = 1$ ;  $F(x) = 2x^2 - \frac{1}{x} + 1$  – искомая первообразная;  
 б)  $f(x) = x^3 + 2$ ;  $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x + C$  – общая первообразная;

$F(2) = 4 + 4 + C = 15$ ,  $C = 7$ ;  $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x + 7$  – искомая первообразная;  
 в)  $f(x) = 1 - 2x$ ;  $F(x) = x - x^2 + C$  – общая первообразная;  
 $F(3) = 3 - 9 + C = 2$ ,  $C = 8$ ;  $F(x) = x - x^2 + 8$  – искомая первообразная;

г)  $f(x) = \frac{1}{x^3} - 10x^4 + 3$ ;  $F(x) = -\frac{1}{2x^2} - 2x^5 + 3x + C$  – общая первообразная;  
 $F(1) = -\frac{1}{2} - 2 + 3 + C = 5$ ;  $C = 4 \frac{1}{2}$ ;  
 $F(x) = -\frac{1}{2x^2} - 2x^5 + 3x + 4,5$  – искомая первообразная.

**346.** а)  $f(x) = 1 - \cos 3x + 2 \sin \left( \frac{\pi}{3} - x \right)$ ;  
 $F(x) = x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2 \cos \left( \frac{\pi}{3} - x \right) + C$  – общая первообразная;

б)  $f(x) = \frac{1}{\sin^2 4x} + \frac{1}{\sqrt{2-x}} - 3x^2$ ;  
 $F(x) = -\frac{1}{4} \operatorname{ctg} 4x - 2\sqrt{2-x} - x^3 + C$  – общая первообразная;

в)  $f(x) = \frac{2}{\cos^2(3x+1)} - 3 \sin(4-x) + 2x$ ;  
 $F(x) = \frac{2}{3} \operatorname{tg}(3x+1) - 3 \cos(4-x) + x^2 + C$  – общая первообразная;

г)  $f(x) = \frac{1}{(3-2x)^3} + \frac{3}{\sqrt{5x-2}} - 2 \cos \left( \frac{\pi}{4} - x \right)$ ;  
 $F(x) = \frac{1}{4(3-2x)^2} + \frac{6}{5} \sqrt{5x-2} + 2 \sin \left( \frac{\pi}{4} - x \right) + C$  – общая первообразная.

- 347.** а)  $f(x) = 2x + 1$ ;  $F(x) = x^2 + x + C$  – общая первообразная;  
 $F(0) = 0$ :  $C = 0$ ;  $F(x) = x^2 + x$  – искомая первообразная;  
б)  $f(x) = 3x^2 - 2x$ ;  $F(x) = x^3 - x^2 + C$  – общая первообразная  
 $F(1) = 4$ :  $1 - 1 + C = 4$ ,  $C = 4$ ;  $F(x) = x^3 - x^2 + 4$  – искомая первообразная;  
в)  $f(x) = x + 2$ ;  $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$  – общая первообразная;  
 $F(1) = 3$ :  $\frac{1}{2} + 2 + C = 3$ ,  $C = \frac{1}{2}$ ;  $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{1}{2}$  – искомая первообразная;  
г)  $f(x) = -x^2 + 3x$ ;  $F(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + C$  – общая первообразная;  
 $F(2) = -1$ :  $-\frac{8}{3} + 6 + C = -1$ ,  $C = -4\frac{1}{3}$ ;  $F(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4\frac{1}{3}$  – искомая первообразная.

**348.**  $v(t) = t^2 + 2t - 1$ , т.к.  $v(t) = x'(t)$ , то  
 $x(t) = \frac{t^3}{3} + t^2 - t + C$ ;  $x(0) = 0$ :  $C = 0$ ;  $x(t) = \frac{t^3}{3} + t^2 - t$  – искомая функция.

**349.**  $v(t) = 2\cos \frac{t}{2}$ ;  $x(t) = 4\sin \frac{t}{2} + C$ ;  
 $x\left(\frac{\pi}{3}\right) = 4$ :  $4\sin \frac{\pi}{6} + C = 4$ ,  $2 + C = 4$ ,  $C = 2$ ;  $x(t) = 4\sin \frac{t}{2} + 2$ .

**350.**  $a(t) = 12t^2 + 4$ ; т.к.  $a(t) = v'(t)$ , то  $v(t) = 4t^3 + 4t + C_1$ ;  
 $v(1) = 10$ :  $4 + 4 + C_1 = 10$ ;  $C_1 = 2$ ;  $v(t) = 4t^3 + 4t + 2$ ;  $x(t) = t^4 + 2t^2 + 2t + C_2$ ;  
 $x(1) = 12$ :  $1 + 2 + 2 + C_2 = 12$ ,  $C_2 = 7$ ;  $x(t) = t^4 + 2t^2 + 2t + 7$  – искомая функция.

**351.** а)  $F = ma$ , т.о.  $a(t) = \frac{F(t)}{m} = \frac{6 - 9t}{3} = 2 - 3t$ ;  $v(t) = 2t - \frac{3}{2}t^2 + C_1$ ;  
 $v(1) = 2 - \frac{3}{2} + C_1 = 4$ ;  $C_1 = 3,5$ ;  $x(t) = t^2 - \frac{t^3}{2} + 3,5t + C_2$ ;  $x(1) = -5 \cdot 1 - 0,5 + 3,5 +$   
 $+ C_2 = -5$ ,  $C_2 = -9$ ;  $x(t) = t^2 - \frac{t^3}{2} + 3,5t - 9$  – искомая функция;

б)  $F = ma$ , т.о.  $a(t) = \frac{F(t)}{m} = \frac{14\sin t}{7} = 2\sin t$ ;  $v(t) = -2\cos t + C_1$ ;  
 $V(\pi) = 2 + C_1 = 2$ ,  $C_1 = 0$ ;  $v(t) = -2\cos t$ ;  $x(t) = -2\sin t + C_2$ ;  $x(\pi) = C_2 = 3$ ;  
 $x(t) = -2\sin t + 3$  – искомая функция;

в)  $F = ma$ , т.о.  $a(t) = \frac{F(t)}{m} = \frac{25\cos t}{5} = 5\cos t$ ;  
 $v(t) = 5\sin t + C_1$ ;  $v\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5 + C_1 = 2$ ,  $C_1 = -3$ ;

$$v(t) = 5\sin t - 3; x(t) = -5\cos t - 3t + C_2; x\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{3\pi}{2} + C_2 = 4, C_2 = 4 + \frac{3\pi}{2};$$

$$x(t) = -5\cos t - 3t + 4 + \frac{3\pi}{2} \text{ — искомая функция;}$$

$$\text{г) } F = ma, \text{ т.о. } a(t) = \frac{F(t)}{m} = \frac{8t+8}{4} = 2t+2;$$

$$v(t) = t^2 + 2t + C_1; v(2) = 4 + 4 + C_1 = 9, C_1 = 1;$$

$$v(t) = t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2; x(t) = \frac{(t+1)^3}{3} + C_2; x(2) = 9 + C_2 = 7, C_2 = -2;$$

$$x(t) = \frac{(t+1)^3}{3} - 2 \text{ — искомая функция.}$$

**352.** а)  $f(x) = 3x^2 - 2x + 4; F(x) = x^3 - x^2 + 4x + C$  — общая первообразная  $F_1(-1) = 1: -1 - 1 - 4 + C_1 = 1, C_1 = 7;$

$$F_1(x) = x^3 - x^2 + 4x + 7 \text{ — первая первообразная;}$$

$$F_2(0) = 3; C_2 = 3; F_2(x) = x^3 - x^2 + 4x + 3 \text{ — вторая первообразная, } F_1(x) - F_2(x) = 4 \text{ — следовательно график } F_1(x) \text{ расположен выше графика } F_2(x);$$

б)  $f(x) = 4x - 6x^2 + 1; F(x) = 2x^2 - 2x^3 + x + C$  — общая первообразная  $F_1(0) = 2; C_1 = 2; F_1(x) = 2x^2 - 2x^3 + x + 2$  — первая первообразная,

$$F_2(1) = 3: 2 - 2 + 1 + C_2 = 3, C_2 = 2;$$

$$F_2(x) = 2x^2 - 2x^3 + x + 2 \text{ — вторая первообразная т.к.}$$

$F_2(x) - F_1(x) = 0$  — отсюда следует, что графики  $F_1(x)$  и  $F_2(x)$  совпадают;

в)  $f(x) = 4x - x^3; F(x) = 2x^2 - \frac{x^4}{4} + C$  — общая первообразная;

$$F_1(2) = 1: 2 \cdot 4 - 4 + C_1 = 1, C_1 = -3; F_1(x) = 2x^2 - \frac{x^4}{4} - 3 \text{ — первая первообразная;}$$

$$F_2(-2) = 3: 2 \cdot 4 - 4 + C_2 = 3, C_2 = -1;$$

$$F_2(x) = 2x^2 - \frac{x^4}{4} - 1 \text{ — вторая первообразная;}$$

$$F_1(x) - F_2(x) = -2 \text{ — таким образом график } F_1(x) \text{ расположен ниже графика } F_2(x);$$

г)  $f(x) = (2x+1)^2; F(x) = \frac{(2x+1)^3}{6} + C$  — общая первообразная;

$$F_1(-3) = -1: -\frac{125}{6} + C_1 = -1, C_1 = 19\frac{5}{6};$$

$$F_1(x) = \frac{(2x+1)^3}{6} + 19\frac{5}{6} \text{ — первая первообразная;}$$

$$F_2(1) = 6 \frac{1}{3} : \frac{27}{6} + C_2 = 6 \frac{1}{3}, C_2 = 1 \frac{5}{6};$$

$$F_2(x) = \frac{(2x+1)^3}{6} + 1 \frac{5}{6} - \text{вторая первообразная};$$

$F_1(x) - F_2(x) = 18$  – отсюда следует, что график  $F_1(x)$  расположен выше графика  $F_2(x)$ .

## § 8. Интеграл

### 29. Площадь криволинейной трапеции

**353.** а)  $y(x) = x^2$ ;  $Y(x) = \frac{x^3}{3}$ ;  $S = Y(3) - Y(0) = \frac{3^3}{3} = 9$ ;

б)  $y = \cos x$ ;  $Y = \sin x$ ;  $S = Y\left(\frac{\pi}{2}\right) - Y(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin 0 = 1$ ;

в)  $y = \sin x$ ;  $Y(x) = -\cos x$ ;  $S = Y(\pi) - Y(0) = 1 + 1 = 2$ ;

г)  $y(x) = -\frac{1}{x}$  – первообразная для функции  $y = \frac{1}{x^2}$ ;

$$S = y(2) - y(1) = -\frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2}.$$

**354.** а)  $Y(x) = \frac{x^4}{4} + x$  – первообразная для функции  $y = x^3 + 1$ ;

$$S = Y(2) - Y(0) = \frac{2^4}{4} + 2 = 6;$$

б)  $Y(x) = x - 2\cos x$  – первообразная для функции  $y = 1 + 2\sin x$ ;

$$S = Y\left(\frac{\pi}{2}\right) - Y(0) = \frac{\pi}{2} - 2\cos\frac{\pi}{2} + 2\cos 0 = \frac{\pi}{2} + 2;$$

в)  $Y(x) = 4x - \frac{x^3}{3}$  – первообразная для функции  $y = 4 - x^2$ ;

$$y = 0 \text{ при } x = \pm 2, \text{ поэтому } S = Y(2) - Y(-2) = 2 \cdot \left(4 \cdot 2 - \frac{2^3}{3}\right) = 10 \frac{2}{3};$$

г)  $Y(x) = x + \frac{1}{2}\sin x$  – первообразная для функции  $y = 1 + \frac{1}{2}\cos x$ ;

$$S = Y\left(\frac{\pi}{2}\right) - Y\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}\right) = 1 + \pi.$$

**355.** а)  $Y(x) = \frac{(x+2)^3}{3}$  – первообразная для функции  $y = (x+2)^2$ ;

$$y=0 \text{ при } x=2; x = -2 \text{ при } y = 4, \text{ поэтому } S = Y(0) - Y(-2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3};$$

$$6) Y(x) = -\frac{1}{x+1} + x \text{ — первообразная для функции } y = \frac{1}{(x+1)^2} + 1;$$

$$S = Y(2) - Y(0) = -\frac{1}{2+1} + 2 + 1 = 2\frac{2}{3};$$

$$b) Y(x) = x^2 - \frac{x^3}{3} — первообразная для функции y = 2x - x^2; \text{ функция}$$

$$y = 0 \text{ при } x = 0, x = 2, \text{ поэтому } S = Y(2) - Y(0) = 4 - \frac{8}{3} = 1\frac{1}{3};$$

$$g) Y(x) = -\frac{(x-1)^4}{4} — первообразная для функции y = -(x-1)^3;$$

$$\text{ограничена на } [0;1] \rightarrow S = Y(1) - Y(0) = \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4}.$$

**356.**  $y = 3\sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right);$  a)  $Y(x) = -3\cos\left(x + \frac{3\pi}{4}\right);$

$$S = Y\left(\frac{3\pi}{4}\right) - Y\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -3\cos\frac{3\pi}{2} + 3\cos0 = 3; y = 2\cos2x; b) y(x) = \sin2x;$$

$$S = y\left(\frac{\pi}{4}\right) - y\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{2} - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2; y = \sin x - \frac{1}{2}; b) y(x) = -\cos x - \frac{1}{2}x;$$

$$S = y\left(\frac{5\pi}{6}\right) - y\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{5\pi}{6} - \frac{5\pi}{12} + \cos\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}; y = 1 - \cos x;$$

$$g) y(x) = x - \sin x; S = y\left(\frac{\pi}{2}\right) - y\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \sin\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi - 2.$$

### 30. Формула Ньютона – Лейбница

**357.**

$$a) \int_{-1}^2 x^4 dx = \frac{x^5}{5} \Big|_{-1}^2 = \frac{32}{5} + \frac{1}{5} = \frac{33}{5} = 6\frac{3}{5};$$

$$6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin\frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1;$$

$$b) \int_1^3 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_1^3 = \frac{81}{4} - \frac{1}{4} = \frac{80}{4} = 20;$$

$$g) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \operatorname{tg}\frac{\pi}{4} - \operatorname{tg}0 = 1 - 0 = 1.$$

$$358. a) \int_1^2 \frac{dx}{(2x+1)^2} = -\frac{1}{2(2x+1)} \Big|_1^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15};$$

$$6) \int_0^{\pi} 3 \cos \frac{x}{2} dx = 6 \sin \frac{x}{2} \Big|_0^{\pi} = 6 \sin \frac{\pi}{2} - 6 \sin 0 = 6 - 0 = 6;$$

$$b) \int_1^{10} \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0,9;$$

$$r) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} \left( \cos \pi - \cos \frac{\pi}{2} \right) = \left( -\frac{1}{2} \right) (-1) = \frac{1}{2}.$$

$$359. a) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1; \int_0^1 dx = x \Big|_0^1 = 1; \text{т.к. } 1 = 1, \text{ то } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x} = \int_0^1 dx;$$

$$6) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = -\cos \frac{\pi}{3} + \cos 0 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$\int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} = 2\sqrt{\frac{1}{4}} - 2\sqrt{\frac{1}{16}} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}; \text{ т.к. } \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \text{ то } \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x dx = \int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt{x}},$$

$$b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1; \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 1 - 0 = 1;$$

$$\text{т.к. } 1 = 1, \text{ то } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} x^2 dx;$$

$$r) \int_0^1 (2x+1) dx = x^2 + x \Big|_0^1 = 2; \int_0^2 (x^3 - 1) dx = \frac{x^4}{4} - x \Big|_0^2 = 4 - 2 = 2; \text{ т.к. } 2 = 2, \text{ то}$$


$$\int_0^1 (2x+1) dx = \int_0^2 (x^3 - 1) dx.$$

$$360. a) S_{ACODE} = S_{ACO} + S_{OED} = 2S_{OED}$$


т.к. функция  $y = x^4$  четная;

$$S_{ACODE} = 2 \int_0^1 x^4 dx = 2 \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{2}{5};$$

$$b) S_{AFEO} = S_{ACDE} - S_{ACODE} = 2 - \frac{2}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5};$$



b)  $S_{AOCDE} = \int_0^4 (x^2 - 4x + 5) dx = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 5x \Big|_0^4 = \frac{64}{3} - 32 + 20 = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3};$





r)  $S_{AED} = S_{AOCD} - S_{AOCDE} = 20 - 9\frac{1}{3} = 10\frac{2}{3}.$


**361.**

a)  $S_{ABO} = \int_0^1 (1-x^3) dx = x - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4};$


б)  $S_{ABC} = S_{ADEC} - S_{BDEC} = 2 - \frac{1}{4} + 2 - \frac{1}{4} = 4 - 2 =$   
 $= \int (2-x^3) dx - 2 \cdot 1 = 2x - \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^1 - 2 = 2;$



в)  $S_{ABCD} = \int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x) dx = -\frac{x^3}{3} - 2x^2 \Big|_{-3}^{-1} =$   
 $= \left( \frac{1}{3} - 2 \right) + (-9 + 18) = 7\frac{1}{3};$



г)  $S_{ABCDE} = S_{ANMDE} - S_{BNMC} =$   
 $= \int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x) dx - 2 = 7\frac{1}{3} - 2 = 5\frac{1}{3};$



**362.** а)  $\int_{-\pi}^{2\pi} \sin \frac{x}{3} dx = -3 \cos \frac{x}{3} \Big|_{-\pi}^{2\pi} = -3 \left( \cos \frac{2\pi}{3} - \cos \left( \frac{\pi}{3} \right) \right) = 6 \cos \frac{\pi}{3} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3;$

б)  $\int_{-2}^2 \frac{dx}{\sqrt{2x+5}} = \sqrt{2x+5} \Big|_{-2}^2 = \sqrt{9} - 1 = 2; \text{ б) } \int_0^{3\pi} \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{9}} = 9 \operatorname{tg} \frac{x}{9} \Big|_0^{3\pi} = 9 \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = 9\sqrt{3};$

г)  $\int_{-2}^6 \frac{dx}{\sqrt{x+3}} = 2\sqrt{x+3} \Big|_{-2}^6 = 2(\sqrt{9} - 1) = 4.$

**363.** a)  $\int_0^{\frac{2\pi}{3}} \left( \sin \frac{x}{4} + \cos \frac{x}{4} \right)^2 dx = \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \left( 1 + \sin \frac{x}{2} \right) dx = \left( x - 2 \cos \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{2\pi}{3}} =$   
 $= \left( \frac{2\pi}{3} - 2 \cos \frac{\pi}{3} \right) + 2 \cos 0 = \frac{2\pi}{3} - 1 + 2 = \frac{2\pi}{3} + 1;$

б)  $\int_0^2 (1+2x)^3 dx = \frac{(1+2x)^4}{8} \Big|_0^2 = \frac{5^4}{8} - \frac{1}{8} = \frac{624}{8} = 78;$

в)  $\int_0^{\frac{\pi}{12}} (1+\cos 2x) dx = \left( x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{12}} = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{4};$

г)  $\int_1^4 \left( x + \frac{\sqrt{x}}{x} \right) dx = \left( \frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x} \right) \Big|_1^4 = \frac{16}{2} + 2\sqrt{4} - \frac{1}{2} - 2 = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}.$

**364.**

а)  $S_{AED} = S_{BECD} - S_{ABCD} =$

$$= 1 \cdot 8 - \int_1^2 x^3 dx = 8 - \frac{x^4}{4} \Big|_1^2 = 8 - 3\frac{3}{4} = 4\frac{1}{4};$$





б)  $S_{AED} = S_{ABCDE} - S_{ABCD} =$

$$= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} 2 \cos x dx - 1 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2 \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} - \frac{2\pi}{3} = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3};$$

в)  $x^2 - 2x + 4 = 3, x^2 - 2x + 1 = 0, (x-1)^2 = 0, x = 1;$

$$S_{ABE} = S_{ACDE} - S_{BCDE} = \int_{-1}^1 (x^2 - 2x + 4) dx - 2 \cdot 3 =$$
  
 $= \left( \frac{x^3}{3} - x^2 + 4x \right) \Big|_{-1}^1 - 6 = 8\frac{2}{3} - 6 = 2\frac{2}{3};$

$$\text{г) } S_{ADE} = S_{ABCDE} - S_{ABCD} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sin x dx - \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \right) =$$
  
 $= -\cos x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} - \frac{\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$



**365.**

a)  $4x - x^2 = 4 - x$ ;  $x^2 - 5x + 4 = 0$ ;  $x = 4$ ;  $x = 1$ ;

$S_{ABCD} = S_{ABCD} - S_{ABC} =$

$$= \int_1^4 (4x - x^2) dx - \frac{3 \cdot 3}{2} = \left( 2x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^4 - \frac{9}{2} =$$

$$= \left( 32 - \frac{64}{3} \right) - \left( 2 - \frac{1}{3} \right) - \frac{9}{2} = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2};$$

б)  $\frac{16}{x^2} = 2x$ ;  $x^3 = 8$ ;  $x = 2$ ;

$$S_{OADC} = S_{OAB} + S_{ABCD} = \frac{2 \cdot 4}{2} + \int_2^4 \frac{16}{x^2} dx =$$

$$= 4 - \frac{16}{x} \Big|_2^4 = 4 - 4 + 8 = 8;$$

$$S_{ADE} = S_{OEC} - S_{OADC} = \frac{4 \cdot 8}{2} - 8 = 8;$$

в)  $x^2 = 2x$  при  $x = 0; 2$ .

$$S_{OAB} = S_{OAC} - S_{OBAC} = \frac{2 \cdot 4}{2} - \int_0^2 x^2 dx =$$

$$= 4 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3};$$

г)  $6 + x - x^2 = 6 - 2x$ ;

$$x^2 - 3x = 0$$
;  $x = 0$ ;  $x = 3$ .

$$S_{ABC} = S_{OABC} - S_{AOC} = \int_0^3 (6 + x - x^2) dx -$$

$$- \frac{3 \cdot 6}{2} = \left( 6x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 - 9 = 18 + \frac{9}{2} - 9 - 9 = \frac{9}{2}.$$






**366.**

a)  $x^2 - 4x + 4 = 4 - x^2$ ;

$$2x^2 - 4x = 0$$
;  $x^2 - 2x = 0$ ;  $x = 2$ ;  $x = 0$ ;

$$S_{ACBD} = S_{AOBD} - S_{AOBC} = \int_0^2 (4 - x^2) dx -$$

$$- \int_0^2 (x^2 - 4x + 4) dx = \int_0^2 (4x - 2x^2) dx = \left( 2x^2 - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^2 =$$




$$= 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}.$$

6)  $x^2 - 2x + 2 = 2 + 6x - x^2$   
 $2x^2 - 8x = 0; x^2 - 4x = 0; x = 0; x = 4.$

$$S_{ABCE} = S_{OABCD} - S_{OAEC}$$

$$= \int (8x - 2x^2) dx = \left( 4x^2 - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^4$$


$$= 4 \cdot 16 - \frac{128}{3} = \frac{64}{3} = 21\frac{1}{3}.$$



b)  $x^2 = 2x - x^2; x^2 - x = 0; x = 0; x = 1;$

$$S_{OAB} = S_{OABD} - S_{OBD} =$$


$$= \int_0^1 (2x - 2x^2) dx = \left( x^2 - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$



г)  $x^2 = x^3; x^2(1-x) = 0; x = 0; x = 1;$

$$S_{OAB} = S_{OAC} - S_{OCAB} = \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x^3 dx =$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left( \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$




**367.**

$$y = 8x - 2x^2; x_B = \frac{-8}{-2} = 2; y_B = 16 - 8 = 8.$$

точка A(2;8);  $y'(x) = 8 - 4x$ ,  $y'(2) = 0$ ;  
 $y_{\text{кас}} = y(2) + y'(2)(x-2) = 8$  – уравнение касательной;

$$S_{ODA} = S_{ODAC} - S_{OAC} = 2 \cdot 8 - \int_0^2 (8x - 2x^2) dx =$$


$$= 16 - \left( 4x^2 - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 16 - 16 + \frac{2 \cdot 8}{3} = 5\frac{1}{3}.$$



**368.**  $f(x) = 8 - 0,5x^2$ ;  $f'(x) = -x$ ,  $f'(-2) = 2$ ;  $f(-2) = 6$ ;

$y(x) = f(-2) + 2(x+2) = 2x + 10$  – уравнение касательной;  $y(1) = 2 \cdot 1 + 10 = 12$ ;

$$S_{CDE} = S_{FCDB} - S_{FCEB} = 3 \cdot 6 + \frac{3 \cdot 6}{2} - \int_{-2}^1 (8 - 0,5x^2) dx = 27 - \left( 8x - \frac{0,5x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 = \\ = 27 - \left( 8 - \frac{1}{6} \right) + \left( -16 + \frac{8}{6} \right) = 28,5 - 24 = 4,5.$$



**369. a)**  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$  и  $\int_a^b g(x)dx = G(b) - G(a)$ ,

где  $F(x)$  и  $G(x)$  – первообразные на  $[a;b]$  для  $f(x)$  и  $g(x)$  соответственно;

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x) + g(x))dx &= (F(x) + G(x)) \Big|_a^b = F(b) + G(b) - F(a) - G(a) = \\ &= [F(b) - F(a)] + [G(b) - G(a)] = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx; \end{aligned}$$

б)  $k \int_a^b f(x)dx = k[F(b) - F(a)]$ , где  $F(x)$  – первообразная для  $f(x)$  на  $[a;b]$ ;

$$\int_a^b kf(x)dx = [kf(x)] \Big|_a^b = k[F(b) - F(a)] = k \int_a^b f(x)dx, \text{ где } k = \text{const.}$$

### 31. Применение интеграла

**370. а)**  $V(x) = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \pi \left( \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x \right) \Big|_0^1 = \\ = \pi \left( \frac{1}{5} + \frac{2}{3} + 1 \right) = 1\frac{13}{15}\pi;$

б)  $V(x) = \pi \int_1^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_1^4 = \pi \left( 8 - \frac{1}{2} \right) = 7\frac{1}{2}\pi;$

в)  $V(x) = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}; \text{ г) } y = 1 - x^2 = 0; x^2 = 1; x = \pm 1;$


$$\begin{aligned}
 V(x) &= \pi \int_{-1}^1 (1-x^2)^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1-2x^2+x^4) dx = \pi \left( x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 = \\
 &= 2\pi \cdot \frac{8}{15} = \frac{16\pi}{15} = 1\frac{1}{15}\pi.
 \end{aligned}$$

**371. а)**  $V = V_{\text{конуса}} - V_0$ , где


$$V_{\text{конуса}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi, \text{ т.к. } r = h = 1.$$

$$V_0 = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{1}{5}\pi; V = \frac{1}{3}\pi - \frac{1}{5}\pi = \frac{2}{15}\pi;$$


$$\begin{aligned}
 \text{б)} V &= \pi \int_0^1 (x+3)^2 dx - \pi \int_0^1 (2x)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^2 + 6x + 9) dx - \pi \int_0^1 4x^2 dx = \\
 &= \pi \int_0^1 (6x + 9 - 3x^2) dx = \pi (3x^2 + 9x - x^3) \Big|_0^1 = \pi (3 \cdot 1 + 9 - 1) = 11\pi;
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{в)} V &= \pi \int_0^2 (x+2)^2 dx - \pi \int_0^2 dx = \pi \int_0^2 (x^2 + 4x + 4) dx - \pi x \Big|_0^2 = \\
 &= \pi \left( \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4x \right) \Big|_0^2 - 2\pi = \pi \left( \frac{8}{3} + 8 + 8 \right) - 2\pi = 16\frac{2}{3}\pi.
 \end{aligned}$$




$$\text{г)} V = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx - \pi \int_0^1 x^2 dx = \pi \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \pi \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$



**372.**


а) Пусть  $|OB| = x$ , тогда  $S(x) = \pi y^2 = \pi(R^2 - x^2)$ ,  
 $S(x)$  – площадь сечения шара,  $x \in [R - H; R]$ .



$$V = \int_{R-H}^R \pi(R^2 - x^2) dx = \pi R^2 x \Big|_{R-H}^R - \pi \frac{x^3}{3} \Big|_{R-H}^R = \pi R^2 H - \frac{\pi}{3} [R^3 - (R-H)^3] = \pi R^2 H - \frac{\pi}{3} [3HR^2 - 3RH^2 + H^3] = \pi RH^2 - \frac{\pi H^3}{3}.$$

б) Пусть  $|OD| = x$ ,  $S(x)$  – площадь сечения конуса,

$$x \in \left[ 0; \frac{HR - r}{R} \right].$$



$S(x) = \pi y^2 = \pi \frac{R^2}{H^2} (H-x)^2$ . При этом  $x$  меняется в пределах

$$0 \leq x \leq \frac{H(R-r)}{R}.$$

$$\text{T.O., } V = \int_0^{H(R-r)} \pi \frac{R^2}{H^2} (H-x)^2 dx = \int_0^{H(R-r)} \pi R^2 dx - \int_0^{H(R-r)} \frac{2\pi R^2}{H} \cdot x dx + \\ + \int_0^{H(R-r)} \frac{R^2}{H^2} \cdot x^2 dx = \pi RH(R-r) - \frac{\pi R^2}{H} x^2 \Big|_0^{H(R-r)} + \frac{\pi R^2}{H^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^{H(R-r)} = \\ = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2).$$

**373.**  $F = k \cdot x$ ,  $k = \frac{F}{x}$ ; при  $F = 2H$ ,  $x = 0,01 \text{ м} \cdot k = \frac{2}{0,01} = 200$ ;

$$A = \int_0^{0,04} 200x dx = 100x^2 \Big|_0^{0,04} = 0,16 \text{ Дж.}$$

**374.**  $k = \frac{F}{x}$ ; при  $F = 4H$ ,  $x = 0,08 \text{ м} \cdot k = \frac{4}{0,08} = 50$ ;

$$A = \int_0^{0,08} 50x dx = 25x^2 \Big|_0^{0,08} = 0,16 \text{ Дж.}$$

**375.**  $F = -\frac{\gamma q}{r^2}$  (по закону Кулона). Т.к. работа равна  $A = \int_a^b F(r) dr$ , то

$$A = \int_a^b -\frac{\gamma q}{r^2} dr = \gamma q \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = \gamma q \left( \frac{a-b}{ab} \right);$$


$$\text{а) } a < b, q < 0; \quad A = \gamma q \frac{(a-b)}{ab} = \frac{\gamma |q|}{ab} (b-a) > 0;$$

$$6) b < a, q > 0: A = \gamma q \frac{(a-b)}{ab} > 0.$$

**376.** Выделим на расстоянии  $x$  от верхнего основания плотины полоску толщиной  $\Delta x$ . Тогда сила давления воды на эту полоску равна  $\Delta P = \rho g x \Delta x$ . Т.к.  $\Delta ABF$  подобен  $\Delta NBM$ , то


$$\frac{|AF|}{|NM|} = \frac{|FB|}{|MB|} \text{ или } \frac{a-b}{y-b} = \frac{h}{h-x}, y = b + (a-b)\left(1 - \frac{x}{h}\right),$$

$$\begin{aligned} \text{т.е. } P &= \int_0^h \rho g x \left( b + (a-b)\left(1 - \frac{x}{h}\right) \right) dx = \rho g \left[ \frac{bx^2}{2} + \frac{(a-b)x^2}{2} - (a-b)\frac{x^3}{3h} \right]_0^h = \\ &= \rho g \left[ \frac{h^2 a}{2} - \frac{h^2 a}{3} + \frac{h^2 b}{3} \right] = \frac{\rho g h^2 (a+2b)}{6}. \end{aligned}$$




**377.** Пусть  $\Delta x = \frac{h}{n}$  – толщина слоя воды, находящегося на расстоянии  $x$  от нижнего основания. Тогда работа, затрачиваемая на подъем этого слоя, равна  $\Delta A = \rho g \Delta V \cdot x = \rho g \cdot \pi r^2 \Delta x \cdot x$ . Полная работа равна

$$A = \sum_0^h \rho g \pi r^2 x \Delta x. \text{ Если } n \rightarrow \infty, \text{ то } A = \int_0^h \rho g \pi r^2 x dx = \rho g \pi r^2 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^h = \frac{\rho g \pi r^2 h^2}{2}.$$



**378.** Разобьем шар на  $n$  слоев толщиной  $\Delta x = \frac{2R}{n}$  каждый. Выделим один из таких слоев, находящийся на расстоянии  $x$  от точки А. Тогда работа против сил выталкивания при погружении этого слоя на глубину  $x$  есть  $\Delta A = \rho g \Delta V \cdot x$ . Пусть  $|OB| = a$ , тогда  $y^2 = R^2 - a^2 = R^2 - (x-R)^2$  и  $\Delta V \approx \pi y^2 \Delta x = \pi [R^2 - (x-R)^2] \Delta x = \pi \cdot x(2R-x) \Delta x$ , тогда

$$A = \int_0^{2R} \rho g \pi x^2 (2R-x) dx = \rho g \pi \left[ \frac{2x^3 R}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^{2R} = \rho g \pi \left[ \frac{2}{3} \cdot 8R^4 - \frac{16R^4}{4} \right] = \frac{3}{4} \rho g \pi R^4.$$




**379.** Разобьем стержень на  $n$  равных цилиндров, каждый из которых имеет высоту  $\Delta x = \frac{1}{n}$ .

$$\Delta E = \frac{mv^2}{2}, \text{ где } m = \rho \Delta V = \rho S \Delta x - \text{масса цилиндра, } v = \omega \cdot \left( \frac{x + \Delta x}{2} \right) -$$

средняя линейная скорость точек цилиндра. Так как  $\frac{\Delta x}{x} \rightarrow 0$ , то


$$v \approx \omega x. \text{ Т.о. } \Delta E \approx \rho S \Delta x \cdot \frac{\omega^2 x^2}{2} \text{ и } E = \int_0^l \rho S dx \cdot \frac{\omega^2 x^2}{2} = \frac{\rho S \omega^2}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^l = \frac{\rho S \omega^2 l^3}{6}.$$



**380.** Центр масс кругового конуса лежит на его оси (OA), объем  $\Delta V$ , находящийся на расстоянии  $x$  от вершины конуса, равен

$$\Delta V \approx \pi y^2 \cdot \Delta x. \Delta ABO \sim \Delta ANE; \frac{x}{h} = \frac{y}{r}, y = \frac{r}{h} \cdot x; \text{ тогда } \Delta V \approx \pi \frac{r^2}{h^2} x^2 \Delta x.$$

$$\text{Координата центра масс } x = \frac{\int_0^h \rho x dV}{\int_0^h \rho dV} = \frac{\rho \int_0^h \frac{\pi r^2}{h^2} x^3 dx}{\rho \int_0^h \frac{\pi r^2}{h^2} dx} = \frac{\int_0^h x^3 dx}{\int_0^h x^2 dx} = \frac{\frac{x^4}{4} \Big|_0^h}{\frac{x^3}{3} \Big|_0^h} = \frac{\frac{h^4}{4}}{\frac{h^3}{3}} = \frac{3}{4} h.$$



## ГЛАВА IV. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ

### § 9. Обобщение понятия степени 32. Корень $n$ -й степени и его свойства

**381.** а)  $\sqrt[4]{16} = 2$ ,  $2^4 = 16$  и  $2 > 0$ ; б)  $\sqrt[7]{-1} = -1$ ,  $(-1)^7 = -1$ ;

в)  $\sqrt[10]{1024} = 2$ ,  $2^{10} = 1024$  и  $2 > 0$ ; г)  $\sqrt[5]{-243} = -3$ ,  $(-3)^5 = -243$ .

**382.** а)  $\sqrt[17]{1} = 1$ ,  $1^{17} = 1$ ; в)  $\sqrt[3]{-343} = -7$ ,  $(-7)^3 = -343$ ;

г)  $\sqrt[6]{64} = 2$ ,  $2^6 = 64$  и  $2 > 0$ ; д)  $\sqrt[19]{0} = 0$ ,  $0^{19} = 0$ .

**383.** a)  $\sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = -3$ ; 6)  $\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$ ;

b)  $\sqrt[5]{-32} = \sqrt[5]{(-2)^5} = -2$ ; r)  $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$ .

**384.** a)  $\sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \sqrt[5]{\left(\frac{1}{2}\right)^5} = \frac{1}{2}$ ; 6)  $\sqrt[4]{\frac{81}{625}} = \sqrt[4]{\left(\frac{3}{5}\right)^4} = \frac{3}{5}$ ;

b)  $\sqrt[3]{-\frac{27}{8}} = \sqrt[3]{\left(-\frac{3}{2}\right)^3} = -\frac{3}{2}$ ; r)  $\sqrt[4]{\frac{81}{256}} = \sqrt[4]{\left(\frac{3}{4}\right)^4} = \frac{3}{4}$ .

**385.** a)  $x^3 + 4 = 0$ ;  $x = \sqrt[3]{-4} = -\sqrt[3]{4}$ ; 6)  $x^6 = 5$ ;  $x = \pm \sqrt[6]{5}$ ;

b)  $x^3 = 4$ ;  $x = \sqrt[3]{4}$ ; r)  $x^4 = 10$ ;  $x = \pm \sqrt[4]{10}$ .

**386.** a)  $x^{10} - 15 = 0$ ;  $x^{10} = 15$ ;  $x = \pm \sqrt[10]{15}$ ;

6)  $x^7 + 128 = 0$ ;  $x^7 = -128$ ;  $x = \sqrt[7]{-128} = -2$ ;

b)  $x^6 - 64 = 0$ ;  $x^6 = 64$ ;  $x = \pm 2$ ; r)  $x^5 = 3$ ;  $x = \sqrt[5]{3}$ .

**387.**

a)  $16x^4 - 1 = 0$ ;  $x^4 = \frac{1}{16}$ ; 6)  $0,01x^3 + 10 = 0$ ;  $x^3 = -1000$ ;  
 $x = \sqrt[3]{-1000} = -10$ ;

$x = \pm \sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \pm \frac{1}{2}$ ;

b)  $0,02x^6 - 1,28 = 0$ ;  $x^6 = 64$ ; r)  $12 \cdot \frac{3}{4} - \frac{3}{4}x^2 = 0$ ;  $x^2 = 17$ ;  
 $x = \pm \sqrt[6]{64} = -2$ ;  $x = \pm \sqrt{17}$ .

**388.**

a)  $\sqrt[3]{x} = -0,6$ ;  $(\sqrt[3]{x})^3 = (-0,6)^3$ ; 6)  $\sqrt[4]{x} = 3$ ;  $(\sqrt[4]{x})^4 = 3^4$ ;  $x = 81$ ;  
 $x = -0,216$ ;

b)  $\sqrt{x} = 5$ ;  $(\sqrt{x})^2 = 5^2$ ;  $x = 25$ ; r)  $\sqrt[7]{x} = -1$ ;  $(\sqrt[7]{x})^7 = (-1)^7$ ;  $x = -1$ .

**389.** a)  $(-\sqrt[4]{11})^4 = (-1)^4 \cdot (\sqrt[4]{11})^4 = 11$  6)  $(2\sqrt[5]{-2})^5 = (-2)^5 \cdot (\sqrt[5]{2})^5 = -32 \cdot 2 = -64$ ;

b)  $(\sqrt[3]{7})^3 = \sqrt[3]{7^3} = 7$ ; r)  $(-\sqrt[6]{2})^6 = (-1)^6 (\sqrt[6]{2})^6 = 2$ .

**390.**

a)  $\sqrt[4]{16 \cdot 625} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{625} = 2 \cdot 5 = 10$ ; 6)  $\sqrt[5]{32 \cdot 243} = \sqrt[5]{32} \cdot \sqrt[5]{243} = 2 \cdot 3 = 6$ ;

b)  $\sqrt[3]{8 \cdot 343} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{343} = 2 \cdot 7 = 14$ ; r)  $\sqrt[4]{0,0001 \cdot 16} = \sqrt[4]{0,0001} \cdot \sqrt[4]{16} = 0,1 \cdot 2 = 0,2$ .

**391.** a)  $\sqrt[5]{160 \cdot 625} = \sqrt[5]{32} \cdot \sqrt[5]{5^5} = 2 \cdot 5 = 10$ ;

6)  $\sqrt[3]{24 \cdot 9} = \sqrt[3]{8 \cdot 27} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{27} = 2 \cdot 3 = 6$ ;

b)  $\sqrt[4]{48 \cdot 27} = \sqrt[4]{16 \cdot 81} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{81} = 2 \cdot 3 = 6;$

g)  $\sqrt[3]{75 \cdot 45} = \sqrt[3]{125 \cdot 27} = \sqrt[3]{125} \cdot \sqrt[3]{27} = 5 \cdot 3 = 15.$

**392.**

a)  $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[6]{9} = \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{27} = 3; \quad 6) \sqrt[7]{16} \cdot \sqrt[7]{-8} = \sqrt[7]{-128} = -2;$

b)  $\sqrt[5]{27} \cdot \sqrt[5]{9} = \sqrt[5]{243} = 3; \quad r) \sqrt[3]{-25} \cdot \sqrt[6]{25} = \sqrt[3]{-25} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{-125} = -5.$

**393.** a)  $\frac{\sqrt[3]{-625}}{\sqrt[3]{-5}} = \sqrt[3]{125} = 5; \quad 6) \frac{\sqrt[4]{128}}{\sqrt[4]{8}} = \sqrt[4]{\frac{128}{8}} = \sqrt[4]{16} = 2;$

b)  $\frac{\sqrt[3]{243}}{\sqrt[3]{-9}} = \sqrt[3]{-\frac{243}{9}} = \sqrt[3]{-27} = -3; \quad r) \frac{\sqrt[6]{128}}{\sqrt[6]{2}} = \sqrt[6]{\frac{128}{2}} = \sqrt[6]{64} = 2.$

**394.**

a)  $\sqrt[6]{\frac{64}{100000000}} \cdot \sqrt[4]{39 \frac{1}{16}} : \sqrt[3]{-3 \frac{19}{27}} = \frac{\sqrt[6]{64}}{\sqrt[6]{100000000}} \cdot \frac{\sqrt[4]{625}}{\sqrt[4]{16}} : \frac{\sqrt[3]{-100}}{\sqrt[3]{27}} =$   
 $= \frac{2}{\sqrt[3]{10000}} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{\sqrt[3]{-100}} = \frac{15}{\sqrt[3]{-1000000}} = -\frac{15}{100} = -0,15;$

6)  $\sqrt[5]{1 \frac{11}{16} \cdot 4,5} - \sqrt[5]{\frac{9}{288}} = \sqrt[5]{\frac{27}{16} \cdot \frac{9}{2}} - \sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \sqrt[5]{\frac{243}{32}} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1;$

b)  $\sqrt[5]{-\frac{243}{1024}} \cdot \sqrt[3]{-4 \frac{17}{27}} = \sqrt[5]{\frac{-243}{1024}} \cdot \frac{\sqrt[3]{-125}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{-3}{4} \cdot \frac{(-5)}{3} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4};$

r)  $\sqrt[4]{3 \frac{3}{8} \cdot 1 \frac{1}{2}} + \sqrt[4]{\frac{5}{80}} = \sqrt[4]{\frac{27 \cdot 3}{8 \cdot 2}} + \sqrt[4]{\frac{5}{80}} = \sqrt[4]{\frac{81}{16}} + \sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2;$

**395.**

a)  $1 < \sqrt[4]{2} < 2, \text{ т.к. } 1^4 < 2 < 2^4; 1,1 < \sqrt[4]{2} < 1,2, \text{ т.к. } 1,1^4 < 2 < 1,2^4;$

$1,18 < \sqrt[4]{2} < 1,19, \text{ т.к. } 1,18^4 < 2 < 1,19^4; \quad \sqrt[4]{2} = 1,18\dots;$

6)  $1 < \sqrt[3]{5} < 2, \text{ т.к. } 1^3 < 5 < 2^3; 1,7 < \sqrt[3]{5} < 1,8, \text{ т.к. } 1,7^3 < 5 < 1,8^3;$

$1,70 < \sqrt[3]{5} < 1,71, \text{ т.к. } 1,7^3 < 5 < 1,71^3; \quad \sqrt[3]{5} = 1,70\dots;$

b)  $2 < \sqrt{7} < 3, \text{ т.к. } 2^2 < 7 < 3^2; 2,6 < \sqrt{7} < 2,7, \text{ т.к. } 2,6^2 < 7 < 2,7^2;$

$2,64 < \sqrt{7} < 2,65, \text{ т.к. } 2,64^2 < 7 < 2,65^2; \quad \sqrt{7} = 2,64\dots;$

g)  $1 < \sqrt[3]{3} < 2, \text{ т.к. } 1^3 < 3 < 2^3; 1,4 < \sqrt[3]{3} < 1,5, \text{ т.к. } 1,4^3 < 3 < 1,5^3;$

$1,44 < \sqrt[3]{3} < 1,45, \text{ т.к. } 1,44^3 < 3 < 1,45^3; \quad \sqrt[3]{3} = 1,44\dots.$

**396.**

a)  $\sqrt[3]{10,17} \approx 2,17; \quad 6) \sqrt{71} \approx 8,43; \quad b) \sqrt{13,21} \approx 3,63; \quad r) \sqrt[3]{11} \approx 2,22.$

**397.**

a)  $\sqrt[9]{13,7} \approx 1,34; \quad 6) \sqrt[6]{10} \approx 1,47; \quad b) \sqrt[4]{2,8} \approx 1,29; \quad r) \sqrt[8]{13} \approx 1,38.$

**398.**

a)  $\sqrt[5]{0,2} > 0$ , т.к.  $0,2 > 0$  и  $\sqrt[5]{0} = 0$ ;    б)  $\sqrt[12]{0,4} < \sqrt[12]{\frac{5}{12}}$ , т.к.  $0,4 = \frac{24}{60} < \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$ ;

в)  $\sqrt[7]{1,8} > 1$ , т.к.  $1,8 > 1$  и  $\sqrt[7]{1} = 1$ ;    г)  $\sqrt[8]{0,2} < \sqrt[8]{0,3}$ , т.к.  $0,2 < 0,3$ .

**399.** а)  $\frac{1}{2} \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}; \left( \sqrt[6]{\frac{1}{2}} \right)^2 = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}; \sqrt[3]{\frac{1}{4}} < \sqrt[3]{\frac{1}{2}}, \text{ т.о. } \frac{1}{2} \sqrt[3]{2} < \left( \sqrt[6]{\frac{1}{2}} \right)^2;$

б)  $\sqrt[18]{\frac{3}{7}} < \sqrt[18]{0,43}$ , т.к.  $\frac{3}{7} = \frac{300}{700} < \frac{301}{700} = 0,43$ ;

в)  $\sqrt[5]{2} < \sqrt[5]{3}$ , т.к.  $2 < 3$ ; г)  $\sqrt[8]{0,8} < 1$ , т.к.  $0,8 < 1$  и  $1 = \sqrt[8]{1}$ .

**400.** а)  $\sqrt{0,3} = \sqrt[10]{0,3^5} = \sqrt[10]{0,00243}; \sqrt{0,05} = \sqrt[10]{0,05^2} = \sqrt[10]{0,0025};$

$\sqrt[10]{0,0025} > \sqrt[10]{0,00243}, \text{ т.о. } \sqrt{0,3} < \sqrt{0,05};$

б)  $\sqrt[3]{4} = \sqrt[15]{4^5} = \sqrt[15]{1024}; \sqrt[5]{8} = \sqrt[15]{8^3} = \sqrt[15]{512}; \sqrt[15]{1024} > \sqrt[15]{512}, \text{ т.о. } \sqrt[3]{4} > \sqrt[5]{8};$

в)  $\sqrt[3]{7} = \sqrt[6]{7^2} = \sqrt[6]{49}; \sqrt[6]{49} > \sqrt[6]{40}, \text{ т.о. } \sqrt[3]{7} > \sqrt[6]{40};$

г)  $\sqrt{5} = \sqrt[8]{5^4} = \sqrt[8]{625}; \sqrt[8]{625} > \sqrt[8]{500}, \text{ т.о. } \sqrt{5} > \sqrt[8]{500}.$

**401.**

а)  $\sqrt[3]{-0,4} = -\sqrt[15]{0,4^5} = -\sqrt[15]{0,01024}; \sqrt[5]{-0,3} = -\sqrt[15]{0,3^3} = -\sqrt[15]{0,009};$

$\sqrt[15]{0,01024} < \sqrt[15]{0,009}, -\sqrt[15]{0,01024} > -\sqrt[15]{0,009}; \text{ т.о. } \sqrt[3]{-0,4} > \sqrt[5]{-0,3};$

б)  $\sqrt[5]{-5} = -\sqrt[5]{5} = -\sqrt[15]{5^3} = -\sqrt[15]{125}; \sqrt[3]{-3} = -\sqrt[3]{3} = -\sqrt[15]{3^5} = -\sqrt[15]{243};$

$-\sqrt[15]{125} > \sqrt[15]{243}, \text{ т.о. } \sqrt[5]{-5} > \sqrt[3]{-3};$

в)  $\sqrt[3]{-2} = -\sqrt[3]{2} > -\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{-4};$

г)  $\sqrt[3]{-5} = -\sqrt[15]{5^5} = -\sqrt[15]{3125}; \sqrt[5]{-3} = -\sqrt[15]{3^3} = -\sqrt[15]{27};$

$\sqrt[15]{3125} > \sqrt[15]{27}, -\sqrt[15]{3125} < -\sqrt[15]{27}, \sqrt[5]{-5} < \sqrt[3]{-3}.$

**402.**

а)  $\sqrt[6]{64a^8b^{11}} = \sqrt[6]{(2ab)^6} \cdot \sqrt[6]{a^2b^5} = 2ab\sqrt[6]{a^2b^5};$

б)  $\sqrt[5]{-128a^7} = -\sqrt[5]{(2a)^5} \cdot \sqrt[5]{4a^2} = -2a\sqrt[5]{4a^2};$

в)  $\sqrt[4]{6a^{12}b^6} = \sqrt[4]{(a^3b)^4} \cdot \sqrt[4]{6b^2} = a^3b\sqrt[4]{6b^2};$

г)  $\sqrt[3]{54a^{10}} = \sqrt[3]{(3a^3)^3} \cdot \sqrt[3]{2a} = 3a^3\sqrt[3]{2a}.$

**403.** а)  $-b\sqrt[4]{3} = -\sqrt[4]{b^4} \cdot \sqrt[4]{3} = -\sqrt[4]{3b^4}$ ; б)  $ab\sqrt[8]{\frac{5b^3}{a^7}} = \sqrt[8]{a^8b^8} \cdot \sqrt[8]{\frac{5b^3}{a^7}} = \sqrt[8]{5ab^{11}}$

в)  $a\sqrt[4]{7} = \sqrt[4]{a^4} \cdot \sqrt[4]{7} = \sqrt[4]{7a^4}$ ; г)  $-ab^3\sqrt{-4} = \sqrt[3]{-a^3b^3} \cdot \sqrt[3]{-4} = \sqrt[3]{4a^3b^3}$ .

**404.**

а)  $\sqrt{a^2} = |a|$ ,  $|a| = -a$  справедливо только при  $a \leq 0$ , т.о.  $\sqrt{a^2} = -a$  при  $a \leq 0$ ;

б)  $\sqrt[3]{a^3} = a$  при любом  $a$ ;

в)  $\sqrt[5]{a^5} = a$ ,  $a = |a|$  справедливо только при  $a \geq 0$ , т.о.  $\sqrt[5]{a^5} = |a|$  при  $a \geq 0$ ;

г)  $\sqrt[4]{a^4} = |a|$ ,  $|a| = a$  справедливо только при  $a \geq 0$ , т.о.  $\sqrt[4]{a^4} = a$  при  $a \geq 0$ .

**405.**

а)  $\sqrt[3]{a^3} = a$  при любом  $a$ ,  $a = -a$  при  $a = 0$ , значит  $\sqrt[3]{a^3} = -a$  при  $a = 0$ ;

б)  $\sqrt[6]{a^6} = |a|$ ,  $|a| = -a$  при  $a \leq 0$ , значит  $\sqrt[6]{a^6} = -a$  при  $a \leq 0$ ;

в)  $\sqrt[4]{a^4} = |a|$  при любом  $a$ ; г)  $\sqrt[7]{a^7} = a$  при любом  $a$ .

**406.** а)  $\frac{3}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} = \frac{3(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2} = \frac{3(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{2}$ ;

б)  $\frac{a - \sqrt{2}}{a + \sqrt{2}} = \frac{(a - \sqrt{2})^2}{a^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{a^2 - 2\sqrt{2} + 2}{a^2 - 2}$ ;

в)  $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}$ ;

г)  $\frac{\sqrt{6} + 1}{\sqrt{6} - 1} = \frac{(\sqrt{6} + 1)^2}{5} = \frac{6 + 1 + 2\sqrt{6}}{5} = \frac{7 + 2\sqrt{6}}{5}$ .

**407.** а)  $\frac{a}{\sqrt[3]{2}} = \frac{a \cdot \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{a\sqrt[3]{2}}{2}$ ; б)  $\frac{x - \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x} - 1}{2}$ ;

в)  $\frac{4}{x\sqrt[4]{4}} = \frac{4\sqrt[4]{4^3}}{x\sqrt[4]{4^4}} = \frac{\sqrt[4]{64}}{x} = \frac{2\sqrt{2}}{x}$ ; г)  $\frac{5}{3\sqrt[5]{5}} = \frac{5\sqrt[5]{5^4}}{3\sqrt[5]{5^5}} = \frac{\sqrt[5]{625}}{3}$ .

**408.** а)  $\frac{2}{\sqrt[3]{4}} = \frac{2\sqrt[3]{4^2}}{\sqrt[3]{4^3}} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{16}$ ; б)  $\frac{6}{\sqrt[5]{27 \cdot 25}} = \frac{6 \cdot \sqrt[5]{3^2} \cdot \sqrt[5]{5^3}}{\sqrt[5]{3^5} \cdot \sqrt[5]{5^5}} = \frac{6}{15}\sqrt[5]{9 \cdot 125}$ ;

в)  $\frac{3}{\sqrt[4]{12}} = \frac{3 \cdot \sqrt[4]{2^2} \cdot \sqrt[4]{3^3}}{\sqrt[4]{2^4} \cdot \sqrt[4]{3^4}} = \frac{3}{6}\sqrt[4]{4 \cdot 27} = \frac{1}{2}\sqrt[4]{108}$ ; г)  $\frac{10}{\sqrt[5]{8}} = \frac{10\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{10}{2}\sqrt[5]{4} = 5\sqrt[5]{4}$ .

**409.**

a)  $\sqrt[12]{25^3} = \sqrt[12]{5^6} = \sqrt{5};$  6)  $\sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt[4]{2^3} = 0,5 \sqrt[4]{8};$

b)  $\sqrt[8]{\frac{16^3}{81}} = \sqrt[8]{\frac{2^{12} \cdot 3^4}{3^8}} = \frac{2}{3} \sqrt[8]{2^4 \cdot 3^4} = \frac{2}{3} \sqrt{6};$

г)  $\sqrt[4]{\frac{1}{4} \sqrt[3]{5}} = \sqrt[12]{\frac{5}{4^3}} = \frac{1}{4} \sqrt[12]{5 \cdot 4^9} = \frac{1}{4} \sqrt[12]{5 \cdot 2^6} \cdot \sqrt[12]{2^{12}} = \frac{1}{2} \sqrt[12]{320}.$

**410.**

a)  $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[4]{x} + 6 = 0;$   $\sqrt[4]{x} = t; t \geq 0;$

$t^2 - 5t + 6 = 0; t_1 = 2, t_2 = 3;$

$\sqrt[4]{x} = 2, x = 2^6 = 64;$

$\sqrt[4]{x} = 3, x = 3^6 = 729;$

b)  $\sqrt{x} - 3\sqrt[4]{x} + 2 = 0;$   $\sqrt[4]{x} = t; t \geq 0;$

$t^2 - 3t + 2 = 0; t_1 = 1, t_2 = 2;$

$\sqrt[4]{x} = 1, x = 1; \sqrt[4]{x} = 2, x = 2^4 = 16;$

6)  $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} = 2;$   $\sqrt[4]{x} = t; t \geq 0;$

$t^2 + t - 2 = 0; t_1 = -2, t_2 = 1;$

$\sqrt[4]{x} = -2$  - не имеет решений;

$\sqrt[4]{x} = 1, x = 1;$

г)  $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[4]{x} = 6;$   $\sqrt[4]{x} = t; t \geq 0;$

$t^2 - 5t - 6 = 0; t_1 = -1, t_2 = 6;$

$\sqrt[4]{x} = -1$  - не имеет решений;

$\sqrt[4]{x} = 6, x = 6^6 = 46656.$

**411.**

a)

$x^4 < 3; x_1 = -\sqrt[4]{3}, x_2 = \sqrt[4]{3}.$

Ответ:  $(-\sqrt[4]{3}; \sqrt[4]{3}).$

b)

$x^{10} > 2; x_1 = -\sqrt[10]{2}, x_2 = \sqrt[10]{2}.$

Ответ:  $(-\infty; -\sqrt[10]{2}) \cup (\sqrt[10]{2}; \infty)$

6)

$x^{11} \geq 7; x = \sqrt[11]{7};$

Ответ:  $[\sqrt[11]{7}; \infty)$

г)

$x^3 \leq 5; x = \sqrt[3]{5}.$

Ответ:  $(-\infty; \sqrt[3]{5}]$

**412.**

a)

$\sqrt[3]{x} < -7; x = (-7)^3 = -343;$

Ответ:  $(-\infty; -343).$

b)

$\sqrt[3]{x} > 2; x = 8;$  Ответ:  $(8; \infty).$

6)

$\sqrt[3]{x} \geq 2; x = 64.$

Ответ:  $[64; \infty).$

г)

$\sqrt[3]{x} \leq 3; x = 27.$  Ответ:  $[0; 27].$

**413.**

a)  $\sqrt[6]{a^6} = |a| = -a$ , где  $a \leq 0$ ;      b)  $\sqrt[5]{a^5} = a$ ;

б)  $\sqrt[4]{a^4} = |a| = a$ , где  $a \geq 0$ ;

**414.** а)  $\sqrt[3]{a^3} - \sqrt{a^2} = a - |a| = a + a = 2a$ , где  $a \leq 0$ ;

б)  $\sqrt[4]{a^4} + 2\sqrt{a^2} = |a| + 2a = a + 2a = 3a$ , где  $a \geq 0$ ;

в)  $\sqrt[5]{a^5} - \sqrt[6]{a^6} = a - |a| = a - a = 0$ , где  $a \geq 0$ ;

г)  $\sqrt[3]{a^3} + 3\sqrt[8]{a^8} = a + 3|a| = a + 3a = -2a$ , где  $a \leq 0$ .

**415.** а)  $\sqrt[3]{10 + \sqrt{73}} \cdot \sqrt[3]{10 - \sqrt{73}} = \sqrt[3]{10^2 - (\sqrt{73})^2} = \sqrt[3]{27} = 3$ ;

б)  $\frac{\sqrt[3]{(4 + \sqrt{17})^2}}{\sqrt[3]{4 - \sqrt{17}}} + \sqrt{17} = \frac{\sqrt[3]{(4 + \sqrt{17})^3}}{\sqrt[3]{4^2 - (\sqrt{17})^2}} + \sqrt{17} = -(4 + \sqrt{17}) + \sqrt{17} = -4$ ;

в)  $\sqrt[4]{9 - \sqrt{65}} \cdot \sqrt[4]{9 + \sqrt{65}} = \sqrt[4]{9^2 - (\sqrt{65})^2} = \sqrt[4]{16} = 2$ ;

г)  $\sqrt{3 - \sqrt{5}} \cdot \sqrt{3 + \sqrt{5}} = \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = \sqrt{4} = 2$ .

**416.** а)  $\frac{1}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{2 \cdot 3} + \sqrt[3]{3^2}}{(\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{2 \cdot 3} + \sqrt[3]{3^2})} = -\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{6} - \sqrt[3]{9}$ ;

б)  $\frac{2}{a - \sqrt[3]{b}} = \frac{2(a^2 + a\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2})}{(a - \sqrt[3]{b})(a^2 + a\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2})} = \frac{2(a^2 + a\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b^2})}{a^3 - b}$ ;

в)  $\frac{2}{\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{7}} = \frac{2(\sqrt[3]{5^2} - \sqrt[3]{5 \cdot 7} + \sqrt[3]{7^2})}{(\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{7})(\sqrt[3]{5^2} - \sqrt[3]{5 \cdot 7} + \sqrt[3]{7^2})} = \frac{\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{35} + \sqrt[3]{49}}{6}$ ;

г)  $\frac{3a}{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{3a(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})}{(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})} = \frac{3a(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})}{a + b}$ .

### 33. Иррациональные уравнения

**417.**

а)  $\sqrt{x^4 + 19} = 10 \Leftrightarrow x^4 + 19 = 100 \Leftrightarrow x^4 = 81 \Leftrightarrow x = \pm 3$ ;

б)  $\sqrt[3]{x^2 - 28} = 2 \Leftrightarrow x^2 - 28 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 36 \Leftrightarrow x = \pm 6$ ;

$$\text{b) } \sqrt{61-x^2} = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 61-x^2 \geq 0, \\ 61-x^2 = 25; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 61, \\ x^2 = 36 \end{cases} \Leftrightarrow x = \pm 6;$$

$$\text{r) } \sqrt[3]{x-9} = -3 \Leftrightarrow x-9 = -27 \Leftrightarrow x = -18.$$

**418.**

$$\text{a) } \sqrt{x+1} = x-5 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = (x-5)^2, \\ x-5 \geq 0, \\ x+1 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 11x + 24 = 0, \\ x \geq 5, \\ x \geq -1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ x=8; \Leftrightarrow x=8; \\ x \geq 5; \end{cases}$$

$$\text{б) } x + \sqrt{2x+3} = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3 = (6-x)^2, \\ 6-x \geq 0, \\ 2x+3 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 14x + 33 = 0, \\ x \leq 6, \\ x \geq -\frac{3}{2}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ x=11; \Leftrightarrow x=3; \\ x \leq 6; \end{cases}$$

$$\text{в) } \sqrt{2x-1} = x-2 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1 = (x-2)^2, \\ x-2 \geq 0; \\ 2x-1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6x + 5 = 0, \\ x \geq 2; \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1, \\ x=5; \Leftrightarrow x=5; \\ x \geq 2; \end{cases}$$

$$\text{г) } 3 + \sqrt{3x+1} = x \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+1 = (x-3)^2, \\ x-3 \geq 0, \\ 3x+1 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 9x + 8 = 0, \\ x \geq 3, \\ x \geq -\frac{1}{3}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1, \\ x=8; \Leftrightarrow x=8. \\ x \geq 3; \end{cases}$$

**419.**

$$\text{а) } \sqrt{2x+1} = \sqrt{x^2 - 2x + 4} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = x^2 - 2x + 4, \\ 2x+1 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ x \geq -0,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1, \\ x=3; \Leftrightarrow x_1 = 1, \\ x_2 = 3; \end{cases} \text{ см.}$$

$$\text{б) } \sqrt{x} = \sqrt{x^2 - x - 3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x^2 - x - 3, \\ x \geq 0, \\ x^2 - x - 3 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 3 = 0, \\ x \geq \frac{1+\sqrt{13}}{2}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1, \\ x=3; \\ x \geq \frac{1+\sqrt{13}}{2}; \end{cases} \Leftrightarrow x=3;$$

$$\text{в) } \sqrt{x+2} = \sqrt{2x-3} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2 = 2x-3, \\ x+2 \geq 0, \\ 2x-3 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5, \\ x \geq 1,5; \end{cases} \Leftrightarrow x=5;$$

$$\text{г) } \sqrt{9-x^2} = \sqrt{x+9} \Leftrightarrow \begin{cases} 9-x^2 = 9+x, \\ 9-x^2 \geq 0, \\ x+9 \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x+1) = 0, \\ x \geq -3, \\ x \leq 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1, \\ x=0; \\ x \geq -3, \Leftrightarrow x_1 = -1, \\ x \leq 3; \\ x_2 = 0; \end{cases}$$

**420.**

$$\text{a) } x = \sqrt[3]{x^3 + x^2 - 6x + 8} \Leftrightarrow x^3 + x^2 - 6x + 8 = x^3 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = 4; \end{cases}$$

$$\text{б) } x - 2 = \sqrt[3]{x^2 - 8} \Leftrightarrow (x - 2)^3 = x^2 - 8 \Leftrightarrow x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = x^2 - 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(x^2 - 7x + 12) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 3, \\ x_3 = 4; \end{cases}$$

$$\text{в) } x = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - 8x + 20} \Leftrightarrow x^3 = x^3 - x^2 - 8x + 20 \Leftrightarrow x^2 + 8x - 20 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -10, \\ x_2 = 2; \end{cases}$$

$$\text{г) } x + 1 = \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + x} \Leftrightarrow (x + 1)^3 = x^3 + 2x^2 + 2 \Leftrightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 =$$

$$= x^3 + 2x^2 + x \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

**421.**

$$\text{а) } \begin{cases} \sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{y} = 1, \\ 3\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 10; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{y} = 1, \\ 6\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[3]{y} = 20; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{y} = 1, \\ 7\sqrt[3]{x} = 21; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[3]{y} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt[3]{x}), \\ \sqrt[3]{x} = 3; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[3]{y} = -1, \\ \sqrt[3]{x} = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1, \\ x = 27; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 4\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y} = 2\sqrt{2}, \\ 2\sqrt[4]{x} + 3\sqrt[4]{y} = 8\sqrt{2}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12\sqrt[4]{x} - 3\sqrt[4]{y} = 6\sqrt{2}, \\ 2\sqrt[4]{x} + 3\sqrt[4]{y} = 8\sqrt{2}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[4]{y} = 4\sqrt[4]{x} - 2\sqrt{2}, \\ 14\sqrt[4]{x} = 14\sqrt{2}; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[4]{y} = 4\sqrt[4]{x} - 2\sqrt{2}, \\ \sqrt[4]{x} = \sqrt{2}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 64, \\ x = 4; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} 2\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} = 7, \\ 4\sqrt[4]{y} - 3\sqrt[4]{x} = 6; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -8\sqrt[4]{x} - 4\sqrt[4]{y} = -28, \\ -3\sqrt[4]{x} + 4\sqrt[4]{y} = 6; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[4]{y} = 7 - 2\sqrt[4]{x}, \\ -11\sqrt[4]{x} = -22; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[4]{y} = 7 - 2 \cdot 2, \\ \sqrt[4]{x} = 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 81, \\ x = 16; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} \sqrt{x} + 3\sqrt{y} = 5\sqrt{5}, \\ 5\sqrt{y} - 2\sqrt{x} = \sqrt{5}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\sqrt{x} + 6\sqrt{y} = 10\sqrt{5}, \\ -2\sqrt{x} + 5\sqrt{y} = \sqrt{5}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{y}, \\ 11\sqrt{y} = 11\sqrt{5}; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5}, \\ \sqrt{y} = \sqrt{5}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20, \\ y = 5. \end{cases}$$

**422.**

$$\text{а) } \sqrt{x+1} \cdot \sqrt{x+6} = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)(x+6) = 36, \\ x+1 \geq 0, \\ x+6 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 7x - 30 = 0, \\ x \geq -1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -10, \\ x = 3; \end{cases} \Leftrightarrow x = 3;$$

$$\begin{aligned}
6) \frac{x+1}{\sqrt{2x-1}} = \sqrt{x+1} &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{(x-1)} \cdot \sqrt{(2x-1)} = x+1, \\ x-1 \geq 0, \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(2x-1) = (x+1)^2, \\ x-1 \geq 0, \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 = x^2 + 2x + 1, \\ x \geq 1, \\ x > 0,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 5x = 0, \\ x \geq 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 5; \end{cases} \Leftrightarrow x = 5; \\
8) \frac{x+6}{\sqrt{x-2}} = \sqrt{3x+2} &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{3x+2} \cdot \sqrt{x-2} = x+6, \\ x-2 > 0; \\ 3x+2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3x+2)(x-2) = (x+6)^2, \\ 3x+2 \geq 0, \\ x-2 > 0; \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 4x - 4 = x^2 + 12x + 36, \\ x > 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 16x - 40 = 0, \\ x > 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 = 10; \end{cases} \Leftrightarrow x = 10; \\
\Gamma) \sqrt{x} \sqrt{2-x} = 2x &\Leftrightarrow \begin{cases} x(2-x) = 4x^2, \\ x \geq 0, \\ 2-x \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - x^2 = 4x^2, \\ x \geq 0, \\ x \leq 2; \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 5x(x-0,4) = 0, \\ x \geq 0, \\ x \leq 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0,4; \\ x \geq 0, \\ x \leq 2; \end{cases} \Leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 0,4;
\end{aligned}$$

**423.** а)  $\sqrt{5 + \sqrt[3]{x+3}} = 3$ ,  $5 + \sqrt[3]{x+3} = 9$ ,  $x+3 = 64$ ,  $x = 61$ .

Проверка:  $\sqrt{5 + \sqrt[3]{61+3}} = 3$ . Итого:  $x = 61$ .

б)  $\sqrt{\sqrt{x^2 - 16} + x} = 2$ ,  $\sqrt{x^2 - 16} + x = 4$ ,  $x^2 - 16 = (4-x)^2$ ,  $x^2 - 16 = x^2 - 8x + 16$ ,  $-8x + 32 = 0$ ,  $x = 4$ .

Проверка:  $\sqrt{\sqrt{4^2 - 16} + 4} = 2$ . Итого:  $x = 4$ .

в)  $\sqrt{18 - \sqrt[3]{x+10}} = 4$ ,  $18 - \sqrt[3]{x+10} = 16$ ,  $x+10 = 8$ ,  $x = -2$ .

Проверка:  $\sqrt{18 - \sqrt[3]{-2+10}} = 4$ . Итого:  $x = -2$ .

г)  $\sqrt{x - \sqrt{x^2 - 5}} = 1$ ,  $x - \sqrt{x^2 - 5} = 1$ ,  $x^2 - 5 = (x-1)^2$ ,  $2x - 6 = 0$ ,  $x = 3$ .

Проверка:  $\sqrt{3 - \sqrt{3^2 - 5}} = 1$ . Итого:  $x = 3$ .

**424.** а)  $\sqrt{x-3} = 1 + \sqrt{x-4}$ ,  $x-3 = 1 + 2\sqrt{x-4} + x-4$ ,  $\sqrt{x-4} = 0$ ,  $x = 4$ .

Проверка:  $\sqrt{4-3} = 1 + \sqrt{4-4}$ . Итого:  $x = 4$ .

$$6) \sqrt{x+2} - \sqrt{x-6} = 2, x+2 = 4 + 4\sqrt{x-6} + x-6, \sqrt{x-6} = 1, x = 7.$$

Проверка:  $\sqrt{7+2} - \sqrt{7-6} = 2$ . Итого:  $x = 7$ .

$$b) 2 + \sqrt{10-x} = \sqrt{22-x}, 4 + 4\sqrt{10-x} + 10 - x = 22 - x, \sqrt{10-x} = 2, x = 6.$$

Проверка:  $2 + \sqrt{10-6} = \sqrt{22-6}$ . Итого:  $x = 6$ .

$$g) \sqrt{1-2x} - 3 = \sqrt{16+x}, 1-2x - 6\sqrt{1-2x} + 9 = 16+x, -6\sqrt{1-2x} = 6+3x.$$

$$1-2x = 0,25x^2 + x + 1, x(x+12) = 0, \begin{cases} x = 0, \\ x = -12. \end{cases}$$

Проверка:  $\sqrt{1-2 \cdot 0} - 3 \neq \sqrt{16+0}$ ; При  $x = -12$ :  $\sqrt{1+2 \cdot 12} - 3 = \sqrt{16-12}$ .

Итого:  $x = -12$ .

**425.**

$$a) \sqrt[4]{x-3} - 6 = \sqrt[4]{x-3}; \sqrt[4]{x-3} = t; t^2 - t - 6 = 0; t_1 = -2, t_2 = 3;$$

при  $t = -2$ :  $\sqrt[4]{x-3} = -2$  - нет решений; при  $t = 3$ :  $\sqrt[4]{x-3} = 3$ ;

$$x-3 = 81; x = 84$$

Итого:  $x = 84$ .

$$b) \sqrt[3]{x+1} + 2\sqrt[6]{x+1} = 3; \sqrt[6]{x+1} = t; t^2 + 2t - 3 = 0; t_1 = -3; t_2 = 1;$$

при  $t = -3$ :  $\sqrt[6]{x+1} = -3$  - нет решений;

$$\text{при } t = 1: \sqrt[6]{x+1} = 1; x+1 = 1; x = 0. \text{ Итого: } x = 0.$$

$$v) \sqrt[4]{x-5} = 30 - \sqrt{x-5}; \sqrt[4]{x-5} = t; t^2 + t - 30 = 0; t_1 = -6, t_2 = 5;$$

при  $t = -6$ :  $\sqrt[4]{x-5} = -6$  - нет решений; при  $t = 5$ :  $\sqrt[4]{x-5} = 5$ ;

$$x-5 = 625; x = 630$$

$$g) \sqrt[3]{x^2-3} + \sqrt[5]{x^2-3} = 4; \sqrt[10]{x^2-3} = t;$$

$$t^2 + 3t - 4 = 0; t_1 = -4, t_2 = 1;$$

при  $t = -4$ :  $\sqrt[10]{x^2-3} = -4$  - нет решений;

$$\text{при } t = 1: \sqrt[10]{x^2-3} = 1; x^2 - 3 = 1; x = \pm 2.$$

Итого:  $x = \pm 2$ .

**426.**

$$a) \begin{cases} 2\sqrt{x} - \sqrt{y} = 5, \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{y} = 2\sqrt{x} - 5, \\ \sqrt{x}(2\sqrt{x} - 5) = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{y} = 2\sqrt{x} - 5, \\ 2(\sqrt{x})^2 - 5\sqrt{x} - 3 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{y} = 2\sqrt{x} - 5, \\ \sqrt{x} = -\frac{1}{2}, \\ \sqrt{x} = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{y} = -6, \\ \sqrt{x} = -\frac{1}{2}; \\ \sqrt{y} = 1, \\ \sqrt{x} = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9, \\ y = 1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{6+x} - 3\sqrt{3y+4} = -10, \\ 4\sqrt{3y+4} - 5\sqrt{6+x} = 6; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5\sqrt{6+x} - 15\sqrt{3y+4} = -50, \\ -5\sqrt{6+x} + 4\sqrt{3y+4} = 6; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{6+x} = -10 + 3\sqrt{3y+4}, \\ \sqrt{3y+4} = 4; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{6+x} = 2, \\ \sqrt{3y+4} = 4; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = -2, \\ y = 4. \end{array} \right. \\
& \text{B)} \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} + 3\sqrt{y} = 10 \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 8; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} = 10 - 3\sqrt{y}, \\ \sqrt{y}(10 - 3\sqrt{y}) = 8; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} = 10 - 3\sqrt{y}, \\ 3(\sqrt{y})^2 - 10\sqrt{y} + 8 = 0; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} = 10 - 3\sqrt{y}, \\ \sqrt{y} = \frac{4}{3}; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{y} = \frac{4}{3}; \\ \sqrt{x} = 4; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 16, \\ y = 4. \end{array} \right. \\
& \text{r)} \left\{ \begin{array}{l} 2\sqrt{x-2} + \sqrt{5y+1} = 8, \\ 3\sqrt{x-2} - 2\sqrt{5y+1} = -2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4\sqrt{x-2} + 2\sqrt{5y+1} = 16, \\ 3\sqrt{x-2} - 2\sqrt{5y+1} = -2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{5y+1} = 4, \\ \sqrt{x-2} = 2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 3, \\ x = 6. \end{array} \right.
\end{aligned}$$

**427.**

$$\begin{aligned}
& \text{a)} \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ x - y = 16; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 16; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ \sqrt{x} - \sqrt{y} = 2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} = 5, \\ \sqrt{y} = 3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 25, \\ y = 9. \end{array} \right. \\
& \text{b)} \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 5, \\ xy = 216; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{y} = 5 - \sqrt[3]{x}, \\ (\sqrt[3]{xy})^3 = 6^3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{y} = 5 - \sqrt[3]{x}, \\ \sqrt[3]{x}(5 - \sqrt[3]{x}) = 6; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{y} = 5 - \sqrt[3]{x}, \\ \sqrt[3]{x}^2 - 5\sqrt[3]{x} + 6 = 0; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{y} = 5 - \sqrt[3]{x}, \\ \sqrt[3]{x} = 2, \\ \sqrt[3]{x} = 3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{y} = 3, \\ \sqrt[3]{x} = 2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 27, \\ x = 8; \end{array} \right. \\
& \text{b)} \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 4, \\ x - y = 32; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 4, \\ (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 32; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 4, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x} = 6, \\ \sqrt{y} = 2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 36, \\ y = 4. \end{array} \right.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{г) } & \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 2, \\ xy = 27; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} = 2 + \sqrt[3]{y}, \\ (\sqrt[3]{xy})^3 = 3^3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} = 2 + \sqrt[3]{y}, \\ \sqrt[3]{y}(2 + \sqrt[3]{y}) = 3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} = 2 + \sqrt[3]{y}, \\ \sqrt[3]{y^2} + 2\sqrt[3]{y} - 3 = 0; \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} = 2 + \sqrt[3]{y}, \\ \sqrt[3]{y} = -3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} = -1, \\ \sqrt[3]{y} = -3; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = -1, \\ y = -27; \end{array} \right. \\
& \left. \begin{array}{l} \sqrt[3]{y} = 1; \\ \sqrt[3]{y} = 1. \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \sqrt[3]{x} = 3, \\ \sqrt[3]{y} = 1. \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} x = 27, \\ y = 1; \end{array} \right]
\end{aligned}$$

### 34. Степень с рациональным показателем

**428.**

$$\text{а) } 3^{1,2} = 3^{\frac{6}{5}} = \sqrt[5]{3^6} = \sqrt[5]{729}; \quad \text{б) } 5^{-\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^{-2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{25}};$$

$$\text{в) } 4^{1,25} = 4^{\frac{5}{4}} = \sqrt[4]{4^5} = \sqrt[4]{1024}; \quad \text{г) } 6^{-\frac{1}{2}} = 6^{-\frac{3}{2}} = \sqrt{6^{-3}} = \sqrt{\frac{1}{216}}.$$

**429.**

$$\text{а) } \sqrt[3]{a^{-2}} = a^{-\frac{2}{3}}; \quad \text{б) } \sqrt[7]{3b} = (3b)^{\frac{1}{7}}; \quad \text{в) } \sqrt[13]{b^{-7}} = b^{-\frac{7}{13}}; \quad \text{г) } \sqrt[8]{4^5} = 4^{\frac{5}{8}}.$$

**430.**

$$\text{а) } 243^{0,4} = (3^5)^{0,4} = 3^2 = 9; \quad \text{б) } \left( \frac{64^4}{3^8} \right)^{-\frac{1}{8}} = \left( \left( \frac{8}{3} \right)^8 \right)^{-\frac{1}{8}} = \left( \frac{8}{3} \right)^{-1} = \frac{3}{8};$$

$$\text{в) } 16^{\frac{5}{4}} = (2^4)^{\frac{5}{4}} = 2^5 = 32; \quad \text{г) } \left( \frac{27^3}{125^6} \right)^{\frac{2}{9}} = \left( \left( \frac{3}{5^2} \right)^9 \right)^{\frac{2}{9}} = \left( \frac{3}{25} \right)^2 = \frac{9}{625}.$$

$$\text{431. а) } 8^{\frac{1}{2}} : \left( 8^6 \cdot 9^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 8^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{-\frac{1}{6}} \cdot 9^{-\frac{3}{2}} = 8^{\frac{1}{2}} \cdot 9^{-\frac{3}{2}} = \frac{2}{27};$$

$$\text{б) } \sqrt[3]{100} \cdot \left( \sqrt{2} \right)^{\frac{8}{3}} \cdot \left( \frac{1}{5} \right)^{\frac{5}{3}} = \sqrt[3]{2^2 \cdot 5^2} \cdot 2^{\frac{4}{3}} \cdot 5^{-\frac{5}{3}} = 2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{4}{3}} \cdot 5^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{-\frac{5}{3}} = 2^2 \cdot 5^{-1} = \frac{4}{5};$$

$$\text{в) } 8^{\frac{2}{3}} : 81^{0,75} = 8^{\frac{2}{3}} : 81^{\frac{3}{4}} = 2^7 \cdot 3^{-3} = \frac{128}{27} = 4\frac{20}{27};$$

$$\text{г) } \left( \frac{11}{25} \right)^{-0,5} \cdot \left( 4\frac{17}{27} \right)^{-\frac{1}{3}} = \left( \left( \frac{6}{5} \right)^2 \right)^{-0,5} \cdot \left( \left( \frac{5}{3} \right)^3 \right)^{-\frac{1}{3}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{2}.$$

$$432. \text{ a) } (ax)^{\frac{1}{3}} + (ay)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}} \left( x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} \right); \quad \text{б) } a - a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \left( a^{\frac{1}{2}} - 1 \right);$$

$$\text{в) } 3 + 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{1}{2}} \left( 3^{\frac{1}{2}} + 1 \right); \quad \text{г) } (3x)^{\frac{1}{2}} - (5x)^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} \left( 3^{\frac{1}{2}} - 5^{\frac{1}{2}} \right).$$

$$433. \text{ а) } x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{3}} + 1 = x^{\frac{1}{3}} \left( y^{\frac{1}{3}} - 1 \right) - \left( y^{\frac{1}{3}} - 1 \right) = \left( y^{\frac{1}{3}} - 1 \right) \left( x^{\frac{1}{3}} - 1 \right);$$

$$\text{б) } c^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{4}} = c^{\frac{1}{4}} \left( c^{\frac{1}{4}} + 1 \right);$$

$$\text{в) } 4 - 4^{\frac{1}{3}} = \left( 4^{\frac{1}{3}} \right)^3 - 4^{\frac{1}{3}} = 4^{\frac{1}{3}} \left( 4^{\frac{2}{3}} - 1 \right) = 4^{\frac{1}{3}} \left( 4^{\frac{1}{3}} - 1 \right) \left( 4^{\frac{1}{3}} + 1 \right);$$

$$\text{г) } a + b^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \left( a^{\frac{1}{2}} + 1 \right) + b^{\frac{1}{2}} \left( a^{\frac{1}{2}} + 1 \right) = \left( a^{\frac{1}{2}} + 1 \right) \left( a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right).$$

$$434. \text{ а) } \frac{a-b}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}} = \frac{\left( a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \right) \left( a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right)}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}} = a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}};$$

$$\text{б) } \frac{z-8}{\frac{z}{2} - \frac{1}{z^3} + 4} = \frac{\left( z^{\frac{1}{3}} - 2 \right) \left( z^{\frac{2}{3}} + 2z^{\frac{1}{3}} + 4 \right)}{\frac{2}{z^3} + 2z^{\frac{1}{3}} + 4} = z^{\frac{1}{3}} - 2;$$

$$\text{в) } \frac{x^{\frac{1}{2}} - 4}{x - 16} = \frac{x^{\frac{1}{2}} - 4}{\left( x^{\frac{1}{2}} - 4 \right) \left( x^{\frac{1}{2}} + 4 \right)} = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}} + 4};$$

$$\text{г) } \frac{a+b}{\frac{2}{a^3} - \frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3} + \frac{2}{a^3 - a^3b^3 + b^3}} = \frac{\left( a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}} \right) \left( a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}} \right)}{\frac{2}{a^3} - \frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3} + \frac{2}{a^3 - a^3b^3 + b^3}} = a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}.$$

**435.**

$$\text{a)} \frac{x-y}{\frac{3}{x^4} + \frac{1}{x^2} \frac{1}{y^4}} \cdot \frac{\frac{1}{x^2} \frac{1}{y^4} + \frac{1}{x^4} \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}} = \frac{\left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \right) \left( \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) \cdot x^{\frac{1}{4}} y^{\frac{1}{4}} \left( \frac{1}{x^4} + \frac{1}{y^4} \right)}{x^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) \left( \frac{1}{x^4} + \frac{1}{y^4} \right)} =$$

$$= \frac{y^{\frac{1}{4}} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \right)}{\frac{1}{x^4}},$$

$$\text{б)} \frac{a-1}{\frac{1}{a+a^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{a^{\frac{3}{2}}-1}} : \frac{\frac{1}{3}+1}{2a^{\frac{1}{2}}} = \frac{\left( a^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \left( a^{\frac{1}{2}} + 1 \right)}{a+a^{\frac{1}{2}}+1} \cdot \frac{\left( a^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \left( a + a^{\frac{1}{2}} + 1 \right)}{a^{\frac{1}{2}}+1} + 2a^{\frac{1}{2}} = \\ = \left( a^{\frac{1}{2}} - 1 \right)^2 + 2a^{\frac{1}{2}} = a - 2a^{\frac{1}{2}} + 1 + 2a^{\frac{1}{2}} = a + 1;$$

$$\text{в)} \left( \frac{1}{a+a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{a-a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}} \right) \cdot \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2} = \frac{\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}+a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}(a-b)} \cdot \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2} = \\ = \frac{2a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}(a-b)} \cdot \frac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{a^2+ab+b^2} = \frac{2a(a-b)}{a(a-b)} = 2;$$

$$\text{г)} \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} : \frac{1}{x^2-\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(x+\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{\sqrt{x}(x\sqrt{x}-1)}{1} = \frac{x^2-\sqrt{x}+x\sqrt{x}-1}{x+\sqrt{x}+1} = \\ = \frac{(x-1)(x+1)+\sqrt{x}(x-1)}{x+\sqrt{x}+1} = \frac{(x-1)(x+\sqrt{x}+1)}{x+\sqrt{x}+1} = x-1.$$

$$\text{436. а)} \sqrt[7]{3^3} = 3^{\frac{3}{7}} < 3^{\frac{19}{8}}, \text{ Т.к. } \frac{3}{7} < \frac{19}{8}; \text{ а } 3 > 1;$$

$$\text{б)} 0,4^{-2,7} = \left( \frac{5}{2} \right)^{2,7} = \left( \frac{5}{2} \right)^{\frac{189}{70}} > \left( \frac{5}{2} \right)^{\frac{15}{7}} = \left( \frac{5}{2} \right)^{\frac{150}{70}}, \text{ Т.к. } \frac{189}{70} > \frac{150}{70}; \text{ а } \frac{5}{2} > 1;$$

$$\text{в)} \sqrt[3]{6^5} = 6^{\frac{5}{3}} = 6^{\frac{50}{30}} < 6^{1,7} = 6^{\frac{51}{30}}, \text{ Т.к. } \frac{50}{30} < \frac{51}{30}; \text{ а } 6 > 1;$$

$$\text{г)} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{5}{3}} = \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{35}{21}} < \sqrt[7]{\frac{1}{32}} = \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{5}{7}} = \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{15}{21}}, \text{ Т.к. } \frac{35}{21} > \frac{15}{21}, \text{ а } \frac{1}{2} < 1.$$

$$437. \text{a)} 81^{-0.75} + \left(\frac{1}{125}\right)^{-\frac{1}{3}} - \left(\frac{1}{32}\right)^{-\frac{3}{5}} = (3^4)^{-0.75} + (5^{-3})^{\frac{1}{3}} - (2^{-5})^{\frac{3}{5}} = \frac{1}{27} - 3 = -2 \frac{26}{27};$$

$$\text{б)} 0,001^{\frac{1}{3}} - (-2)^{-2} \cdot 64^{\frac{2}{3}} - 8^{-\frac{1}{3}} + (9^0)^2 = (10^{-3})^{\frac{1}{3}} - 2^{-2} \cdot 2^4 - (2^3)^{\frac{4}{3}} + 1 = \\ = 10 - 2^2 - 2^{-4} + 1 = 7 - \frac{1}{16} = 6 \frac{15}{16}.$$

$$\text{в)} 27^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{1}{16}\right)^{-0.75} - 25^{0.5} = (3^3)^{\frac{2}{3}} + (2^{-4})^{-0.75} - (5^2)^{0.5} = 3^2 + 2^3 - 5 = 12;$$

$$\text{г)} (-0,5)^{-4} - 625^{0.25} - \left(2 \frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} + 19(-3)^{-3} = (2^1)^4 - (5^4)^{0.25} - \\ - (3^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot (2^{-2})^{\frac{3}{2}} - 19 \cdot 3^{-3} = 2^4 - 5 - 3^{-3} \cdot 2^3 - \frac{19}{27} = 11 - \frac{8}{27} - \frac{19}{27} = 11 - 1 = 10.$$

**438.**

$$\text{а)} \frac{\frac{a-1}{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt[4]{a}}{\sqrt{a} + 1} \cdot a^{\frac{1}{4}} + 1}{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} = \frac{(\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}+1)}{a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{a} + 1} + 1 = \sqrt{a} - 1 + 1 = \sqrt{a};$$

б)

$$\left( \frac{\sqrt[4]{x^3} - \sqrt[4]{x}}{1 - \sqrt{x}} + \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}} \right)^2 \cdot \left( 1 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} \right)^{-\frac{1}{2}} = \left( \frac{x - \sqrt{x} + 1 - x}{(1 - \sqrt{x})\sqrt[4]{x}} \right)^2 \cdot \left( \frac{x\sqrt{x} + 2x + \sqrt{x}}{x\sqrt{x}} \right)^{-\frac{1}{2}} = \\ = x^{-\frac{1}{2}} \left( \frac{x + 2\sqrt{x} + 1}{x} \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{\left( (\sqrt{x} + 1)^2 \right)^{-\frac{1}{2}}}{\frac{1}{x^2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{x} + 1},$$

$$\text{в)} \frac{\frac{4}{a^3} - \frac{1}{27a^3b}}{\frac{2}{a^3} + \frac{1}{3a^3b^3} + \frac{2}{9b^3}} \cdot \left( 1 - 3\sqrt[3]{\frac{b}{a}} \right) - \sqrt[3]{a^2} = \frac{a^{\frac{1}{3}} \left( \frac{1}{a^3} - 3b^{\frac{1}{3}} \right) \left( \frac{2}{a^3} + 3a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + 9b^{\frac{2}{3}} \right)}{\frac{2}{a^3} + \frac{1}{3a^3b^3} + \frac{2}{9b^3}}.$$

$$\cdot \left( \frac{\frac{1}{a^3}}{\frac{1}{a^3} - 3b^{\frac{1}{3}}} \right) - \sqrt[3]{a^2} = \frac{a^{\frac{1}{3}} \left( \frac{1}{a^3} - 3b^{\frac{1}{3}} \right) \cdot a^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{a^3} - 3b^{\frac{1}{3}}} - a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{2}{3}} = 0;$$

$$\text{г) } \left( \frac{1}{m+\sqrt{2}} - \frac{m^2+4}{m^3+2\sqrt{2}} \right) \cdot \left( \frac{m}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{m} \right) = \left( \frac{m^2-m\sqrt{2}+2-m^2-4}{(m+\sqrt{2})(m^2-m\sqrt{2}+2)} \right) \times \\ \times \left( \frac{m^2-\sqrt{2}m+2}{2m} \right) = -\frac{\sqrt{2}(m+\sqrt{2})(m^2-m\sqrt{2}+2)}{(m+\sqrt{2})(m^2-m\sqrt{2}+2) \cdot 2m} = -\frac{\sqrt{2}}{2m}.$$

$$\textbf{439. а) } \frac{1}{8} \sqrt[7]{2^5 ax^3} = 2^{-3} \cdot 2^{\frac{5}{7}} \cdot a^{\frac{1}{7}} \cdot x^{\frac{3}{7}} = 2^{-2\frac{2}{7}} a^{\frac{1}{7}} x^{\frac{3}{7}};$$

$$\text{б) } \sqrt[3]{a^2 \cdot \sqrt[4]{a}} = a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{12}} = a^{\frac{3}{4}}; \quad \text{в) } \sqrt[7]{b^3} \cdot \sqrt[4]{b} = b^{\frac{3}{7}} \cdot b^{\frac{1}{4}} = b^{\frac{19}{28}};$$

$$\text{г) } \frac{1}{3} \cdot \sqrt[4]{27\sqrt[3]{x}} = 3^{-1} \cdot 3^{\frac{3}{4}} \cdot x^{\frac{1}{12}} = 3^{-\frac{1}{4}} \cdot x^{\frac{1}{12}}.$$

$$\textbf{440. а) } 3 \cdot 5^{-\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{3^5} \cdot \sqrt[5]{2^{-3}} = \sqrt[5]{\frac{243}{8}} = \sqrt[5]{30 \frac{3}{8}}; \quad \text{б) } a^{\frac{3}{4}} : b^{\frac{2}{5}} = a^{\frac{15}{20}} \cdot b^{-\frac{8}{20}} = \sqrt[20]{\frac{a^{15}}{b^8}};$$

$$\text{в) } 2b^{-\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{b^{-2}} = \sqrt[3]{\frac{8}{b^2}}; \quad \text{г) } b^{\frac{1}{3}} c^{\frac{2}{7}} = b^{\frac{7}{21}} \cdot c^{\frac{6}{21}} = \sqrt[21]{b^7 c^6}.$$

$$\textbf{441. а) } (\sqrt{3})^{-\frac{5}{6}} = 3^{-\frac{5}{12}}, \sqrt[3]{3^{-1} \sqrt[4]{\frac{1}{3}}} = 3^{-\frac{1}{3}} \cdot 3^{-\frac{1}{12}} = 3^{-\frac{5}{12}}; \quad (\sqrt{3})^{-\frac{5}{6}} = \sqrt[3]{3^{-1} \sqrt[4]{\frac{1}{3}}};$$

$$\text{б) } 3^{600} = (3^6)^{100} = 729^{100}, \quad 5^{400} = (5^4)^{100} = 625^{100}; \\ 729^{100} > 625^{100}, \text{ т.о. } 3^{600} > 5^{400};$$

$$\text{в) } \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{7}} = 2^{\frac{5}{7}}, \quad \sqrt{2} \cdot 2^{\frac{3}{14}} = 2^{\frac{5}{7}}; \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{5}{7}} = \sqrt{2} \cdot 2^{\frac{3}{14}};$$

$$\text{г) } 7^{30} = (7^3)^{10} = 343^{10}, \quad 4^{40} = (4^4)^{10} = 256^{10}; \quad 343^{10} > 256^{10}, \text{ т.о. } 7^{30} > 4^{40}.$$

**442. а)** не имеет смысла, т.к.  $a < 0$ ;

$$\text{б) } (-2)^{-4} = \frac{1}{(-2)^4} = \frac{1}{16} - \text{ выражение имеет смысл;}$$

$$\text{в) } 5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt{125} - \text{ выражение имеет смысл;}$$

**г)** не имеет смысла, т.к.  $x < 0$ .

$$\textbf{443. а) } x+1 > 0 \text{ при } x > -1, D\left(y = (x+1)^{-\frac{3}{x}}\right) = (-1; \infty);$$

$$\text{б) } x^{\frac{3}{5}} \text{ имеет смысл только при } x \geq 0, D\left(y = x^{\frac{3}{5}}\right) = [0; \infty)$$

в)  $x^{-\frac{3}{4}}$  имеет смысл при  $x > 0$ ,  $D\left(y = x^{-\frac{3}{4}}\right) = (0; \infty)$

г)  $x - 5 \geq 0$  при  $x \geq 5$ ,  $D\left(y = (x - 5)^{\frac{2}{3}}\right) = [5; \infty)$ .

**444.**

а)  $\left(\frac{1}{a^6}\right)^6 = a$  при  $a \geq 0$ ;

б)  $(a^4)^{\frac{1}{4}} = |a| = -a$  при  $a \leq 0$ ;

в)  $(a^8)^{\frac{1}{8}} = |a| = \frac{1}{|a|}$  при  $a = \pm 1$ ;

г)  $(a^{0.7})^{\frac{3}{7}} = \left(a^{\frac{7}{10}}\right)^{\frac{10}{7}} = a = -a$


при  $a = 0$ .

## § 10. Показательная и логарифмическая функции


### 35. Показательная функция

**445.**


а)  $y = 4^x$ ;  $D(y) = R$ ,  $E(y) = (0; \infty)$ ,  $y(x)$  возрастает на  $R$ ;  
 $y(0) = 1$ ,  $y(1) = 4$ ;




б)  $y = 0,2^x$ ;  $D(y) = R$ ,  $E(y) = (0; \infty)$ ,  $y(x)$  убывает на  $R$ ;  $y(-1)=5$ ,  $y(0)=1$ ;



в)  $y = 0,7^x$ ;  $D(y) = R$ ,  $E(y) = (0; \infty)$ ,  $y(x)$  убывает на  $R$ ;  
 $y(0) = 1$ ,  $y(1) = 0,7$ ;



г)  $y = 2,5^x$ ;  $D(y) = \mathbb{R}$ ,  $E(y) = (0; \infty)$ ,  $y(x)$  возрастает на  $\mathbb{R}$ ;  
 $y(0) = 1$ ,  $y(1) = 2,5$ .



**446.** а)  $-2^x < 0$  при  $x \in \mathbb{R}$ :  $E(y = -2^x) = (-\infty; 0)$ ;

б)  $\left(\frac{1}{3}\right)^x + 1 > 1$  при  $x \in \mathbb{R}$ :  $E\left(y = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1\right) = (1; \infty)$ ;

в)  $-\left(\frac{1}{4}\right)^x < 0$  при  $x \in \mathbb{R}$ :  $E\left(y = -\left(\frac{1}{4}\right)^x\right) = (-\infty; 0)$ ;

г)  $5^x - 2 > -2$  при  $x \in \mathbb{R}$ :  $E(y = 5^x - 2) = (-2; \infty)$ .

**447.** а)  $\left(\frac{4}{7}\right)^{-\frac{\sqrt{5}}{2}} = \left(\frac{7}{4}\right)^{\frac{\sqrt{5}}{2}} > 1$  т.к.  $\frac{\sqrt{5}}{2} > 0$  и  $\left(\frac{7}{4}\right) > 1$ ;

б)  $3^{-\sqrt{12}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{12}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{2,8}$ , т.к.  $\sqrt{12} > 2,8$  и  $\left(\frac{1}{3}\right) < 1$ ;

в)  $2,5^{-\sqrt{2}} = 0,4^{\sqrt{2}} < 1$ , т.к.  $\sqrt{2} > 0$  и  $0,4 < 1$ ;

г)  $0,3^{\frac{\sqrt{5}}{6}} < 0,3^{\frac{1}{3}} = 0,3^{\frac{2}{6}}$ , т.к.  $\sqrt{5} > 2$  и  $0,3 < 1$ .

**448.**

а)  $\left(\left(\sqrt{2}\right)^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$ ;    б)  $3^{1-2\sqrt{3}} \cdot 9^{1+\sqrt{3}} = 3^{1-2\sqrt{3}} \cdot 3^{2+2\sqrt{3}} = 3^3 = 27$ ;

в)  $8^{\sqrt{2}} : 2^{3\sqrt{2}} = 2^{3\sqrt{2}} : 2^{3\sqrt{2}} = 1$ ;    г)  $\left(3^{\sqrt[3]{8}}\right)^{\sqrt[3]{4}} = 3^{\sqrt[3]{32}} = 3^2 = 9$ .

$$449. \text{a)} a^{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^{\sqrt{2}-1} = a^{\sqrt{2}} \cdot a^{1-\sqrt{2}} = a; \quad \text{б)} x^\pi \cdot \sqrt[4]{x^2 : x^{4\pi}} = x^\pi \cdot x^{-\frac{2-4\pi}{4}} = x^{\frac{1}{2}};$$

$$\text{в)} \left(a^{\sqrt{5}}\right)^{\sqrt{5}} = a^5; \quad \text{г)} y^{\sqrt{2}} \cdot y^{1,3} : \sqrt[3]{y^{3\sqrt{2}}} = y^{\sqrt{2}+1,3-\sqrt{2}} = y^{1,3}.$$

**450.**

$$\text{а)} \frac{a^{2\sqrt{2}} - b^{2\sqrt{3}}}{\left(a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{3}}\right)^2} + 1 = \frac{\left(a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{3}}\right)\left(a^{\sqrt{2}} + b^{\sqrt{3}}\right)}{\left(a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{3}}\right)^2} + 1 = \frac{a^{\sqrt{2}} + b^{\sqrt{3}} + a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{3}}}{a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{3}}} = \\ = \frac{2a^{\sqrt{2}}}{a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{3}}};$$

**б)**

$$\frac{\left(a^{2\sqrt{3}} - 1\right)\left(a^{2\sqrt{3}} + a^{\sqrt{3}} + a^{3\sqrt{3}}\right)}{a^{4\sqrt{3}} - a^{\sqrt{3}}} = \frac{a^{\sqrt{3}}\left(a^{\sqrt{3}} - 1\right)\left(a^{\sqrt{3}} + 1\right)\left(a^{2\sqrt{3}} + a^{\sqrt{3}} + 1\right)}{a^{\sqrt{3}}\left(a^{3\sqrt{3}} - 1\right)} = \\ = \frac{\left(a^{\sqrt{3}} + 1\right)\left(a^{3\sqrt{3}} - 1\right)}{a^{3\sqrt{3}} - 1} = a^{\sqrt{3}} + 1;$$

$$\text{в)} \frac{a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{7}}}{\frac{2\sqrt{5}}{a^{\frac{3}{3}} + a^{\frac{3}{3}}b^{\frac{3}{3}} + b^{\frac{3}{3}}} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{7}}} = \frac{\left(\frac{\sqrt{5}}{a^{\frac{3}{3}} - b^{\frac{3}{3}}}\right)\left(\frac{2\sqrt{5}}{a^{\frac{3}{3}} + a^{\frac{3}{3}}b^{\frac{3}{3}} + b^{\frac{3}{3}}} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{7}}\right)}{\frac{2\sqrt{5}}{a^{\frac{3}{3}} + a^{\frac{3}{3}}b^{\frac{3}{3}} + b^{\frac{3}{3}}} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{7}}} = \\ = a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}};$$

$$\text{г)} \sqrt{\left(x^\pi + y^\pi\right)^2 - \left(\frac{1}{4^\pi} xy\right)^\pi} = \sqrt{x^{2\pi} + 2x^\pi y^\pi + y^{2\pi} - 4x^\pi y^\pi} = \\ = \sqrt{x^{2\pi} - 2x^\pi y^\pi + y^{2\pi}} = \sqrt{\left(x^\pi - y^\pi\right)^2} = |x^\pi - y^\pi|.$$

**451.**

$$\text{а)} 10^{1,41} \approx 25,7; 10^{1,42} \approx 26,3; \quad \text{б)} 10^{1,414} \approx 25,9; 10^{1,415} \approx 26,0; \\ \text{в)} 10^{2,23} \approx 169,8; 10^{2,24} \approx 173,8; \quad \text{г)} 10^{2,236} \approx 172,2; 10^{2,237} \approx 172,6.$$

$$452. 1 < \sqrt{2} < 2 \Rightarrow 10 < 10^{\sqrt{2}} < 10^2;$$

$$1,41 < \sqrt{2} < 1,42 \Rightarrow 10^{1,41} < 10^{\sqrt{2}} < 10^{1,42}; 10^{1,41} \approx 25,7 \text{ и } 10^{1,42} \approx 26,3;$$

$$\begin{aligned}
1,414 < \sqrt{2} < 1,415 \Rightarrow 10^{1,414} < 10^{\sqrt{2}} < 10^{1,415}; \quad 10^{1,414} \approx 25,9 \text{ и } 10^{1,415} \approx 26,0; \\
10^{\sqrt{2}} \approx 25,9; \quad 2 < \sqrt{5} < 3 \Rightarrow 10^2 < 10^{\sqrt{5}} < 10^3; \\
2,23 < \sqrt{5} < 2,24 \Rightarrow 10^{2,23} < 10^{\sqrt{5}} < 10^{2,24}; \quad 10^{2,23} \approx 169,8 \text{ и } 10^{2,24} \approx 173,8; \\
2,236 < \sqrt{5} < 2,237 \Rightarrow 10^{2,236} < 10^{\sqrt{5}} < 10^{2,237}; \quad 10^{2,236} \approx 172,2 \text{ и } \\
10^{2,237} \approx 172,6; \quad 10^{\sqrt{5}} \approx 172,4.
\end{aligned}$$

**453.**

a)  $\sqrt{2} > 1 \Rightarrow y = (\sqrt{2})^x$  возрастает на  $R$ ;  $0 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 \Rightarrow y = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$  убывает на  $R$ ;

б)  $0 < \sqrt{5} - 2 < 1 \Rightarrow y = (\sqrt{5} - 2)^x$  убывает на  $R$ ;

$$\frac{1}{\sqrt{5} - 2} > 1 \Rightarrow y = \frac{1}{(\sqrt{5} - 2)^x}$$
 возрастает на  $R$ ;

в)  $\frac{\pi}{3} > 1 \Rightarrow y = \left(\frac{\pi}{3}\right)^x$  возрастает на  $R$ ;  $0 < \frac{3}{\pi} < 1 \Rightarrow y = \left(\frac{3}{\pi}\right)^x$  убывает на  $R$ ;

г)  $0 < 3 - \sqrt{7} < 1 \Rightarrow y = (3 - \sqrt{7})^x$  убывает на  $R$ ;

$$\frac{1}{3 - \sqrt{7}} > 1 \Rightarrow y = \frac{1}{(3 - \sqrt{7})^x}$$
 возрастает на  $R$ .

**454. а)**  $3^{x+1} - 3 = 3(3^x - 1)$ ,  $3^x > 0$  при  $x \in R \Rightarrow 3(3^x - 1) > -3$  при  $x \in R$ ;

$$E(y = 3^{x+1} - 3) = (-3; \infty); \quad \text{б)} \quad y = |2^x - 2| = \begin{cases} 2^x - 2, & x \geq 1, \\ 2 - 2^x, & x < 1. \end{cases} \quad y(1) = 0.$$

$y(x)$  возрастает на  $[1; \infty)$  и убывает на  $(-\infty; 1]$ ;  $E(y = |2^x - 2|) = [0; \infty)$ ;

в)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 2 = 2 \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^x\right)$ ,  $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 0$  при  $x \in R \Rightarrow 2 \left(1 + \frac{1}{2^x}\right) > 2$  при  $x \in R$ ;

$$E\left(y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} + 2\right) = (2; \infty); \quad \text{г)} \quad y = 4^{|x|} = \begin{cases} 4^x, & x \geq 0, \\ \left(\frac{1}{4}\right)^x, & x < 0; \end{cases} \quad y(0) = 1. \quad y(x)$$
 возрастает на  $[0; \infty)$  и убывает на  $(-\infty; 0]$ ;  $E(y = 4^{|x|}) = [1; \infty)$ .

**455. а)**  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sin x}$ ;  $-1 \leq \sin x \leq 1$ , откуда  $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sin x} \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$ ;

$$\Rightarrow \min_R y(x) = \frac{1}{2}, \quad \max_R y(x) = 2;$$

б)  $y = 5 + 3^{|\cos x|}$ ;  $0 \leq |\cos x| \leq 1 \Rightarrow 1 \leq 3^{|\cos x|} \leq 3 \Rightarrow 6 \leq 5 + 3^{|\cos x|} \leq 8$ ;

$\min_R y(x) = 6$ ,  $\max_R y(x) = 8$ ;

в)  $y = 4^{\cos x}$ ;  $-1 \leq \cos x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{4} \leq 4^{\cos x} \leq 4 \Rightarrow \min_R y(x) = \frac{1}{4}$ ,  $\max_R y(x) = 4$ ;

г)  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{|\sin x|} - 2$ ;  $0 \leq |\sin x| \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{|\sin x|} \leq 1 \Rightarrow -1 \frac{2}{3} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{|\sin x|} - 2 \leq -1$ ;

$\min_R y(x) = -1 \frac{2}{3}$ ,  $\max_R y(x) = -1$ .

**456.** а) Т.к.  $y = \left(\frac{1}{6}\right)^x$  убывает и  $y(x) > 1$  при  $x < 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^x = 10$  при  $x < 0$ ;


б) т.к.  $y = 0,3^x$  убывает и  $y(x) < 1$  при  $x > 0 \Rightarrow 0,3^x = 0,1$  при  $x > 0$ ;

в) т.к.  $y = 10^x$  возрастает и  $y(x) > 1$  при  $x > 0 \Rightarrow 10^x = 4$  при  $x > 0$ ;

г)  $y = 0,7^x$  убывает на  $R$  и  $y(x) > 1$  при  $x < 0 \Rightarrow 0,7^x = 5$  при  $x < 0$ .

**457.**

а)  $y = 3^x$  возрастает на  $R$ ,  $y = 4 - x$  убывает на  $R \Rightarrow$  у них не более одной точки пересечения. Очевидно, это точка А(1;3)  $\Rightarrow x = 1$ .




б)  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  убывает на  $R$ ,

$y = x + 3$  возрастает на  $R$ , графики этих функций могут иметь не более одной точки пересечения. Из рисунка видно, что это точка В(-1;2), значит  $x = -1$ .

в)  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  убывает на  $R$ ,  $y = x + 1$  возрастает на  $R$ , графики этих функций могут иметь не более одной точки пересечения.


Это точка С(0;1), значит  $x = 0$ .

г)  $y = 4^x$  возрастает на  $R$ ,  $y = 5 - x$  убывает на  $R$ , графики этих функций могут иметь не более одной точки пересечения. Это точка D(1;4), значит  $x = 1$  единственное решение уравнения  $4^x = 5 - x$ .




**458.**


а)  $y = 3^{1-x}$  убывает на  $\mathbb{R}$ ,  $y = 2x - 1$  возрастает на  $\mathbb{R}$ , графики этих функций могут иметь не более одной точки пересечения. Это точка  $A(1;1)$ , значит  $x = 1$ .




б)  $y = 4^x + 1$  возрастает на  $\mathbb{R}$ ,  $y = 6 - x$  убывает на  $\mathbb{R}$ , графики этих функций могут иметь не более одной точки пересечения. Это точка  $M(1;5)$ , значит  $x = 1$ .



в)  $y = 2^x - 2$  возрастает на  $\mathbb{R}$ ,  $y = 1 - x$  убывает на  $\mathbb{R}$ , графики этих функций могут иметь не более одной точки пересечения. Это точка  $B(1;0)$ , значит  $x = 1$ .



г) при  $x \in (-\infty; 0)$   $3^{-x} > 0$ ,  $-\frac{3}{x} > 0$  и  $y = 3^{-x}$  убывает,  $y = -\frac{3}{x}$  возрастает; при  $x \in (0; \infty)$   $3^{-x} > 0$ ,  $-\frac{3}{x} < 0$ ; следовательно, графики функций  $y = 3^{-x}$  и  $y = -\frac{3}{x}$  могут иметь не более одной точки пересечения одной точки пересечения на  $(-\infty; 0)$ . Это точка  $C(-1; 3)$ , значит  $x = -1$ .



**459.**

а) нет; б) нет; в) нет; г) нет.

### 36. Решение показательных уравнений и неравенств

**460.** а)  $4^x = 64 \Leftrightarrow 4^x = 4^3 \Leftrightarrow x = 3$ ; б)  $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 27 \Leftrightarrow 3^{-x} = 3^3 \Leftrightarrow x = -3$ ;

в)  $3^x = 81 \Leftrightarrow 3^x = 3^4 \Leftrightarrow x = 4$ ; г)  $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{64} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x = \left(\frac{1}{2}\right)^6 \Leftrightarrow x = 6$ .

**461.** а)  $\left(\frac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^x = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \Leftrightarrow x = 3$ ;

б)  $\sqrt[3]{8^{x-3}} = \sqrt[3]{4^{2-x}}$ ;  $2^{\frac{3}{2}(x-3)} = 2^{\frac{2}{3}(2-x)}$ ;  $9x - 27 = 8 - 4x$ ;

$$13x = 35; \quad x = \frac{35}{13} = 2\frac{9}{13};$$

в)  $\sqrt{2^x} \cdot \sqrt{3^x} = 36 \Leftrightarrow \sqrt{6^x} = 36 \Leftrightarrow 6^{\frac{x}{2}} = 6^2 \Leftrightarrow x = 4$ ;

г)  $\left(\frac{3}{7}\right)^{3x+1} = \left(\frac{7}{3}\right)^{5x-3} \Leftrightarrow \left(\frac{7}{3}\right)^{-3x-1} = \left(\frac{7}{3}\right)^{5x-3} \Leftrightarrow -3x - 1 = 5x - 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$ .

**462.** а)  $3^{6-x} = 3^{3x-2} \Leftrightarrow 6-x=3x-2 \Leftrightarrow x = 2$ ;

б)  $\left(\frac{1}{7}\right)^{2x^2+x-0,5} = \frac{\sqrt{7}}{7} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{7}\right)^{2x^2+x-0,5} = \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow 2x^2 + x - 0,5 = 0,5 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1, \\ x_2 = 0,5; \end{cases}$

в)  $\sqrt{3^x} = 9 \Leftrightarrow 3^{\frac{x}{2}} = 3^2 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ ;

г)  $2^{x^2+2x-0,5} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 2^{x^2+2x-0,5} = 2^{2,5} \Leftrightarrow x^2 + 2x - 0,5 = 2,5 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, \\ x = 1. \end{cases}$

**463.** а)  $7^{x+2} + 4 \cdot 7^{x+1} = 539 \Leftrightarrow 11 \cdot 7^{x+1} = 539 \Leftrightarrow 7^{x+1} = 7^2 \Leftrightarrow x = 1$ .

б)  $2 \cdot 3^{x+1} - 3^x = 15 \Leftrightarrow 6 \cdot 3^x - 3^x = 15 \Leftrightarrow 3^x = 3 \Leftrightarrow x = 1$ .

в)  $4^{x+1} + 4^x = 320 \Leftrightarrow 5 \cdot 4^x = 320 \Leftrightarrow 4^x = 4^3 \Leftrightarrow x = 3$ .

г)  $3 \cdot 5^{x+3} + 2 \cdot 5^{x+1} = 77 \Leftrightarrow 75 \cdot 5^{x+1} + 2 \cdot 5^{x+1} = 77 \Leftrightarrow 5^{x+1} = 5^0 \Leftrightarrow x = -1$ .

**464.** а)  $9^x - 8 \cdot 3^x - 9 = 0 \Leftrightarrow 3^{2x} - 8 \cdot 3^x - 9 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 8t - 9 = 0$

$(t = 3^x) t > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = -1, \\ t_2 = 9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x = -1 - \text{не подходит}, \\ 3^x = 9; \end{cases} \Leftrightarrow 3^x = 9 \Leftrightarrow x = 2$ ;

б)  $100^x - 11 \cdot 10^x + 10 = 0 \Leftrightarrow 10^{2x} - 11 \cdot 10^x + 10 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 11t + 10 = 0$

$(t = 10^x) t > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = 1, \\ t_2 = 10; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10^x = 1, \\ 10^x = 10; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 1. \end{cases}$

$$\text{в)} 36^x - 4 \cdot 6^x - 12 = 0 \Leftrightarrow 6^{2x} - 4 \cdot 6^x - 12 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 4t - 12 = 0$$

$$(\text{т} = 6^x) \text{ т} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = -2, \\ t_2 = 6; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6^x = -2 - \text{не подходит}, \\ 6^x = 6; \end{cases} \Leftrightarrow 6^x = 6 \Leftrightarrow x = 1;$$

$$\text{г)} 49^x - 8 \cdot 7^x + 7 = 0 \Leftrightarrow 7^{2x} - 8 \cdot 7^x + 7 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 8t + 7 = 0$$

$$(\text{т} = 7^x) \text{ т} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = 1, \\ t_2 = 7; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7^x = 1, \\ 7^x = 7; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 1. \end{cases}$$

$$\text{465. а)} \begin{cases} 4^{x+y} = 16, \\ 4^{x+2y-1} = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4^{x+y} = 4^2, \\ 4^{x+2y-1} = 4^0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2, \\ x+2y=1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2-y, \\ y=-1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ y=-1. \end{cases}$$

$$\text{б)} \begin{cases} 6^{3x-y} = \sqrt{6}, \\ 2^{y-2x} = \frac{1}{\sqrt{2}}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6^{3x-y} = 6^{0,5}, \\ 2^{y-2x} = 2^{-0,5}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-y=0,5, \\ y-2x=-0,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=3x-0,5, \\ x=0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0, \\ y=-0,5. \end{cases}$$

$$\text{в)} \begin{cases} 3^{2y-x} = \frac{1}{81}, \\ 3^{x-y+2} = 27; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{2y-x} = 3^{-4}, \\ 3^{x-y+2} = 3^3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y-x=-4, \\ x-y+2=3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-3, \\ x=y+1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2, \\ y=-3. \end{cases}$$

$$\text{г)} \begin{cases} \left(\frac{1}{5}\right)^{4x-y} = 25, \\ 7^{9x-y} = \sqrt{7}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5^{y-4x} = 5^2, \\ 7^{9x-y} = 7^{0,5}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y-4x=2, \\ 9x-y=0,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x=2,5, \\ y=4x+2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0,5, \\ y=4. \end{cases}$$

$$\text{466. а)} \left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 27 \Leftrightarrow 3^{-x} \geq 3^3 \Leftrightarrow -x \geq 3 \Leftrightarrow x \leq -3;$$

$$\text{б)} (\sqrt{6})^x \leq \frac{1}{36} \Leftrightarrow 6^{\frac{x}{2}} \leq 6^{-2} \Leftrightarrow \frac{x}{2} \leq -2 \Leftrightarrow x \leq -4;$$

$$\text{в)} 0,2^x \leq \frac{1}{25} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^x \leq \left(\frac{1}{5}\right)^2 \Leftrightarrow x \geq 2;$$

$$\text{г)} (1,5)^x < 2,25 \Leftrightarrow (1,5)^x < 1,5^2 \Leftrightarrow x < 2.$$

$$\text{467. а)} 4^{5-2x} \leq 0,25 \Leftrightarrow 4^{5-2x} \leq 4^{-1} \Leftrightarrow 5-2x \leq -1 \Leftrightarrow x \geq 3;$$

$$\text{б)} 0,3^{7+4x} > 0,027 \Leftrightarrow 0,3^{7+4x} > 0,3^3 \Leftrightarrow 7+4x < 3 \Leftrightarrow x < -1;$$

$$\text{в)} 0,4^{2x+1} > 0,16 \Leftrightarrow 0,4^{2x+1} > 0,4^2 \Leftrightarrow 2x+1 < 2 \Leftrightarrow x < 0,5;$$

$$\text{г)} 3^{2-x} < 27 \Leftrightarrow 3^{2-x} < 3^3 \Leftrightarrow 2-x < 3 \Leftrightarrow x > -1.$$

**468.**

$$\text{а)} 3^{x+1} - 2 \cdot 3^{x-2} = 75 \Leftrightarrow 3 \cdot 3^x - \frac{2}{9} \cdot 3^x = 75 \Leftrightarrow 2 \frac{7}{9} \cdot 3^x = 75 \Leftrightarrow 3^x = 27 \Leftrightarrow x = 3;$$

$$\text{б)} \left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} - \left(\frac{1}{5}\right)^{x+1} = 4,8 \Leftrightarrow 5 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^x - \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^x = 4,8 \left(\frac{1}{5}\right)^x \cdot 4 \frac{4}{5} = 4,8 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^x = 1 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$\text{в)} 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = 162 \Leftrightarrow 40 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 0,5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x = 162 \left(\frac{1}{2}\right)^x \cdot 40,5 = 162 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x = 4 \Leftrightarrow x = -2;$$

$$\text{г)} 5 \cdot 9^x + 9^{x-2} = 406 \Leftrightarrow 5 \cdot 9^x + \frac{1}{81} \cdot 9^x = 406 \Leftrightarrow 9^x \cdot 5 \frac{1}{81} = 406 \Leftrightarrow 9^x = 81 \Leftrightarrow x = 2.$$

**469.** Т.к. функция  $a^x > 0$ , то мы имеем право делить уравнение на нее.

$$\text{а)} 2^{x-2} = 3^{x-2} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} = 1 \Leftrightarrow x-2=0 \Leftrightarrow x=2;$$

$$\text{б)} \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = \left(\frac{1}{4}\right)^{1-x} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = 4^{x-1} \Leftrightarrow 12^{x-1} = 1 \Leftrightarrow x=1;$$

$$\text{в)} 5^{x+1} = 8^{x+1} \Leftrightarrow \left(\frac{8}{5}\right)^{x+1} = 1 \Leftrightarrow x=-1;$$

$$\text{г)} 7^{x-2} = 4^{2-x} \Leftrightarrow (28)^{x-2} = 1 \Leftrightarrow x-2=0 \Leftrightarrow x=2.$$

$$\text{470. а)} 3^x + 3^{3-x} = 12 \Leftrightarrow 3^x + 27 \cdot 3^{-x} = 12 \Leftrightarrow t^2 - 12t + 27 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=3, \\ t=9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x=3, \\ 3^x=9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1=1, \\ x_2=2. \end{cases}$$

$$\text{б)} 4^{\sqrt{x-2}} + 16 = 10 \cdot 2^{\sqrt{x-2}} \Leftrightarrow 2^{2\sqrt{x-2}} - 10 \cdot 2^{\sqrt{x-2}} + 16 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 10t + 16 = 0$$

$$\left( t = 2^{\sqrt{x-2}} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} t=2, \\ t=8; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{\sqrt{x-2}}=2, \\ 2^{\sqrt{x-2}}=8; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x-2}=1, \\ \sqrt{x-2}=3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ x=11. \end{cases}$$

$$\text{в)} \left(\frac{1}{5}\right)^{1-x} - \left(\frac{1}{5}\right)^x = 4,96 \Leftrightarrow 0,2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-x} - \left(\frac{1}{5}\right)^x = 4,96$$

$$\left( t = \left(\frac{1}{5}\right)^x \right) t > 0 \Leftrightarrow t^2 + 4,96 - 0,2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -5 - \text{неподходит} \\ t = 0,04 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^x = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \Leftrightarrow x=2.$$

$$\text{г)} 4^x - 0,25^{x-2} = 15 \Leftrightarrow 4^x - 16 \cdot 4^{-x} = 15t \quad (t = 4^x) \Leftrightarrow t > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 15t - 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 - \text{не подходит} \\ t = 16; \end{cases} \Leftrightarrow 4^x = 4^2 \Leftrightarrow x=2.$$

**471.**

$$\text{а)} \begin{cases} 5^{x+y} = 125, \\ 4^{(x-y)^2-1} = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=3, \\ (x-y)^2-1=0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=3-x, \\ (2x-3)^2-1=0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 - x, \\ 2x - 3 = \pm 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 - x, \\ x_1 = 1, \\ x_2 = 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1, \\ y_1 = 2; \\ y_2 = 1. \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} x + y = 5, \\ 4^x + 4^y = 80; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x, \\ 4^x + 4^{5-x} = 80; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x, \\ 4^{2x} - 80 \cdot 4^x + 1024 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x, \\ 4^x = 64; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x, \\ x_1 = 3, \\ x_2 = 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3, \\ y_1 = 2; \\ x_2 = 2, \\ y_2 = 3. \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3^x + 3^y = 12, \\ 6^{x+y} = 216; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 - x, \\ 3^x + 27 \cdot 3^{-x} = 12; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 - x, \\ 3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 - x, \\ 3^x = 3, \\ 3^x = 9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 - x, \\ x_1 = 1, \\ x_2 = 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1, \\ y_1 = 2; \\ x_2 = 2, \\ y_2 = 1. \end{cases}$$

$$r) \begin{cases} 4^{x+y} = 128, \\ 5^{3x-2y-3} = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{2(x+y)} = 2^7, \\ 3x - 2y = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 3x - 2y = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 5x = 10; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ y = 1,5. \end{cases}$$

$$472. a) 2^{x^2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-3} \Leftrightarrow 2^{x^2} > 2^{3-2x} \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -3, \\ x > 1. \end{cases}$$

Ответ:  $(-\infty; -3) \cup (1; \infty)$ .

$$6) \left(\frac{1}{25}\right)^{2x} < (\sqrt{5})^{x^2+3,75} \Leftrightarrow 5^{-4x} < 5^{\frac{x^2+3,75}{2}} \Leftrightarrow -4x < \frac{x^2+3,75}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 8x + 3,75 > 0 . \quad x \in (-\infty; -7,5) \cup (-0,5; +\infty).$$

Ответ:  $[-3; -1]$ .

$$b) 3^{4x+3} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{x^2}{2}} \Leftrightarrow 3^{4x+3} \leq 3^{-x^2} \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3, \\ x \leq -1. \end{cases}$$

$$r) \left(\frac{1}{4}\right)^{10x} < 64^{\frac{2^2-x^2}{3}} \Leftrightarrow 4^{-10x} > 4^{8-3x^2} \Leftrightarrow 3x^2 - 10x - 8 > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{2}{3}, \\ x > 4. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \left(-\infty; -\frac{2}{3}\right) \cup (4; \infty)$$

**473.**

a)  $\left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^{x-1} > 2,5 \Leftrightarrow 2,5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x > 2,5 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x > 1 \Leftrightarrow x < 0;$

б)  $2^{2x-1} + 2^{2x-2} + 2^{2x-3} < 448 \Leftrightarrow \frac{7}{8} \cdot 2^{2x} < 448 \Leftrightarrow 4^x < 64 \cdot 8 \Leftrightarrow 4^x < 4^{4,5} \Leftrightarrow x < 4,5.$

в)  $\left(\frac{4}{3}\right)^{x+1} - \left(\frac{4}{3}\right)^x > \frac{3}{16} \Leftrightarrow \frac{1}{3} \left(\frac{4}{3}\right)^x > \frac{3}{16} \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^x > \frac{9}{16} \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^x > \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \Leftrightarrow x > -2.$

г)  $3^{x+2} + 3^{x-1} < 28 \Leftrightarrow \frac{28}{3} \cdot 3^x < 28 \Leftrightarrow 3^x < 3 \Leftrightarrow x < 1.$

**474.** а)  $\pi^x - \pi^{2x} \geq 0 \Leftrightarrow \pi^x(1 - \pi^x) \geq 0$ , т.к.  $\pi^x > 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi^x \geq 0, \\ 1 - \pi^x \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \pi^x \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 0;$$

б)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} - 10 \cdot 3^{-x} + 3 < 0 \Leftrightarrow 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - 10 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 3 < 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^x > \frac{1}{3}, \\ \left(\frac{1}{3}\right)^x < 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1, \\ x > -1; \end{cases} x \in (-1; 1);$$


в)  $4^x - 2^{x+1} - 8 > 0 \Leftrightarrow 2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 8 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x > 4, \\ 2^x < -2; \end{cases} \Leftrightarrow x > 2.$

г)  $\left(\frac{1}{36}\right)^x - 5 \cdot 6^{-x} - 6 \leq 0 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^{2x} - 5 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^x - 6 \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{1}{6}\right)^x \geq -1, \\ \left(\frac{1}{6}\right)^x \leq 6; \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^x \leq \left(\frac{1}{6}\right)^{-1} \Leftrightarrow x \geq -1.$$


**475.**

а)  $2^x \leq 3 - x$ ; т.к.  $y = 2^x$  возрастает, а  $y = 3 - x$  убывает, следовательно, у них одна точка пересечения А(1;2), и  $2^x \leq 3 - x$  при  $x \leq 1$ ;




б)  $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 2x + 5$ ; т.к.  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  – убывает, а  $y = 2x + 5$  – возрастает, то они

пересекаются только в одной точке  $B(-1; 3)$ , и  $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 2x + 5$  при  $x \geq -1$ ;




в)  $\left(\frac{1}{4}\right)^x \geq 2x + 1$ ; т.к.  $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$  – убывает, а  $y = 2x + 1$  – возрастает, то они

пересекаются только в одной точке  $C(0; 1)$ , и  $\left(\frac{1}{4}\right)^x \geq 2x + 1$  при  $x \leq 0$ ;



г)  $3^x \geq 4 - x$ ; т.к.  $y = 3^x$  – возрастает, а  $y = 4 - x$  – убывает, то они пересекаются только в одной точке  $D(1; 3)$ ,  $3^x \geq 4 - x$  при  $x \geq 1$ .



### 37. Логарифмы и их свойства

**476.**

$$\text{а)} \log_3 9 = 2; \quad \text{б)} \log_2 \frac{1}{8} = -3; \quad \text{в)} \log_4 16 = 2; \quad \text{г)} \log_5 \frac{1}{25} = -2.$$

**477.**

$$\text{а)} \log_9 3 = \frac{1}{2}; \quad \text{б)} \log_7 1 = 0; \quad \text{в)} \log_{32} 2 = \frac{1}{5}; \quad \text{г)} \log_3 \frac{1}{3} = -1.$$

**478.**

$$\text{а)} \log_{27} 9 = \frac{2}{3}; \quad \text{б)} \log_{32} 8 = \frac{3}{5}; \quad \text{в)} \log_{81} 27 = \frac{3}{4}; \quad \text{г)} \log_{125} 25 = \frac{2}{3}.$$

**479.**

a)  $\log_3 \frac{1}{81} = -4$ ,  $3^{-4} = \frac{1}{81}$ ;  
 b)  $\log_4 16 = 2$ ,  $4^2 = 16$ ;

6)  $\log_{16} 1 = 0$ ,  $16^0 = 1$ ;  
 r)  $\log_5 125 = 3$ ,  $5^3 = 125$ .

**480.**

a)  $\log_5 0,04 = -2$ ,  $5^{-2} = 0,04$ ;  
 b)  $\lg 0,01 = -2$ ,  $10^{-2} = 0,01$ ;

6)  $\log_7 343 = 3$ ,  $7^3 = 343$ ;  
 r)  $\log_3 \frac{1}{243} = -5$ ,  $3^{-5} = \frac{1}{243}$ .

**481.**

a)  $\log_{\sqrt{2}} 8 = 6$ ,  $(\sqrt{2})^6 = 8$ ;

6)  $\log_{\sqrt{\frac{1}{3}}} 27 = -6$ ,  $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-6} = 27$ ;

b)  $\log_{\frac{1}{3}} 9 = -2$ ,  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$ ;

r)  $\log_{0,5} 4 = -2$ ,  $0,5^{-2} = 4$ .

**482.** a)  $\log_{2\sqrt{2}} 128 = \frac{14}{3}$ ,  $(2\sqrt{2})^{\frac{14}{3}} = \left(2^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{14}{3}} = 128$ ;

6)  $\log_{0,2} 0,008 = 3$ ,  $0,2^3 = 0,008$ ;

b)  $\log_{\sqrt{5}} 0,2 = -2$ ,  $(\sqrt{5})^{-2} = 0,2$ ; r)  $\log_{0,2} 125 = -3$ ,  $0,2^{-3} = 5^3 = 125$ .

**483.**

a)  $\log_5 25 = 2$ ,  $\log_5 \frac{1}{5} = -1$ ,  $\log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}$ ; 6)  $\log_8 64 = 2$ ,  $\log_8 \frac{1}{8} = -1$ ,  $\log_8 2 = \frac{1}{3}$ ;

b)  $\log_2 16 = 4$ ,  $\log_2 \frac{1}{4} = -2$ ,  $\log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$ ;

r)  $\log_3 27 = 3$ ,  $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ ,  $\log_3 \sqrt{3} = \frac{1}{2}$ .

**484.**

a)  $\log_3 x = -1$ ,  $x = 3^{-1} = \frac{1}{3}$ ;

6)  $\log_{\frac{1}{6}} x = -3$ ,  $x = \left(\frac{1}{6}\right)^{-3} = 6^3 = 216$ ;

b)  $\log_5 x = 2$ ,  $x = 5^2 = 125$ ;

r)  $\log_7 x = -2$ ,  $x = 7^{-2} = \frac{1}{49}$ .

**485.**

a)  $\log_4 x = -3$ ,  $x = 4^{-3} = \frac{1}{64}$ ;

6)  $\log_{\sqrt{5}} x = 0$ ,  $x = (\sqrt{5})^0 = 1$ ;

b)  $\log_{\frac{1}{7}} x = 1$ ,  $x = \left(\frac{1}{7}\right)^1 = \frac{1}{7}$ ;

r)  $\log_{\frac{1}{2}} x = -3$ ,  $x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$ .

**486.** a)  $\log_x 81 = 4$ ,  $x^4 = 3^4$ ,  $x = 3$ ;      6)  $\log_x \frac{1}{16} = 2$ ,  $x^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2$ ,  $x = \frac{1}{4}$ ;

b)  $\log_x \frac{1}{4} = -2$ ,  $x^{-2} = 2^{-2}$ ,  $x = 2$ ;      r)  $\log_x 27 = 3$ ,  $x^3 = 3^3$ ,  $x = 3$ .

**487.** a)  $\log_4 x = 2$ ,  $x = 4^2 = 16$ ;  $\log_4 16 = 2$ ;  $\log_4 x = \frac{1}{2}$ ,  $x = 4^{\frac{1}{2}} = 2$ :  $\log_4 2 = \frac{1}{2}$ ;

$\log_4 x = 1$ ,  $x = 4^1 = 4$ ;  $\log_4 4 = 1$ ;  $\log_4 x = 0$ ,  $x = 4^0 = 1$ :  $\log_4 1 = 0$ ;

6)  $\log_3 x = 3$ ,  $x = 3^3 = 27$ ;  $\log_3 27 = 3$ ;  $\log_3 x = -1$ ,  $x = 3^{-1} = \frac{1}{3}$ :  $\log_3 \frac{1}{3} = -1$ ;

$\log_3 x = -3$ ,  $x = 3^{-3} = \frac{1}{27}$ ;  $\log_3 \frac{1}{27} = -3$ ;  $\log_3 x = 1$ ,  $x = 3^1 = 3$ ;  $\log_3 3 = 1$ ;

b)  $\log_2 x = 3$ ,  $x = 2^3 = 8$ ;  $\log_2 8 = 3$ ;  $\log_2 x = \frac{1}{2}$ ,  $x = \sqrt{2}$ ;  $\log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$ ;

$\log_2 x = 0$ ,  $x = 2^0 = 1$ ;  $\log_2 1 = 0$ ;  $\log_2 x = -1$ ,  $x = 2^{-1} = \frac{1}{2}$ ;  $\log_2 \frac{1}{2} = -1$ ;

r)  $\log_5 x = 1$ ,  $x = 5^1 = 5$ ;  $\log_5 5 = 1$ ;  $\log_5 x = -2$ ,  $x = 5^{-2} = \frac{1}{25}$ ;  $\log_5 \frac{1}{25} = -2$ ;

$\log_5 x = 0$ ,  $x = 5^0 = 1$ :  $\log_5 1 = 0$ ;  $\log_5 x = 3$ ,  $x = 5^3 = 125$ :  $\log_5 125 = 3$ .

**488.**

a)  $1,7^{\log_{1,7} 2} = 2$ ;      6)  $\pi^{\log_{\pi} 5,2} = 5,2$ ;      b)  $2^{\log_2 5} = 5$ ;      r)  $3,8^{\log_{3,8} 11} = 11$ .

**489.**

a)  $5^{1+\log_5 3} = 5 \cdot 5^{\log_5 3} = 5 \cdot 3 = 15$ ;      6)  $10^{1-\lg 2} = \frac{10}{10^{\lg 2}} = \frac{10}{2} = 5$ ;

b)  $\left(\frac{1}{7}\right)^{1+\log_{\frac{1}{7}} 2} = \frac{1}{7} \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^{\log_{\frac{1}{7}} 2} = \frac{1}{7} \cdot 2 = \frac{2}{7}$ ;      r)  $3^{2-\log_3 18} = \frac{9}{3^{\log_3 18}} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$ .

**490.**

a)  $4^{2 \log_4 3} = \left(4^{\log_4 3}\right)^2 = 3^2 = 9$ ;      6)  $5^{-3 \log_5 \frac{1}{2}} = 5^{\log_5 \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$ ;

b)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{4 \log_{\frac{1}{2}} 3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}} 3^4} = 3^4 = 81$ ;      r)  $6^{-2 \log_6 5} = 6^{\log_6 5^{-2}} = 5^{-2} = \frac{1}{25}$ .

**491.** a)  $\log_3 \left( \sqrt[5]{a^3 b} \right)^{\frac{2}{3}} = \log_3 \left( a^{\frac{2}{5}} b^{\frac{2}{15}} \right) = \log_3 a^{\frac{2}{5}} + \log_3 b^{\frac{2}{15}} = \frac{2}{5} \log_3 a + \frac{2}{15} \log_3 b =$

$$= \frac{2}{5} \left( \log_3 a + \frac{\log_3 b}{3} \right);$$

$$6) \log_3 \left( \frac{a^{10}}{\sqrt[6]{b^5}} \right)^{-0,2} = \log_3 \left( a^{-2} \cdot b^{\frac{1}{6}} \right) = \log_3 a^{-2} + \log_3 b^{\frac{1}{6}} = -2 \log_3 a + \frac{1}{6} \log_3 b;$$

$$b) \log_3 (9a^4\sqrt[5]{b}) = \log_3 9 + \log_3 a^4 + \log_3 b^{\frac{1}{5}} = 2 + 4 \log_3 a + \frac{1}{5} \log_3 b;$$

$$r) \log_3 \frac{b^2}{27a^7} = \log_3 b^2 - \log_3 27 - \log_3 a^7 = 2 \log_3 b - 3 - 7 \log_3 a.$$

$$\begin{aligned} 492. \text{ a) } \lg \left( 100\sqrt{ab^3c} \right) &= \lg 100 + \lg a^{\frac{1}{2}} + \lg b^{\frac{3}{2}} + \lg c^{\frac{1}{2}} = 2 + \frac{1}{2} \lg a + \frac{3}{2} \lg b + \frac{1}{2} \lg c = \\ &= 2 + \frac{1}{2} \lg(ac) + \frac{3}{2} \lg b; \end{aligned}$$

$$6) \lg \left( \frac{a^5}{0,1c^2\sqrt{b}} \right) = \lg a^5 - \lg 0,1 - \lg c^2 - \lg b^{\frac{1}{2}} = 5 \lg a + 1 - 2 \lg c - \frac{1}{2} \lg b;$$

$$b) \lg \left( \sqrt[3]{10a^3b^4c^{-2}} \right) = \lg 10^{\frac{1}{3}} + \lg a^{\frac{1}{3}} + \lg b^{\frac{4}{3}} + \lg c^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \lg a + 4 \lg b - \frac{1}{2} \lg c;$$

$$r) \lg \frac{0,01c^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{2}}b^3} = \lg 0,01 + \lg c^{\frac{2}{3}} - \lg a^{\frac{1}{2}} - \lg b^3 = -2 + \frac{2}{3} \lg c - \frac{1}{2} \lg a - 3 \lg b.$$

$$493. \text{ a) } \lg \left( 10^3a^4b^{\frac{1}{2}}c^{-3} \right) = \lg 10^3 + \lg a^4 + \lg b^{\frac{1}{2}} + \lg c^{-3} = 3 + 4 \lg a + \frac{1}{2} \lg b - 3 \lg c;$$

$$6) \lg \frac{b^{\frac{2}{3}}}{10^5a^6c^5} = \lg b^{\frac{2}{3}} - \lg 10^5 - \lg a^6 - \lg c^5 = \frac{2}{3} \lg b - 5 - 6 \lg a - 5 \lg c;$$

$$b) \lg \left( 10^{-4}a^2b^5c^{\frac{2}{3}} \right) = \lg 10^{-4} + \lg a^2 + \lg b^5 + \lg c^{\frac{2}{3}} = -4 + 2 \lg a + 5 \lg b + \frac{2}{3} \lg c;$$

$$r) \lg \left( \frac{c^{\frac{7}{4}}}{10^7a^{\frac{2}{3}}b^8} \right) = \lg c^{\frac{7}{4}} - \lg 10^7 - \lg a^{\frac{2}{3}} - \lg b^8 = \frac{7}{4} \lg c - 7 - \frac{2}{3} \lg a - 8 \lg b.$$

$$494. \text{ a) } \log_5 72 = \log_5 8 + \log_5 9 = 3 \log_5 2 + 2 \log_5 3 = 3a + 2b;$$

$$6) \log_5 15 = \log_5 5 + \log_5 3 = 1 + b;$$

$$b) \log_5 12 = \log_5 2^2 + \log_5 3 = 2 \log_5 2 + \log_5 3 = 2a + b;$$

$$r) \log_5 30 = \log_5 2 + \log_5 3 + \log_5 5 = a + b + 1.$$

**495.** a)  $\lg 8 + \lg 125 = \lg(8 \cdot 125) = \lg 10^3 = 3$ ; б)  $\log_2 7 - \log_2 \frac{7}{16} = \log_2 2^4 = 4$ ;

б)  $\log_{12} 4 + \log_{12} 36 = \log_{12} 12^2 = 2$ ; г)  $\lg 13 - \lg 130 = \lg 10^{-1} = -1$ .

**496.** а)  $\frac{\lg 8 + \lg 18}{2 \lg 2 + \lg 3} = \frac{\lg 144}{\lg 12} = \frac{2 \lg 12}{\lg 12} = 2$ ;      б)  $\frac{\log_3 16}{\log_3 4} = \frac{2 \log_3 4}{\log_3 4} = 2$ ;

б)  $\log_2 11 - \log_2 44 = \log_2 \frac{1}{4} = -2$ ;

г)  $\log_{0,3} 9 - 2 \log_{0,3} 10 = \log_{0,3} \frac{9}{100} = \log_{0,3} 0,3^2 = 2$ .

**497.** а)  $3 \log_6 2 + 0,5 \log_6 25 - 2 \log_6 3 = \log_6 8 + \log_6 5 - \log_6 9 = \log_6 \frac{40}{9}$ ;

$\log_6 x = \log_6 \frac{40}{9}, x = 4 \frac{4}{9}$ ;

б)  $\frac{1}{2} \lg 5a - 3 \lg b + 4 \lg c = \lg(5a)^{\frac{1}{2}} - \lg b^3 + \lg c^4 = \lg \left( \frac{(5a)^{\frac{1}{2}} \cdot c^4}{b^3} \right)$ ;

$\lg x = \lg \left( \frac{(5a)^{\frac{1}{2}} \cdot c^4}{b^3} \right), x = \frac{(5a)^{\frac{1}{2}} \cdot c^4}{b^3}$ ;

в)  $5 \lg m + \frac{2}{3} \lg n - \frac{1}{4} \lg p = \lg m^5 + \lg n^{\frac{2}{3}} - \lg p^{\frac{1}{4}} = \lg \left( \frac{m^5 \cdot n^{\frac{2}{3}}}{p^{\frac{1}{4}}} \right)$ ;

$\lg x = \lg \left( \frac{m^5 n^{\frac{2}{3}}}{p^{\frac{1}{4}}} \right), x = \frac{m^5 n^{\frac{2}{3}}}{p^{\frac{1}{4}}}$ ;

г)  $\frac{1}{4} \log_4 216 - 2 \log_4 10 + 4 \log_4 3 = \log_4 6 - \log_4 100 + \log_4 81 =$

$= \log_4 \left( \frac{6 \cdot 81}{100} \right) = \log_4 4,86; \log_4 x = \log_4 4,86, x = 4,86$ .

**498.**

а)  $\log_{\frac{1}{2}} 3 + \log_3 \frac{1}{2} + 2 = \frac{\log_3 3}{\log_3 \frac{1}{2}} + \log_3 \frac{1}{2} + 2 = \frac{\left( \log_3 \frac{1}{2} \right)^2 + 2 \log_3 \frac{1}{2} + 1}{\log_3 \frac{1}{2}} =$

$$= -\frac{\left(\log_3 \frac{1}{2} + 1\right)^2}{\log_3 2} < 0, \text{ откуда } \log_{\frac{1}{2}} 3 + \log_3 \frac{1}{2} < -2;$$

$$6) 4^{\log_5 7} = \left(5^{\log_5 4}\right)^{\log_5 7} = \left(5^{\log_5 7}\right)^{\log_5 4} = 7^{\log_5 4};$$

$$\begin{aligned} b) \log_3 7 + \log_7 3 - 2 &= \log_3 7 + \frac{\log_3 3}{\log_3 7} - 2 = \frac{(\log_3 7)^2 - 2 \log_3 7 + 1}{\log_3 7} = \\ &= \frac{(\log_3 7 - 1)^2}{\log_3 7} > 0, \text{ откуда } \log_3 7 + \log_7 3 > 2; \end{aligned}$$

$$g) 3^{\log_2 5} = \left(2^{\log_2 3}\right)^{\log_2 5} = \left(2^{\log_2 5}\right)^{\log_2 3} = 5^{\log_2 3}.$$

### 38. Логарифмическая функция

499. a)  $10 - 5x > 0 \Leftrightarrow x < 2$ ;  $D(y) = (-\infty; 2)$ ;


б)  $9 - x^2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -3, \\ x < 3; \end{cases} D(y) = (-3; 3)$ ;

в)  $x - 4 > 0 \Leftrightarrow x > 4$ ;  $D(y) = (4; \infty)$ ;


г)  $x^2 - 16 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x < -4; \end{cases} D(y) = (-\infty; -4) \cup (4; \infty)$ .

500.

a)  $6 + x - x^2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -2, \\ x < 3; \end{cases} D(y) = (-2; 3)$ ;



$$\frac{2x+5}{x-1} > 0; D(y) = (-\infty; -2,5) \cup (1; \infty);$$



$$\frac{2+3x}{5-2x} > 0 \Leftrightarrow \frac{2+3x}{2x-5} < 0; D(y) = \left(-\frac{2}{3}; 2,5\right);$$

г)  $x^2 - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ x > 3. \end{cases} D(y) = (-\infty; -1) \cup (3; \infty)$ .

501. а)  $\log_2 3,8 < \log_2 4,7$ , т.к.  $3,8 < 4,7$  и  $2 > 1$ ;

б)  $\log_{\frac{1}{3}} 0,15 > \log_{\frac{1}{3}} 0,2$ , т.к.  $0,15 < 0,2$  и  $\frac{1}{3} < 1$ ;

в)  $\log_3 5,1 > \log_3 4,9$ , т.к.  $5,1 > 4,9$  и  $3 > 1$ ;

г)  $\log_{0,2} 1,8 > \log_{0,2} 2,1$ , т.к.  $1,8 < 2,1$  и  $0,2 < 1$ .

**502.** а)  $\log_{\sqrt{2}} 3 > 1 = \log_{\sqrt{2}} \sqrt{2}$  т.к.  $3 > \sqrt{2}$  и  $\sqrt{2} > 1$ ;

б)  $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} 1,9 > \log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} 2,5$ , т.к.  $1,9 < 2,5$  и  $\frac{1}{\sqrt{3}} < 1$ ;

в)  $\log_{\pi} 2,9 < 1 = \log_{\pi} \pi$ , т.к.  $2,9 < \pi$  и  $\pi > 1$ ;

г)  $\log_{0,7} \sqrt{2} < \log_{0,7} 0,3$ , т.к.  $\sqrt{2} > 0,3$  и  $0,7 < 1$ .


**503.** а)  $\log_2 10 > \log_2 8 = 3$ ,  $\log_5 30 < \log_5 125 = 3 \Rightarrow \log_2 10 > \log_5 30$ ;

б)  $\log_{0,3} 2 < \log_{0,3} \sqrt{0,3} = \frac{1}{2}$ ,  $\log_5 3 > \log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2} \Rightarrow \log_{0,3} 2 < \log_5 3$ ;

в)  $\log_3 5 > \log_3 3 = 1$ ,  $\log_7 4 < \log_7 7 = 1 \Rightarrow \log_3 5 > \log_7 4$ ;


г)  $\log_3 10 > \log_3 9 = 2$ ,  $\log_8 57 < \log_8 64 = 2 \Rightarrow \log_3 10 > \log_8 57$ .

**504.** а)  $y = \log_3 x$ ;  $D(y) = (0; \infty)$ ,  $E(y) = R$ ,  $y(x)$  возрастает на  $(0; \infty)$ ;  
 $y(1) = 0$ ,  $y(3) = 1$ ,  $y(9) = 2$ ;




б)  $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ ;  $D(y) = (0; \infty)$ ,  $E(y) = R$ ,  $y(x)$  убывает на  $(0; \infty)$ ;

$y\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ ,  $y(1) = 0$ ,  $y(2) = -1$ ;




в)  $y = \log_4 x$ ;  $D(y) = (0; \infty)$ ,  $E(y) = R$ ,  $y(x)$  возрастает на  $(0; \infty)$ ;  
 $y(1) = 0$ ,  $y(4) = 1$ ,  $y(16) = 2$ ;



г)  $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ ;  $D(y) = (0; \infty)$ ,  $E(y) = R$ ,  $y(x)$  убывает на  $(0; \infty)$ ;

$y\left(\frac{1}{3}\right) = -1$ ,  $y(1) = 0$ ,  $y(3) = -1$ ,  $y(9) = -2$ .



**505.** а)  $\sin x > 0$  при  $2\pi k < x < \pi + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ;  $D(y) = (2\pi k; \pi + 2\pi k | k \in \mathbb{Z})$ ;  
 б)  $2^x - 1 > 0 \Leftrightarrow 2^x > 2^0 \Leftrightarrow x > 0$ ;  $D(y) = (0; \infty)$ ;

в)  $\cos x > 0$  при  $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

$$D(y) = \left( -\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n \middle| n \in \mathbb{Z} \right);$$

г)  $1 - 3^x > 0 \Leftrightarrow 3^x < 3^0 \Leftrightarrow x < 0$ ;  $D(y) = (-\infty; 0)$ .

**506.** а)  $\log_2 2 \sin \frac{\pi}{15} + \log_2 \cos \frac{\pi}{15} = \log_2 \sin \frac{2\pi}{15}$ ;


б)

$$\begin{aligned} \log_4 \left( \sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{3} \right) + \log_4 \left( \sqrt[3]{49} + \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{9} \right) &= \log_4 \left( \left( \sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{3} \right) \left( \sqrt[3]{7^2} + \sqrt[3]{7 \cdot 3} + \sqrt[3]{3} \right) \right) = \\ &= \log_4 4 = 1; \end{aligned}$$


в)  $\lg \operatorname{tg} 4 + \lg \operatorname{ctg} 4 = \lg (\operatorname{tg} 4 \operatorname{ctg} 4) = \lg 1 = 0$ ;

г)  $\log_{\pi} (5 + 2\sqrt{6}) + \log_{\pi} (5 - 2\sqrt{6}) = \log_{\pi} (25 - 24) = \log_{\pi} 1 = 0$ ;


**507.** а)  $y = \log_3(x - 2)$ ;




б)  $y = -\log_{\frac{1}{2}} x$ ;



в)  $y = \log_2(x + 1)$ ;



г)  $y = \log_{\frac{1}{3}} x + 2$ .



**508.** a)  $\log_3 x = 2\log_9 6 - \log_9 12 \Leftrightarrow \log_3 x = \log_9 3 \Leftrightarrow \log_3 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \sqrt{3};$

б)  $\log_{\frac{1}{2}} x = \log_{0,2} 35 - 2\log_{0,2} 25\sqrt{7} \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = \log_{0,2} \frac{35}{625 \cdot 7} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = \log_{0,2} 0,008 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{8};$$


в)

$$\log_5 x = \frac{1}{2}\log_3 144 + \log_3 0,75 \Leftrightarrow \log_5 x = \log_3(12 \cdot 0,75) \Leftrightarrow \log_5 x = 2 \Leftrightarrow x = 25;$$


г)  $\log_{\pi} x = 3\log_{0,1} 4 + 2\log_{0,1} 1 \frac{1}{2} \Leftrightarrow \log_{\pi} x = \log_{0,1} \frac{64 \cdot 25}{16} \Leftrightarrow \log_{\pi} x = -2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\pi^2}.$

**509.** В этом номере всегда одна функция возрастает, авторая убывает, вследствии чего они могут пересекаться лишь в одной точке.


а)  $\lg x = 1 - x$ ; графики функций  $y = \lg x$  и  $y = 1 - x$  пересекаются в т. А(1;0), т.о.  $x = 1$ .



б)  $\log_{\frac{1}{3}} x = x - 4$ ; Графики функций  $y = x - 4$  и  $y = \log_{\frac{1}{3}} x$  пересекаются в т. В(3,-1), т.о.  $x = 3$ .




в)  $\log_{\frac{1}{5}} x = x - 6$ ;



Графики функций  $y = x - 6$  и  $y = \log_{\frac{1}{5}} x$  пересекаются в т. С(5,-1), т.о.  $x=5$ .

г)  $\log_2 x = 3 - x$ ; графики функций  $y = \log_2 x$  и  $y = 3 - x$  пересекаются в т.Д(2;1), т.о.  $x = 2$ .



**510.** а) нет; б) нет; в) нет; г) нет.

**511.**

а)  $f(x) = \log_{\frac{1}{4}} x$  убывает на  $D(f)$ , поэтому  $\max_{[1;4]} f(x) = f(1) = 0$ ,

$$\min_{[1;4]} f(x) = f(4) = -1;$$

б)  $f(x) = \log_9 x$  возрастает на  $D(f)$  поэтому

$$\min_{[\frac{1}{9};9]} f(x) = f\left(\frac{1}{9}\right) = -1, \quad \max_{[\frac{1}{9};9]} f(x) = f(9) = 1;$$

в)  $f(x) = \log_5 x$  возрастает на  $D(f)$  поэтому

$$\min_{[\frac{1}{5};1]} f(x) = f\left(\frac{1}{5}\right) = -1, \quad \max_{[\frac{1}{5};1]} f(x) = f(x) = 0;$$

г)  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$  убывает на  $D(f)$  поэтому

$$\max_{[\frac{1}{2};4]} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \quad \min_{[\frac{1}{2};4]} f(x) = f(4) = -2.$$

### 39. Решение логарифмических уравнений и неравенств

**512.** а)  $9^x = 0,7 \Leftrightarrow \log_9 9^x = \log_9 0,7 \Leftrightarrow x = \log_9 0,7$ ;

б)  $(0,3)^x = 7 \Leftrightarrow \log_{0,3} (0,3)^x = \log_{0,3} 7 \Leftrightarrow x = \log_{0,3} 7$ ;

в)  $2^x = 10 \Leftrightarrow \log_2 2^x = \log_2 10 \Leftrightarrow x = \log_2 10$ ;

г)  $10^x = \pi \Leftrightarrow \lg 10^x = \lg \pi \Leftrightarrow x = \lg \pi$ .

**513.** а)  $\log_5 x = 2 \Leftrightarrow x = 5^2 \Leftrightarrow x = 25$ ; б)  $\log_{0,4} x = -1 \Leftrightarrow x = (0,4)^{-1} \Leftrightarrow x = 2,5$ ;

в)  $\log_9 x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = 9^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$ ; г)  $\lg x = 2 \Leftrightarrow x = 10^2 \Leftrightarrow x = 100$ .

**514.** а)  $\log_{\frac{1}{2}} (2x - 4) = -2 \Leftrightarrow 2x - 4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Leftrightarrow 2x - 4 = 4 \Leftrightarrow x = 4$ ;

$$6) \log_{\pi}(x^2+2x+3)=\log_{\pi}6 \Leftrightarrow x^2+2x+3=6 \Leftrightarrow x^2+2x-3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-3, \\ x=1. \end{cases}$$

$$b) \log_{0,3}(5+2x)=1 \Leftrightarrow 5+2x=0,3 \Leftrightarrow x=-2,35.$$

$$r) \log_2(3-x)=0 \Leftrightarrow 3-x=1 \Leftrightarrow x=2.$$

$$515. a) (0,2)^{4-x}=3 \Leftrightarrow 4-x=\log_{0,2}3 \Leftrightarrow x=4-\log_{0,2}3.$$

$$6) 5^{x^2}=7 \Leftrightarrow x^2=\log_57 \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{\log_57}.$$

$$b) 3^{2-3x}=8 \Leftrightarrow 2-3x=\log_38 \Leftrightarrow x=\frac{1}{3}(2-\log_38).$$

$$r) 7^{2x}=4 \Leftrightarrow 2x=\log_74 \Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\log_74.$$

$$516. a) \log_3x>2 \Leftrightarrow \log_3x>\log_39 \Leftrightarrow x>9.$$

$$6) \log_{0,5}x>-2 \Leftrightarrow \log_{0,5}x>\log_{0,5}25 \Leftrightarrow \begin{cases} x<25, \\ x>0. \end{cases} \text{ Итого: } (0;25).$$

$$b) \log_{0,7}x<1 \Leftrightarrow \log_{0,7}x<\log_{0,7}0,7 \Leftrightarrow x>0,7.$$

$$r) \log_{2,5}x<2 \Leftrightarrow \log_{2,5}x<\log_{2,5}6,25 \Leftrightarrow \begin{cases} x<6,25, \\ x>0. \end{cases} \text{ Итого: } (0;6,25).$$

$$517. a) \log_4(x-2)<2 \Leftrightarrow \log_4(x-2)<\log_416 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2<16, \\ x-2>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<18, \\ x>2. \end{cases}$$

$$6) \log_{\frac{1}{3}}(3-2x)>-1; \quad \log_{\frac{1}{3}}(3-2x)>\log_{\frac{1}{3}}3 \Leftrightarrow 3-2x<3 \Leftrightarrow x>0.$$

$$b) \log_5(3x+1)>2 \Leftrightarrow \log_5(3x+1)>\log_525 \Leftrightarrow 3x+1>25 \Leftrightarrow x>8.$$

$$r) \log_{\frac{1}{7}}(4x+1)<-2 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{7}}(4x+1)<\log_{\frac{1}{7}}49 \Leftrightarrow 4x+1>49 \Leftrightarrow x>12.$$

$$518. a) \log_a x = 2\log_a 3 + \log_a 5 \Leftrightarrow \log_a x = \log_a 45 \Leftrightarrow x = 45 \text{ при } a > 0 \text{ и } a \neq 1.$$

$$6) \lg(x-9) + \lg(2x-1) = 2$$

$$\begin{cases} (x-9)(2x-1)=100, \\ x-9>0, \\ 2x-1>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2-19x-91=0, \\ x>9, \\ x>0,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-3,5 - \text{не подходит} \\ x=13; \\ x>9. \end{cases} \Leftrightarrow x=13.$$

$$b) \log_a x = \log_a 10 - \log_a 2 \Leftrightarrow \log_a x = \log_a 5 \Leftrightarrow x = 5 \text{ при } a > 0 \text{ и } a \neq 1.$$

$$r) \log_3(x+1) + \log_3(x+3) = 1$$

$$\begin{cases} (x+1)(x+3)=3, \\ x+1>0, \\ x+3>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+4x+3=3, \\ x>-1, \\ x>-3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x+4)=0; \\ x>-1; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-4 - \text{не подходит} \\ x=0; \\ x>-1. \end{cases} \Leftrightarrow x=0.$$

**519.** a)  $\frac{1}{2} \log_2(x-4) + \frac{1}{2} \log_2(2x-1) = \log_2 3 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-4)(2x-1)=9, \\ x-4>0, \\ 2x-1>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2-9x-5=0, \\ x>4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-0,5 - \text{не подходит}, \\ x=5; \\ x>4; \end{cases} \Leftrightarrow x=5.$$

б)  $\lg(3x^2 + 12x + 19) - \lg(3x + 4) = 1 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3x^2 + 12x + 19}{3x + 4} = 10, \\ 3x^2 + 12x + 19 > 0, \\ 3x + 4 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 12x + 19 = 30x + 40, \\ x > -\frac{4}{3}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 18x - 21 = 0, \\ x > -\frac{4}{3}; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=7, \\ x=-1; \\ x > -\frac{4}{3}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=7, \\ x=-1. \end{cases}$$

в)  $\lg(x^2 + 2x - 7) - \lg(x - 1) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - 7 = x - 1, \\ x^2 + 2x - 7 > 0, \\ x - 1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 6 = 0, \\ x < -1 - 2\sqrt{2}, \\ x > -1 + 2\sqrt{2}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-3, \\ x=2; \\ x > -1 + 2\sqrt{2}; \end{cases} \Leftrightarrow x=2.$$

г)  $\log_5(x^2 + 8) - \log_5(x + 1) = 3\log_5 2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 + 8}{x + 1} = 8, \\ x + 1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 8x = 0, \\ x > -1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0, \\ x=8; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0, \\ x=8. \end{cases}$$

**520.**

а)  $\log_4^2 x + \log_4 \sqrt{x} - 1,5 = 0 \Leftrightarrow \log_4^2 x + 0,5 \log_4 x - 1,5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_4 x = -1,5, \\ \log_4 x = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{8}, \\ x = 4. \end{cases}$

б)  $\lg^2 x - \lg x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \lg^2 x - 2\lg x + 1 = 0 \Leftrightarrow (\lg x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \lg x = 1, x = 10.$

в)  $\log_5^2 x - \log_5 x - 2 = 0 \Leftrightarrow \log_5^2 x - \log_5 x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_5 x = -1, \\ \log_5 x = 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{5}, \\ x = 25. \end{cases}$

г)  $\log_3^2 x - 2 \log_3 x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x = -1, \\ \log_3 x = 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3}, \\ x = 27. \end{cases}$

**521.**

а)  $\begin{cases} x + y = 7, \\ \lg x + \lg y = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 7 - x, \\ \lg x + \lg(7 - x) = \lg 10; \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 7 - x, \\ x(7 - x) = 10, \\ x > 0, \\ 7 - x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 7 - x, \\ x^2 - 7x + 10 = 0, \\ x > 0, \\ x < 7; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 7 - x, \\ x_1 = 2, \\ x_2 = 5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ y_1 = 5; \\ x_2 = 5, \\ y_2 = 2; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} \log_4(x+y) = 2, \\ \log_3 x + \log_3 y = 2 + \log_3 7; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_4(x+y) = \log_4 16, \\ \log_3(xy) = \log_3 63, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 16, \\ xy = 63, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 16 - x, \\ x(16 - x) = 63, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 16 - x, \\ x^2 - 16x + 63 = 0, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 16 - x, \\ x_1 = 7, \\ x_2 = 9; \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 7, \\ y_1 = 9; \\ x_2 = 9, \\ y_2 = 7. \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} x+y = 34, \\ \log_2 x + \log_2 y = 6; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 34 - x, \\ \log_2 xy = \log_2 64, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 34 - x, \\ \log_2(x)(34-x) = \log_2 64, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 34 - x, \\ x^2 - 34x + 64 = 0, \\ x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 34 - x, \\ x_1 = 2, \\ x_2 = 32; \\ x > 0, y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ y_1 = 32; \\ x_2 = 32, \\ y_2 = 2. \end{cases}$$

$$r) \begin{cases} \log_4 x - \log_4 y = 0, \\ x^2 - 5y^2 + 4 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y, \\ x^2 - 5y^2 + 4 = 0, \\ x > 0, y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x, \\ 4 - 4x^2 = 0, \\ x > 0, y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x, \\ x_1 = -1 \text{ не подходит}, \\ x_2 = 1; \\ x > 0, y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ y = 1. \end{cases}$$

$$52. a) \frac{1}{\lg x + 1} + \frac{6}{\lg x + 5} = 1 \Leftrightarrow \frac{\lg x + 5 + 6 \lg x + 6 - (\lg x + 1)(\lg x + 5)}{(\lg x + 1)(\lg x + 5)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\lg^2 x - \lg x - 6}{(\lg x + 1)(\lg x + 5)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lg^2 x - \lg x - 6 = 0, \\ \lg x \neq -1, \\ \lg x \neq -5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lg x = -2, \\ \lg x = 3; \\ \lg x \neq -1, \\ \lg x \neq -5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0,01, \\ x_2 = 1000. \end{cases}$$

$$6) \log_2 \frac{x}{4} = \frac{15}{\log_2 \frac{x}{8} - 1} \Leftrightarrow \log_2 x - 2 = \frac{15}{\log_2 x - 4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{(\log_2 x - 2)(\log_2 x - 4) - 15}{\log_2 x - 4} = 0 \Leftrightarrow \frac{\log_2^2 x - 6 \log_2 x - 7}{\log_2 x - 4} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2^2 x - 6 \log_2 x - 7 = 0, \\ \log_2 x \neq 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x = -1, \\ \log_2 x = 7; \\ \log_2 x \neq 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0,5, \\ x_2 = 128. \end{cases}$$

$$B) \frac{2 \lg x}{\lg(5x - 4)} = 1 \Leftrightarrow \frac{2 \lg x - \lg(5x - 4)}{\lg(5x - 4)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lg \frac{x^2}{5x - 4} = 0, \\ \lg(5x - 4) \neq 0, \\ x > 0, \\ 5x - 4 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{5x - 4} = 1, \\ x > 0,8; \\ 5x - 4 \neq 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ x > 0,8; \\ x \neq 1; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - \text{не подходит}, \\ x_2 = 4; \\ x > 0,8, \\ x \neq 1; \end{cases} \Leftrightarrow x = 4;$$

$$G) \frac{1}{\lg x - 6} + \frac{5}{\lg x + 2} = 1 \Leftrightarrow \frac{\lg x + 2 + 5 \lg x - 30 - (\lg x - 6)(\lg x + 2)}{(\lg x - 6)(\lg x + 2)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\lg^2 x - 10 \lg x + 16}{(\lg x - 6)(\lg x + 2)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lg^2 x - 10 \lg x + 16 = 0, \\ \lg x \neq 6, \\ \lg x \neq -2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lg x = 2, \\ \lg x = 8; \\ \lg x \neq 6, \\ \lg x \neq -2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 100, \\ x_2 = 10^8. \end{cases}$$

**523.**

$$a) \log_a x = \log_{\sqrt{a}} 2 + \log_{\frac{1}{a}} 3 \Leftrightarrow \log_a x = \log_a 4 - \log_a 3;$$

$$\log_a x = \log_a \frac{4}{3} \Leftrightarrow x = \frac{4}{3} \text{ при } a > 0, a \neq 1;$$

$$b) \log_4 2 - \log_4 x + \frac{7}{6} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_4 2 - \log_4 x + \frac{7}{6} = 0, \\ x \neq 1, x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3 - 6 \log_4 x + 7 \log_4 x}{6 \log_4 x} = 0, \\ x \neq 1, x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6 \log_4^2 x - 7 \log_4 x - 3 = 0, \\ x \neq 1, x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_4 x = -\frac{1}{3}, \\ \log_4 x = \frac{3}{2}; \\ x \neq 1, x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}, \\ x_2 = 8; \end{cases}$$

$$\text{b) } \log_3 x - 2 \log_{\frac{1}{3}} x = 6 \Leftrightarrow \log_3 x - 2 \log_3 x = 6; \quad \log_3 x = 2 \Leftrightarrow x = 9;$$

$$\text{г) } \log_{25} x + \log_5 x = \log_{\frac{1}{5}} \sqrt{8} \Leftrightarrow \log_5 x + 2 \log_5 x + 2 \log_5 \sqrt{8};$$

$$\log_5 x = \log_5 \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

$$\text{524. a) } \log_2(9 - 2^x) = 3 - x \Leftrightarrow 2^{3-x} = 9 - 2^x \Leftrightarrow 2^x + 8 \cdot 2^{-x} - 9 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} - 9 \cdot 2^x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x = 1, \\ 2^x = 8; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = 3; \end{cases}$$

$$\text{б) } \log_2(25^{x+3}-1)=2+\log_2(5^{x+3}+1) \Leftrightarrow \log_2(5^{2x} \cdot 5^6 - 1) = \log_2(4 \cdot 5^{x+3} + 4) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 15625 \cdot 5^{2x} = 500 \cdot 5^x + 5, \\ 15625 \cdot 5^{2x} > 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3125 \cdot 5^{2x} - 100 \cdot 5^x - 1 = 0, \\ 25^x > 25^{-3}; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5^x = -0,008 \text{ - не подходит,} \\ 5^x = 0,04; \\ x > -3; \end{cases} \Leftrightarrow x = -2;$$

$$\text{в) } \log_4(2 \cdot 4^{x-2} - 1) = 2x - 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cdot 4^{x-2} - 1 = 4^{2x-4}, \\ 2 \cdot 4^{x-2} - 1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{256} \cdot 4^{2x} - \frac{1}{8} \cdot 4^x + 1 = 0, \\ 2^{2(x-2)} > 2^{-1}; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (4^x - 16)^2 = 0, \\ 2x - 4 > -1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4^x = 4^2, \\ x > 1,5; \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

$$\text{г) } \log_2(4^x+4)=\log_2 2^x+\log_2(2^{x+1}-3) \Leftrightarrow \log_2(4^x+4) = \log_2(2 \cdot 4^x - 3 \cdot 2^x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4^x + 4 = 2 \cdot 4^x - 3 \cdot 2^x, \\ 2^{x+1} - 3 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{2x} - 3 \cdot 2^x - 4 = 0, \\ 2^x > \frac{3}{2}; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^x = -1 \text{ - не подходит,} \\ 2^x = 4; \\ 2^x > \frac{3}{2}; \end{cases} \Leftrightarrow 2^x = 4 \Leftrightarrow x = 2.$$

**525.**

$$\text{а) } \lg(2x - 3) > \lg(x + 1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3 > x + 1, \\ 2x - 3 > 0, \\ x + 1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x > 1,5, \\ x > -1; \end{cases} \text{ Итого: } (4; \infty).$$

$$\text{б) } \log_{0,3}(2x - 4) > \log_{0,3}(x + 1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 < x + 1, \\ 2x - 4 > 0, \\ x + 1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 5, \\ x > 2, \\ x > -1. \end{cases}$$

Итого:  $(2; 5)$ .

$$\text{в) } \lg(3x - 7) \leq \lg(x + 1) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 7 > 0, \\ x + 1 > 0, \\ 3x - 7 \leq x + 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2\frac{1}{3}, \\ x > -1, \\ x \leq 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2\frac{1}{2}, \\ x \leq 4. \end{cases}$$

$$\text{г) } \log_{0,5}(4x - 7) < \log_{0,5}(x + 2) \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 7 > x + 2, \\ 4x - 7 > 0, \\ x + 2 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3, \\ x > 1\frac{3}{4}, \\ x > -2; \end{cases} \Leftrightarrow x > 3.$$

**526.** а)  $\log_{0,5} x > \log_2(3 - 2x) \Leftrightarrow \log_2 \frac{1}{x} > \log_2(3 - 2x) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} > 3 - 2x, \\ x > 0, \\ 3 - 2x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1 - 3x + 2x^2}{x} > 0, \\ x > 0, \\ x < 1,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2(x - 0,5)(x - 1)}{x} > 0, \\ x > 0, \\ x < 1,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 0,5, \\ x > 1; \\ x > 0, \\ x < 1,5; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 0,5, \\ 1 < x < 1,5. \end{cases} \quad \text{Итого: } (0;0,5) \cup (1;1,5).$$

б)  $\log_{\pi}(x + 1) + \log_{\pi} x < \log_{\pi} 2 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_{\pi} x(x + 1) < \log_{\pi} 2, \\ x + 1 > 0, \\ x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 2 < 0, \\ x > -1, \\ x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -2, \\ x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1, \\ x > 0. \end{cases} \quad \text{Итого: } (0;1).$$

в)  $\lg x + \lg(x - 1) < \lg 6 \Leftrightarrow \begin{cases} \lg x(x - 1) < \lg 6, \\ x > 0, \\ x - 1 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 6 < 0, \\ x > 0, \\ x > 1; \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > -2, \\ x < 3, \\ x > 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3, \\ x > 1. \end{cases} \quad \text{Итого: } (1;3).$$

г)  $\log_2(x^2 - x - 12) < 3 \Leftrightarrow \log_2(x^2 - x - 12) < \log_2 8 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 12 < 8, \\ x^2 - x - 12 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 20 < 0, \\ x < -3, \\ x > 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -4, \\ x < 5; \\ x < -3, \\ x > 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x < -3, \\ 4 < x < 5. \end{cases} \quad \text{Итого: } (-4;-3) \cup (4;5).$$

**527.** а)  $\log_2^2 x - \log_2 x \leq 6 \Leftrightarrow \log_2^2 x - \log_2 x - 6 \leq 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x \geq -2, \\ \log_2 x \leq 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{4}, \\ x \leq 8. \end{cases} \quad \text{Итого: } \left[ \frac{1}{4}; 8 \right].$$

$$6) \log_{\frac{1}{3}}^2 x - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x > 2, \\ \log_{\frac{1}{3}} x < -2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x > \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{9}, \\ \log_{\frac{1}{3}} x < \log_{\frac{1}{3}} 9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{9}, \\ x > 9; \\ x > 0. \end{cases}$$

Итого:  $\left(0; \frac{1}{9}\right) \cup (9; \infty)$

$$b) \lg^2 x + 2 \lg x > 3 \Leftrightarrow \lg^2 x + 2 \lg x - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lg x > 1, \\ \lg x < -3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 10, \\ x < 0,001; \\ x > 0. \end{cases}$$

Итого:  $(0; 0,001) \cup (10; \infty)$ .

$$g) \log_3^2 x - 9 \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x \leq 3, \\ \log_3 x \geq -3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x \leq \log_3 27, \\ \log_3 x \geq \log_3 \frac{1}{27}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 27, \\ x \geq \frac{1}{27}, \\ x > 0. \end{cases}$$

Итого:  $\left[\frac{1}{27}; 27\right]$ .

$$528. a) \log_2 \left( \sin \frac{x}{2} \right) < -1 \Leftrightarrow \log_2 \left( \sin \frac{x}{2} \right) < \log_2 \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin \frac{x}{2} < \frac{1}{2}, \\ \sin \frac{x}{2} > 0; \end{cases}$$

$$\frac{x}{2} \in \left( 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n \right) \cup \left( \frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \pi + 2\pi n \right);$$

$$x \in \left( 4\pi n; \frac{\pi}{3} + 4\pi n \right) \cup \left( \frac{5\pi}{3} + 4\pi n; 2\pi + 4\pi n \right);$$

$$6) |3 - \log_2 x| < 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - \log_2 x < 2, \\ 3 - \log_2 x > -2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x > \log_2 2, \\ \log_2 x < \log_2 32; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2, \\ x < 32. \end{cases}$$

Итого:  $(2; 32)$ .

$$b) \log_{\frac{1}{2}} \cos 2x > 1 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} \cos 2x > \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x < \frac{1}{2}, \\ \cos 2x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{2} + 2\pi k < 2x < -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ \frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{4} + \pi k < x < -\frac{\pi}{6} + \pi k, \\ \frac{\pi}{6} + \pi k < x < \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z. \end{cases}$$

Итого:  $\left(-\frac{\pi}{4} + \pi k; -\frac{\pi}{6} + \pi k\right) \cup \left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k\right), k \in Z$ .

$$\Gamma) |3 \lg x - 1| < 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \lg x - 1 < 2, \\ 3 \lg x - 1 > -2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lg x < 1, \\ \lg x > -\frac{1}{3}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 10, \\ x > 10^{-\frac{1}{3}}, \\ x > 0. \end{cases}$$

Итого:  $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{10}}; 10\right)$ .

**529.**

$$a) \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}}(x+y) = 2, \\ \log_3(x-y) = 2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}}(x+y) = \log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{9}, \\ \log_3(x-y) = \log_3 9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = \frac{1}{9}, \\ x-y = 9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 9\frac{1}{9}, \\ 2y = -8\frac{8}{9}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4\frac{5}{9}, \\ y = -4\frac{4}{9}; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 2, \\ \log_{48} x + \log_{48} y = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = \lg 100, \\ \log_{48} xy = \log_{48} 48; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ xy = 48, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 6, \\ y_1 = 8; \\ x_2 = 8, \\ y_2 = 6. \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} y = 2, \\ \log_{\frac{1}{3}} x - \log_{\frac{1}{3}} y = 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x = 3, \\ \log_{\frac{1}{3}} y = -1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{27}, \\ y = 3; \end{cases}$$

$$\Gamma) \begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 1 + \lg 13, \\ \lg(x+y) = \lg(x-y) + \lg 8; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = \lg 130, \\ \lg \frac{x+y}{x-y} = \lg 8, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 130, \\ x+y = 8x-8y, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y > 0, x-y > 0; \\ x-y > 0; \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + \frac{49}{81}x^2 = 130, \\ y = \frac{7}{9}x, \\ x+y > 0, \\ x-y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 81, \\ y = \frac{7}{9}x, \\ x+y > 0, \\ x-y > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -9, \\ y_1 = -7; \text{ не подходит} \\ x_2 = 9, \\ y_2 = 7. \end{cases}$$

**530.**

$$a) \begin{cases} 3^y \cdot 9^x = 81, \\ \lg(x+y)^2 - \lg x = 2 \lg 3; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{2x+y} = 3^4, \\ \lg \frac{(x+y)^2}{x} = \lg 9; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+y)^2 = 9x, \\ x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4-2x, \\ x^2 - 17x + 16 = 0; \\ x > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 1, \\ x_1 = 1, \\ x_2 = 16; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 2; \\ x_2 = 16, \\ y_2 = -28. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
6) \begin{cases} 10^{1+\lg(x+y)} = 50, \\ \lg(x+y) + \lg(x-y) = 2 - \lg 5; \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=5, \\ \lg(x^2-y^2)=\lg 20, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=5, \\ x^2-y^2=20, \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=5, \\ x-y=4, \\ x+y>0, \\ x-y>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x=9, \\ 2y=1, \\ x+y>0, \\ x-y>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4,5, \\ y=0,5; \\ x+y>0, \\ x-y>0; \end{cases} \\
B) \begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 576, \\ \log_{\sqrt{2}}(y-x) = 4; \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 576, \\ \log_{\sqrt{2}}(y-x) = \log_{\sqrt{2}} 4; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 576, \\ y-x=4, \\ y-x>0; \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 3^x \cdot 2^{x+4} = 576, \\ y=4+x; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6^x = 36, \\ y=4+x; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ y=6; \end{cases} \\
\Gamma) \begin{cases} \lg x - \lg y = \lg 15 - 1, \\ 10^{\lg(3x+2y)} = 39; \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \lg \frac{x}{y} = \lg \frac{3}{2}, \\ 3x+2y=39; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-3y=0, \\ 3x+2y=39, \\ x>0, y>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x=117, \\ 13y=78, \\ y>0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=9, \\ y=6, \\ y>0; \end{cases}
\end{aligned}$$

#### 40. Понятие об обратной функции

531. a)  $f(x) = 2x + 1$ ;  $D(f) = E(f) = R$ ;  $y = 2x + 1$ ,  $x = \frac{y-1}{2}$ ;

$g(x) = \frac{x-1}{2}$  обратная для  $f(x)$ ;  $D(g) = E(g) = R$ ;

б)  $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ ;  $D(f) = E(f) = R$ ;  $y = \frac{1}{2}x - 1$ ,  $x = 2y + 2$ ;

$g(x) = 2x + 2$  – обратная для  $f(x)$ ;  $D(g) = E(g) = R$ ;

в)  $f(x) = -2x + 1$ ;  $D(f) = E(f) = R$ ;  $y = -2x + 1$ ,  $x = \frac{1-y}{2}$ ;

$g(x) = \frac{1-x}{2}$  – обратная для  $f(x)$ ;  $D(g) = E(g) = R$ ;

г)  $f(x) = -\frac{1}{2}x - 1$ ;  $D(f) = E(f) = R$ ;  $y = -\frac{1}{2}x - 1$ ,  $x = -2y - 2$ ;

$g(x) = -2x - 2$  – обратная для  $f(x)$ ;  $D(g) = E(g) = R$ .

532. а)  $f(x) = -\frac{1}{x}$ ;  $D(f) = E(f) = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ;  $y = -\frac{1}{x}$ ,  $x = -\frac{1}{y}$ ;

$g(x) = -\frac{1}{x}$  – обратная для  $f(x)$ ;  $D(g) = E(g) = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ;

б)  $f(x) = 2x^2$  ( $x \geq 0$ );  $D(f) = E(f) = [0; \infty)$ ;  $y = 2x^2$ ,  $x = \sqrt{\frac{y}{2}}$ ;

$$g(x) = \sqrt{\frac{x}{2}} - \text{обратная для } f(x); D(g) = E(g) = [0; \infty);$$

$$\text{в)} f(x) = \frac{x}{x+2} = 1 - \frac{2}{x+2}; D(f) = (-\infty; -2) \cup (-2; \infty), E(f) = (-\infty; 1) \cup (1; \infty);$$

$$y = \frac{x}{x+2}, x = \frac{2y}{1-y}; g(x) = \frac{2x}{1-x} - \text{обратная для } f(x);$$

$$D(g) = E(f) = (-\infty; 1) \cup (1; \infty), E(g) = D(f) = (-\infty; -2) \cup (-2; \infty);$$


$$\text{г)} f(x) = \sqrt{x+1}; D(f) = [-1; \infty), E(f) = [0; \infty); y = \sqrt{x+1}, x = y^2 - 1;$$

$$g(x) = x^2 - 1 - \text{обратная для } f(x); D(g) = E(f) = [0; \infty), E(g) = D(f) = [-1; \infty).$$

**533.**


$$\text{а)} f(x) = 2x^3 + 1; y = 2x^3 + 1, x = \sqrt[3]{\frac{y-1}{2}};$$

$$g(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{2}} - \text{обратная к } f(x);$$



$$\text{б)} f(x) = (x+1)^2, x \in (-\infty; -1]; y = (x+1)^2, x = -1 - \sqrt{y};$$


$$g(x) = -1 - \sqrt{x} - \text{обратная к } f(x);$$



$$\text{в)} f(x) = -2x^3 + 1; y = -2x^3 + 1,$$


$$x = \sqrt[3]{\frac{1-y}{2}};$$

$$g(x) = \sqrt[3]{\frac{1-x}{2}} - \text{обратная к } f(x);$$





$$\text{г)} f(x) = (x-1)^2, x \in [1; \infty); y = (x-1)^2, x = 1 + \sqrt{y};$$

$$g(x) = 1 + \sqrt{x} - \text{обратная к } f(x).$$





**534.**

- a)  $g(-2) = -4, g(1) = 0,5, g(3) = 1,5;$  б)  $g(-2) = 1, g(1) = -1, g(3) = -3;$   
 $D(g) = [-2;8], E(g) = [-4;4]; D(g) = [-6;4], E(g) = [-4;3];$




- в)  $g(-2) = -2, g(1) = -0,5, g(3) = 1;$  г)  $g(-2) = 4, g(1) = 0, g(3) = -1;$   
 $D(g) = [-6;7], E(g) = [-4;5]; D(g) = [-3;7], E(g) = [-3;5].$




- 535.** а)  $f(x) = x^2 + 1, x \leq 0;$  т.к.  $f(x)$  убывает на  $(-\infty; 0]$ , то на  $(-\infty; 0]$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x); y = x^2 + 1, x = -\sqrt{y-1};$

$$g(x) = -\sqrt{x-1}, D(g) = [1; \infty), E(g) = (-\infty; 0];$$




- б)  $f(x) = 2x, (-\infty; \infty);$  т.к.  $f(x)$  возрастает на  $\mathbb{R}$ , то на  $\mathbb{R}$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x); y = 2x, x = \frac{1}{2}y;$


$$g(x) = \frac{1}{2}x, D(g) = E(g) = \mathbb{R};$$



в)  $f(x) = \sqrt[4]{x}$ ,  $x \geq 0$ ; т.к.  $f(x)$  возрастает на  $[0; \infty)$ , то на  $[0; +\infty)$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x)$ ;  $y = \sqrt[4]{x}$ ,  $x = y^4$ ;  
 $g(x) = x^4$ ,  $D(g) = [0, \infty)$ ,  $E(g) = [0; \infty)$ ;




г)  $f(x) = x^3 + 1$ ,  $(-\infty; \infty)$ ; т.к.  $f(x)$  возрастает на  $\mathbb{R}$ , то на  $\mathbb{R}$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x)$ ;  $y = x^3 + 1$ ,  $x = \sqrt[3]{y-1}$ ;  $g(x) = \sqrt[3]{x-1}$ ,  $D(g) = E(g) = \mathbb{R}$ .



536.

а)  $f(x) = \sin x$ ,  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ; т.к.  $f(x)$  возрастает на  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ , то на  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x)$ ;


$y = \sin x$ ,  $x = \arcsin y$ ;  $g(x) = \arcsin x$ ,  $D(g) = [-1; 1]$ ,  $E(g) = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ;



б)  $f(x) = \operatorname{tg} x$ ,  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ ; т.к.  $f(x)$  возрастает на  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ , то на


$x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x)$ ;

$$y = \operatorname{tg} x, x = \operatorname{arctg} y; g(x) = \operatorname{arctg} x, D(g) = R, E(g) = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right);$$




в)  $f(x) = \cos x$ ; т.к.  $f(x)$  убывает при  $x \in [0; \pi]$ , то на  $[0; \pi]$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x)$ ;

$$y = \cos x, x = \arccos y; g(x) = \arccos x, D(g) = [-1; 1], E(g) = [0; \pi];$$



г)  $f(x) = \operatorname{ctgx}, x \in (0; \pi)$ ;

т.к.  $f(x)$  убывает на  $(0; \pi)$ , то на  $(0; \pi)$  существует  $g(x)$ , обратная к  $f(x)$ ;  
 $y = \operatorname{ctg} x, x = \operatorname{arcctg} y; g(x) = \operatorname{arcctg} x, D(g) = R, E(g) = (0; \pi)$ .



## § 11. Производная показательной и логарифмической функции

### 41. Производная показательной и логарифмической функции

**537.** а)  $\ln 3 \approx 1,0986, \ln 5,6 \approx 1,7228, \ln 1,7 \approx 0,5306$ ;

б)  $\ln 8 \approx 2,0794, \ln 17 \approx 2,8332, \ln 1,3 \approx 0,2624$ ;

в)  $\ln 2 \approx 0,6931, \ln 35 \approx 3,3551, \ln 1,4 \approx 0,3365$ ;

г)  $\ln 7 \approx 1,9459, \ln 23 \approx 3,1355, \ln 1,5 \approx 0,4055$ .

**538.**

$$\text{а) } y' = (4e^x + 5)' = 4e^x; \quad \text{б) } y' = (2x + 3e^{-x})' = 2 - 3e^{-x};$$

$$\text{B) } y' = \left(3 - \frac{1}{2}e^x\right)' = -\frac{1}{2}e^x; \quad \text{r) } y' = (5e^{-x} - x^2)' = -5e^{-x} - 2x.$$

**539.** a)  $y' = (e^x \cos x)' = e^x(\cos x - \sin x)$ ; б)  $y' = (3e^x + 2^x)' = 3e^x + 2^x \ln 2$ ;  
 б)  $y' = (3^x - 3x^2)' = 3^x \ln 3 - 6x$ ; р)  $y' = (x^2 e^x)' = x e^x (2 + x)$ .

**540.** а)  $f(x) = (e^{-x})' = -e^{-x}$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = -1$ ;  $y = 1 - x$ ;

б)  $f(x) = (3^x)' = 3^x \ln 3$ ,  $f(1) = 3$ ,  $f'(1) = 3 \ln 3$ ;

$y = 3 + 3 \ln 3(x - 1) = 3 \ln 3 \cdot x + 3(1 - \ln 3)$ ;

в)  $f(x) = (e^x)' = e^x$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 1$ ;  $y = 1 + x$ ;

г)  $f(x) = (2^{-x})' = -2^{-x} \ln 2$ ,  $f(1) = \frac{1}{2}$ ,  $f'(1) = -\frac{\ln 2}{2}$ ;

$$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2(x - 1) = -\frac{1}{2} \ln 2 \cdot x + \frac{1}{2}(1 + \ln 2).$$

**541.**

а)  $f(x) = 5e^x$ ,  $F(x) = 5e^x + C$ ;      б)  $f(x) = 2 \cdot 3^x$ ,  $F(x) = 2 \cdot \frac{3^x}{\ln 3} + C$ ;

в)  $f(x) = 4^x$ ,  $F(x) = \frac{4^x}{\ln 4} + C$ ;      г)  $f(x) = \frac{1}{2}e^x + 1$ ,  $F(x) = \frac{1}{2}e^x + x + C$ .

**542.** а)  $\int_0^{1/2} 0,5^x dx = \frac{0,5^x}{\ln 0,5} \Big|_0^{1/2} = \frac{0,5}{\ln 0,5} - \frac{1}{\ln 0,5} = -\frac{0,5}{\ln 0,5} = \frac{1}{2 \ln 2}$ ;

б)  $\int_0^1 e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ; в)  $\int_{-2}^1 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_{-2}^1 = \frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{4 \ln 2} = \frac{7}{4 \ln 2}$ ;

г)  $\int_{-1/2}^2 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} \Big|_{-1/2}^2 = \frac{9}{\ln 3} - \frac{1}{\sqrt{3} \ln 3} = \frac{9\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} \ln 3}$ .

**543.**

а)  $y' = \left(e^{x^2} \sin \frac{x}{2}\right)' = e^{x^2} \sin \frac{x}{2} \cdot (x^2)' + e^{x^2} \cos \frac{x}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' = 2x e^{x^2} \sin \frac{x}{2} + \frac{1}{2} e^{x^2} \cos \frac{x}{2} =$   
 $= e^{x^2} \left(2x \sin \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}\right);$

б)  $y' = \left(7^{\frac{x}{2}} \operatorname{tg} 3x\right)' = 7^{\frac{x}{2}} \ln 7 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' \operatorname{tg} 3x + 7^{\frac{x}{2}} \frac{1}{\cos^2 3x} \cdot (3x)' =$   
 $= \frac{\ln 7}{2} \cdot 7^{\frac{x}{2}} \operatorname{tg} 3x + \frac{3}{\cos^2 3x} \cdot 7^{\frac{x}{2}} = 7^{\frac{x}{2}} \left(\frac{\ln 7}{2} \cdot \operatorname{tg} 3x + \frac{3}{\cos^2 3x}\right);$

$$\text{в) } y' = \left( e^{\sqrt{x}} \cos 2x \right)' = e^{\sqrt{x}} \cos 2x \cdot (\sqrt{x})' - e^{\sqrt{x}} \sin 2x \cdot (2x)' =$$

$$= \frac{e^{\sqrt{x}} \cos 2x}{2\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} \sin 2x = e^{\sqrt{x}} \left( \frac{\cos 2x}{2\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} \sin 2x \right);$$

$$\text{г) } y' = \left( 2^{-x} \operatorname{ctg} \frac{x}{3} \right)' = 2^{-x} \ln 2 \operatorname{ctg} \frac{x}{3} \cdot (-x)' - 2^{-x} \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{3}} \cdot \left( \frac{x}{3} \right)' =$$

$$= -2^{-x} \ln 2 \operatorname{ctg} \frac{x}{3} - \frac{2^{-x}}{3 \sin^2 \frac{x}{3}} = -2^{-x} \left( \ln 2 \operatorname{ctg} \frac{x}{3} - \frac{1}{3 \sin^2 \frac{x}{3}} \right).$$

$$\text{544. а) } y' = \left( \frac{x^6}{4^x + 5} \right)' = \frac{6x^5 \cdot (4^x + 5) - x^6 \cdot 4^x \ln 4}{(4^x + 5)^2} = \frac{4^x \cdot x^5 (6 - x \ln 4) + 30x^5}{(4^x + 5)^2};$$

$$\text{б) } y' = \left( \frac{e^{-x}}{x^2 + 2} \right)' = \frac{-e^{-x}(x^2 + 2) - e^{-x} \cdot 2x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{-e^{-x}(x^2 + 2x + 2)}{(x^2 + 2)^2},$$

$$\text{в) } y' = \left( \frac{3^x}{2^x + 5^x} \right)' = \frac{3^x \ln 3 (2^x + 5^x) - 3^x (2^x \ln 2 + 5^x \ln 5)}{(2^x + 5^x)^2} =$$

$$= \frac{3^x \cdot 2^x (\ln 3 - \ln 2) + 3^x \cdot 5^x (\ln 3 - \ln 5)}{(2^x + 5^x)^2} = \frac{3^x (2^x \ln 1,5 + 5^x \ln 0,6)}{(2^x + 5^x)^2},$$

$$\text{г) } y' = \left( \frac{0,3^{-x}}{\sqrt{x} + 0,5} \right)' = \frac{-0,3^{-x} \ln 0,3 \cdot (\sqrt{x} + 0,5) - 0,3^{-x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x} + 0,5)^2}.$$

**545. а)**  $f(x) = xe^{5x}$ ,  $D(f) = R$ ;  $f'(x) = e^{5x} + 5xe^{5x} = 5e^{5x}(x+0,2)$ ;


$f'(x) = 0$  при  $x = -0,2$ ,  $f'(x) < 0$  при  $x \in (-\infty; -0,2)$ ,  $f'(x) > 0$

при  $x \in (-0,2; \infty)$ ;  $f(x)$  убывает на  $(-\infty; -0,2]$ ,  $f(x)$  возрастает на  $[-0,2; \infty)$ ,

$$\min_R f(x) = f(-0,2) = -\frac{1}{5e};$$

**б)**  $f(x) = x^2 2^{-x}$ ,  $D(f) = R$ ;  $f'(x) = 2x \cdot 2^{-x} + x^2 \cdot \ln 2 \cdot (-x) = 2^{-x} \cdot x(2 - x \ln 2)$ ;

$f'(x) = 0$  при  $x = 0; \frac{2}{\ln 2}$ .



$f(x)$  убывает на  $(-\infty; 0]$  и на  $\left[ \frac{2}{\ln 2}; \infty \right)$ ,  $f(x)$  возрастает на  $\left[ 0; \frac{2}{\ln 2} \right]$ ;

$x = 0 - \min f(x)$ ,  $f(0) = 0$ ;


$$x = \frac{2}{\ln 2} - \max f(x), f\left(\frac{2}{\ln 2}\right) = \frac{4}{\ln^2 2} 2^{\frac{2}{\ln 2}};$$

в)  $f(x) = xe^{-x}$ ;  $D(f) = R$ ;  $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$ ;  $f'(x) = 0$  при  $x = 1$ ,  $f(x)$  возрастает на  $(-\infty; 1]$ ,  $f(x)$  убывает на  $[1; \infty)$ ,

$$x = 1 - \max_{R} f(x) = f(1) = \frac{1}{e};$$

$$\text{г) } f(x) = x^4 \cdot 0,5^x; D(f) = R; f'(x) = 4x^3 \cdot 0,5^x + x^4 \cdot 0,5^x \ln 0,5 = 0,5^x \cdot x^3 (4 - x \ln 2);$$

$$f(x) = 0 \text{ при } x = 0; \frac{4}{\ln 2};$$



$f(x)$  убывает на  $(-\infty; 0]$  и на  $\left[ \frac{4}{\ln 2}; \infty \right)$ ,  $f(x)$  возрастает на  $\left[ 0; \frac{4}{\ln 2} \right]$ ;

$$x = 0 - \min f(x), f(0) = 0; x = \frac{4}{\ln 2} - \max f(x); f\left(\frac{4}{\ln 2}\right) = \frac{256}{\ln^4 2} 0,5^{\frac{4}{\ln 2}}.$$

**546.** а)  $f(x) = e^{3-2x}$ ,  $F(x) = -\frac{1}{2}e^{3-2x} + C$ ;


б)  $f(x) = 2 \cdot 0,9^x - 5 \cdot 6^{-x}$ ,  $F(x) = \frac{2 \cdot 0,9^x}{\ln 0,9} + \frac{5 \cdot 6^{-x}}{\ln 5,6} + C$ ;

в)  $f(x) = 2^{-10x}$ ,  $F(x) = -0,1 \cdot \frac{2^{-10x}}{\ln 2} + C$ ;

г)  $f(x) = e^{3x} + 2,3^{1+x} = e^{3x} + 2,3 \cdot 2,3^x$ ,  $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + 2,3 \frac{2,3^x}{\ln 2,3} + C = \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{2,3^{1+x}}{\ln 2,3} + C$ .


**547.** а)  $S = \int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$ ;

б)  $S = \int_0^1 9^x dx - \int_0^1 3^x dx = \left( \frac{9^x}{\ln 9} - \frac{3^x}{\ln 3} \right) \Big|_0^1 = \frac{9}{\ln 9} - \frac{3}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 9} + \frac{1}{\ln 3} = \frac{8}{2 \ln 3} - \frac{2}{\ln 3} = \frac{2}{\ln 3}$ .




$$\text{B) } S = \int_{-1}^2 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_{-1}^2 = \frac{4}{\ln 2} - \frac{1}{2 \ln 2} = \frac{7}{2 \ln 2};$$


$$\text{r) } S = \int_0^1 e^{2x} dx - \int_0^1 e^x dx = \left( \frac{1}{2} e^{2x} - e^x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - e - \frac{1}{2} + 1 = e \left( \frac{e}{2} - 1 \right) + \frac{1}{2}.$$




$$\text{548. a) } S_{ADE} = S_{ABCE} - S_{ABCD} = 2 \cdot 3 - \int_{-1}^1 \left( \frac{1}{3} \right)^x dx = 6 + \frac{3^{-x}}{\ln 3} \Big|_{-1}^1 = 6 + \frac{1}{3 \ln 3} - \frac{3}{\ln 3} = 6 - \frac{8}{3 \ln 3};$$




$$\text{6) } S_{ADE} = S_{ABCE} - S_{ABOD} - S_{DOCK} = S_{ABCE} - 2S_{DOCK} = 2 \cdot e - 2 \int_0^1 e^x dx = 2e - 2e^x \Big|_0^1 = 2e - 2e + 2 = 2;$$



$$\text{b) } S_{ABE} = S_{ACDE} - S_{BCDE} = \int_{-2}^0 \left( \frac{1}{2} \right)^x dx - 2 \cdot 1 = -\frac{2^{-x}}{\ln 2} \Big|_{-2}^0 - 2 = -\frac{1}{\ln 2} + \frac{4}{\ln 2} - 2 = \frac{3}{\ln 2} - 2;$$



$$\text{г) } S_{AED} = S_{ABCD} - S_{ABOE} - S_{OCDE} = 3 \cdot 4 - \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^x dx - \int_0^1 4^x dx = 12 + \frac{2^{-x}}{\ln 2} \Big|_{-2}^0 - \\ - \frac{4^x}{\ln 4} \Big|_0^1 = 12 + \frac{1}{\ln 2} - \frac{4}{\ln 2} - \frac{4}{\ln 4} + \frac{1}{\ln 4} = 12 - \frac{3}{\ln 2} - \frac{3}{2 \ln 2} = 12 - \frac{9}{\ln 2}.$$



## 42. Производная логарифмической функции

**549. а)**  $y' = ((\ln(2+3x))') = \frac{1}{2+3x} \cdot (2+3x)' = \frac{3}{2+3x};$

**б)**  $y' = (\log_{0,3} x + \sin x)' = \frac{1}{x \ln 0,3} + \cos x;$

**в)**  $y' = (\ln(1+5x))' = \frac{1}{1+5x} \cdot (1+5x)' = \frac{5}{1+5x};$

**г)**  $y' = (\lg x - \cos x)' = \frac{1}{x \ln 10} + \sin x.$

**550. а)**  $y' = (x^2 \log_2 x)' = \frac{1}{\ln 2} \left( 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} \right) = \frac{x}{\ln 2} (2 \ln x + 1);$

**б)**  $y' = \left( \frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot x'}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2};$

**в)**  $y' = (x \ln x)' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1; \quad \text{г) } y' = \left( \frac{x}{\ln x} \right)' = \frac{\ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}.$

**551. а)**  $f(x) = \frac{3}{7x+1}, \quad F(x) = \frac{3}{7} \ln|7x+1| + C, \quad x \neq -\frac{1}{7};$

$$6) f(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{x+5}, F(x) = \ln|x| - 2\ln|x+5| + C, x \neq -5, x \neq 0;$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x+2}, F(x) = \ln|x+2| + C, x \neq -2; r) f(x) = \frac{4}{x}, F(x) = 4\ln|x| + C, x \neq 0.$$

**552.** a)  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ ,  $f(0) = \ln 1 = 0$ ,  $f'(0) = 1$ ;  $y = x$ ;

$$6) f(x) = (\lg x + 2) = \frac{1}{x \ln 10}, f(1) = \lg 1 + 2 = 2, f'(1) = \frac{1}{\ln 10};$$

$$y = 2 + \frac{1}{\ln 10}(x-1) = \frac{x}{\ln 10} + 2 - \frac{1}{\ln 10};$$

$$b) f(x) = (2 \ln x) = \frac{2}{x}, f(e) = 2 \ln e = 2, f'(e) = \frac{2}{e}; y = 2 + \frac{2}{e}(x-e) = \frac{2}{e}x;$$

$$r) f(x) = (\log_2(x-1)) = \frac{1}{\ln 2(x-1)}, f(2) = \log_2 1 = 0, f'(2) = \frac{1}{\ln 2};$$

$$y = \frac{1}{\ln 2}(x-2) = \frac{x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2}.$$

**553.** a)  $\int_1^7 \frac{2dx}{x} = 2 \ln|x| \Big|_1^7 = 2 \ln 7 - 2 \ln 1 = 2 \ln 7; 6) \int_{-1}^1 \frac{dx}{3-2x} = -\frac{1}{2} \ln|3-2x| \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} \ln 5;$

$$b) \int_1^e \frac{dx}{x} = \ln|x| \Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1; r) \int_0^3 \frac{dx}{3x+1} = \frac{1}{3} \ln|3x+1| \Big|_0^3 = \frac{1}{3} \ln 10 - \frac{1}{3} \ln 1 = \frac{1}{3} \ln 10.$$

**554.**

$$a) y = \left( \frac{\ln(5+3x)}{x^2+1} \right)' = \frac{\frac{1}{5+3x} \cdot (x^2+1) \cdot 3 - \ln(5+3x) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{3(x^2+1) - 2x(5+3x)\ln(5+3x)}{(x^2+1)^2(5+3x)},$$

$$6) y = \left( \frac{\sqrt{x}}{\lg(1-2x)} \right)' = \left( \frac{\sqrt{x} \ln 10}{\ln(1-2x)} \right)' = \frac{\frac{\ln 10 \cdot \ln(1-2x)}{2\sqrt{x}} + \frac{2 \ln 10 \sqrt{x}}{1-2x}}{\ln^2(1-2x)} =$$

$$= \frac{\ln 10((1-2x)\ln(1-2x) + 4x)}{2\sqrt{x}(1-2x)\ln^2(1-2x)};$$

$$b) y = \left( \frac{x^2}{\ln 5x} \right)' = \frac{2x \ln 5x - x^2 \cdot \frac{1}{5x} \cdot 5}{\ln^2 5x} = \frac{x(2 \ln 5x - 1)}{\ln^2 5x};$$

$$r) y = \left( \frac{\log_3 x^2}{x+1} \right)' = \left( \frac{2 \ln x}{(\ln 3)(x+1)} \right)' = \frac{2}{\ln 3} \cdot \frac{\frac{1}{x}(x+1) - \ln x}{(x+1)^2} = \frac{2}{\ln 3} \cdot \frac{x(1-\ln x)+1}{x(x+1)^2}.$$

**555.** а)  $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$ ,  $D(f') = (0; \infty)$ ;

$f'(x) = 0$  при  $x = \frac{1}{e^2}$ ,  $f(x)$  убывает на  $\left[0; \frac{1}{e^2}\right]$ ,  $f(x)$  возрастает на  $\left[\frac{1}{e^2}; \infty\right)$ ,

$$x = \frac{1}{e^2} - \min f(x) \text{ и } f\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e};$$

б)  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ,  $D(f') = (0; \infty)$ ;

$f'(x) = 0$  при  $x = e$ ,  $f(x)$  возрастает на  $(0; e]$ ,  $f(x)$  убывает на  $[e; \infty)$ ;  $x = e$  – точка  $\max f(x)$  и  $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$ ;

в)  $y = 2x - \ln x$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = 2 - \frac{1}{x} = \frac{2(x - 0,5)}{x}$ ,  $D(f') = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ;

$f'(x) = 0$  при  $x = 0,5$ ;  $f(x)$  убывает на  $(0; 0,5]$ ,  $f(x)$  возрастает на  $[0,5; \infty)$ , т.  $x = 0,5 - \min f(x)$  и  $f(0,5) = 1 + \ln 2$ ;

г)  $f(x) = x \ln x$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$ ,  $D(f') = (0; \infty)$ ;

$f'(x) = 0$  при  $x = \frac{1}{e}$ ,  $f(x)$  убывает на  $\left[0; \frac{1}{e}\right]$ ,  $f(x)$  возрастает на  $\left[\frac{1}{e}; \infty\right)$ ,

$$x = \frac{1}{e} - \min f(x) \text{ и } f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}.$$

**556.** а)  $f(x) = x \ln^2 x$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = \ln^2 x + 2x \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln x (\ln x + 2)$ ;

$f'(x) = 0$  при  $x = 1$  и  $x = \frac{1}{e^2}$ ;

$f(x)$  возрастает на  $\left[0; \frac{1}{e^2}\right]$  и на  $[1; \infty)$ ,  $f(x)$  убывает на  $\left[\frac{1}{e^2}; 1\right]$ ;

$$x = \frac{1}{e^2} - \max f(x) \text{ и } f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \frac{4}{e^2}, x = 1 - \min f(x) \text{ и } f(1) = 0;$$

б)  $f(x) = \frac{2x}{\ln x}$ ;  $D(f) = (0; 1) \cup (1; \infty)$ ;  $f'(x) = \left(\frac{2x}{\ln x}\right)' = 2 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$ ,

$D(f') = (0; 1) \cup (1; \infty)$ ;  $f'(x) = 0$  при  $x = e$ ;  $f(x)$  убывает на  $(0, 1)$  и на  $(1; e]$ ,  $f(x)$  возрастает на  $[e; \infty)$ ,  $x = e - \min f(x)$  и  $f(e) = 2e \ln 10$ ;

в)  $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x}{(\sqrt{x})^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(2 - \ln x)}{x} = \frac{2 - \ln x}{2\sqrt{x^3}}$ ,

$D(f) = (0; \infty); f'(x) = 0$  при  $x = e^2$ ;

$f(x)$  возрастает на  $(0; e^2]$ ,  $f(x)$  убывает на  $[e^2; \infty)$ ,  $x = e^2 - \min f(x)$  и  $f(e^2) = \frac{2}{e}$


г)  $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x^2}$ ,  $D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ;

$f(x) = 0$  при  $x = 1$ ;


$f(x)$  убывает на  $(0; 1]$ ,  $f(x)$  возрастает на  $[1; \infty)$ ,  $x = 1 - \min f(x)$  и  $f(1) = 1$ .

**557.**

a)  $S_{ABCD} = \int_2^6 \left( 2 + \frac{4}{x} \right) dx = \left( 2x + 4 \ln|x| \right) \Big|_2^6 = 12 + 4 \ln 6 - 4 - 4 \ln 2 = 8 + 4 \ln 3$ ;



б)  $S_{ABCD} = \int_{-4}^{-1} -\frac{2}{x} dx = -2 \ln|x| \Big|_{-4}^{-1} = -2(\ln 1 - \ln 4) = 4 \ln 2$ ;




в)  $S = \int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} \ln|x| \Big|_{\frac{1}{4}}^2 = \frac{1}{2} \left( \ln 2 - \ln \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{2} \ln 2$ ;


г)  $S = \int_{-6}^{-3} \left( 3 - \frac{1}{x} \right) dx = \left( 3x - \ln(-x) \right) \Big|_{-6}^{-3} = -9 - \ln 3 + 18 + \ln 6 = 9 + \ln 2$ .

### 43. Степенная функция


**558.** а)  $f(x) = x^{-\frac{3}{2}}$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = -\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ ;




6)  $f(x) = x^{\sqrt{3}}$ ;  $D(f) = [0; \infty)$ ;  $f'(x) = \sqrt{3}x^{\sqrt{3}-1}$ ;



b)  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ ;  $D(f) = [0; \infty)$ ;  $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ ;




c)  $f(x) = x^{-\sqrt{5}}$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = -\sqrt{5} \cdot x^{-\sqrt{5}-1}$ .




559.


a)  $f(x) = x^{-e}$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = -ex^{-e-1}$ ;




6)  $f(x) = \left(\frac{x}{3}\right)^{-\lg 5}$ ;  $D(f) = (0; \infty)$ ;  $f'(x) = -\frac{1}{3} \lg 5 \cdot \left(\frac{x}{3}\right)^{-\lg 5 - 1}$ ;



b)  $f(x) = x^\pi$ ;  $D(f) = [0; \infty)$ ;  $f'(x) = \pi x^{\pi-1}$ ;



r)  $f(x) = (2x)^{\ln 3}$ ;  $D(f) = [0; \infty)$ ;  $f'(x) = 2 \cdot \ln 3 \cdot (2x)^{\ln 3 - 1}$ .



**560.** a)  $24^{\frac{1}{3}} = (27 - 3)^{\frac{1}{3}} = 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 3 \left(1 - \frac{1}{9 \cdot 3}\right) = \frac{3 \cdot 26}{27} = 2\frac{8}{9} \approx 2,89;$

б)  $\sqrt[4]{625 \cdot 3} = 5\sqrt[4]{3} = 5 \cdot \sqrt[4]{1,3^4 + 0,14} \approx 5 \cdot 1,3 \cdot \left(1 + \frac{0,14}{2,85} \cdot \frac{1}{4}\right) \approx 6,5 \cdot 1,01 \approx 6,57;$

в)  $\sqrt[3]{81} = 3\sqrt[3]{3} = 3\sqrt[3]{1,4^3 + 0,25} \approx 3 \cdot 1,4 \cdot \left(1 + \frac{0,25}{3 \cdot 1,4^3}\right) \approx 4,2 \cdot 1,03 \approx 4,33;$

г)  $\sqrt[4]{48} = 2\sqrt[4]{3} = 2 \cdot \sqrt[4]{1,3^4 + 0,14} \approx 2 \cdot 1,3 \left(1 + \frac{0,14}{2,85 \cdot 4}\right) \approx 2,6 \cdot 1,01 \approx 2,63.$

**561.** а)  $\sqrt[3]{30} = \sqrt[3]{27 + 3} = \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{1}{9}} \approx 3 \cdot \left(1 + \frac{1}{3 \cdot 9}\right) \approx 3,11;$

б)  $\sqrt[4]{90} = \sqrt[4]{81 + 9} = \sqrt[4]{81} \cdot \sqrt[4]{1 + \frac{1}{9}} \approx 3 \cdot \left(1 + \frac{1}{4 \cdot 9}\right) \approx 3,08;$

в)  $\sqrt{9,02} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{1 + \frac{2}{900}} \approx 3 \cdot \left(1 + \frac{1}{900}\right) \approx 3,003;$

г)  $\sqrt[5]{33} = \sqrt[5]{32 + 1} = \sqrt[5]{32} \cdot \sqrt[5]{1 + \frac{1}{32}} \approx 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{5 \cdot 32}\right) \approx 2,01.$

**562.**

а) Т.к.  $f(x) = x^{\frac{2}{5}}$  возрастает на  $R$ , то  $\min_{[1;32]} f(x) = f(1) = 1, \max_{[1;32]} f(x) = f(32) = 4$ ;

б) Т.к.  $f(x) = x^{-\frac{4}{3}}$  убывает на  $R$ , то

$$\max_{[\frac{1}{8}; 27]} f(x) = f\left(\frac{1}{8}\right) = 16, \quad \min_{[\frac{1}{8}; 27]} f(x) = f(27) = \frac{1}{81};$$

в) Т.к.  $f(x) = x^{-4}$  убывает на  $R$ , то  $\max_{[\frac{1}{2}; 2]} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 16, \quad \min_{[\frac{1}{2}; 1]} f(x) = f(1) = 1$ ;

Г) Т.к.  $f(x) = x^{\frac{3}{4}}$  возрастаает на  $\mathbb{R}$ , то

$$\min_{\left[\frac{1}{16}; 81\right]} f(x) = f\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{1}{8}, \quad \max_{\left[\frac{1}{16}; 81\right]} f(x) = f(81) = 27.$$

**563. а)**  $f(x) = -\frac{1}{2}x^{-\sqrt{2}}, \quad F(x) = -\frac{x^{-\sqrt{2}+1}}{2(-\sqrt{2}+1)} + C = \frac{x^{1-\sqrt{2}}}{2(1-\sqrt{2})} + C;$

б)  $f(x) = x^{2\sqrt{3}}, \quad F(x) = \frac{x^{2\sqrt{3}+1}}{2\sqrt{3}+1} + C;$

в)  $f(x) = 3x^{-1}, \quad F(x) = 3\ln|x| + C; \quad \text{г) } f(x) = x^e, \quad F(x) = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C.$

**564. а)**  $\int_1^4 x^{\frac{5}{2}} dx = \frac{2}{7} \cdot x^{\frac{7}{2}} \Big|_1^4 = \frac{2}{7} \left( 2^{\frac{7}{2}} - 1^{\frac{7}{2}} \right) = \frac{2}{7} \cdot (2^7 - 1) = 36 \frac{2}{7};$


б)  $\int_1^8 \frac{4dx}{x^{\frac{2}{3}}} = 4 \cdot \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1} \Big|_1^8 = 12 \left( \sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{1} \right) = 12;$

в)  $\int_e^{e^2} 2x^{-1} dx = 2 \ln x \Big|_e^{e^2} = 2 \left( \ln e^2 - \ln e \right) = 2;$

г)  $\int_{\frac{1}{16}}^{81} 5x^{\frac{1}{4}} dx = 5 \cdot \frac{x^{\frac{1}{4}+1}}{\frac{1}{4}+1} \Big|_{\frac{1}{16}}^{81} = 4 \left( 3^{\frac{5}{4}} - 2^{\frac{5}{4}} \right) = 4 \cdot 211 = 844.$

**565. а)**  $S = \int_0^1 x^{\sqrt{2}} dx = \frac{x^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}+1};$

б)  $S_{ABE} = S_{ACDE} - S_{BCDE} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x} dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{\sqrt{3}} dx = \left( \ln x - \frac{x^{\sqrt{3}+1}}{\sqrt{3}+1} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = -\frac{1}{\sqrt{3}+1} - \ln \frac{1}{2} + \frac{2^{-\sqrt{3}-1}}{\sqrt{3}+1} = \frac{2^{-\sqrt{3}-1} - 1}{\sqrt{3}+1} + \ln 2;$



$$B) S = \int_1^{32} x^{-0,8} dx = \frac{x^{-0,8+1}}{-0,8+1} \Big|_1^{32} = 5\sqrt[5]{x} \Big|_1^{32} = 5(\sqrt[5]{32} - 1) = 5;$$

$$r) S = \int_3^5 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_3^5 = \ln 5 - \ln 3.$$

**566.**

$$2) \sqrt{2} \approx 1,4142, \sqrt[3]{3} \approx 1,4422, \sqrt{3} \approx 1,7321, \sqrt[4]{2,5} \approx 1,2574, \sqrt[3]{2,5} \approx 1,3572, \sqrt[4]{3} \approx 1,3161, \\ \sqrt[5]{2,5} \approx 1,5811, \sqrt[4]{2} \approx 1,1892 .$$

$$3) \sqrt{2} = \sqrt{1,4^2 + 0,04} = \sqrt{1,4^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{0,04}{1,96}} \approx 1,4 \left( 1 + \frac{0,04}{2 \cdot 1,96} \right) \approx 1,4143;$$

$$\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{1,4^3 + 0,256} = \sqrt[3]{1,4^3} \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{0,256}{2,744}} \approx 1,4 \left( 1 + \frac{0,256}{3 \cdot 2,744} \right) \approx 1,4435;$$

$$\sqrt{3} = \sqrt{1,3^4 + 0,1439} = \sqrt{1,3^4} \cdot \sqrt{1 + \frac{0,1439}{2,8561}} \approx 1,69 \left( 1 + \frac{0,1439}{2 \cdot 2,8561} \right) \approx 1,7326;$$

$$\sqrt[4]{2,5} = \sqrt[4]{1,25^4 + \frac{15}{256}} = \sqrt[4]{1,25^4} \cdot \sqrt[4]{1 + \frac{15}{256 \cdot 2,4414}} \approx 1,25 \left( 1 + \frac{15}{4 \cdot 256 \cdot 2,4414} \right) \approx 1,2575;$$

$$\sqrt[3]{2,5} = \sqrt[3]{1,3^3 + 0,303} = \sqrt[3]{1,3^3} \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{0,303}{2,197}} \approx 1,3 \left( 1 + \frac{0,303}{3 \cdot 2,197} \right) \approx 1,3598;$$

$$\sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{1,3^4 + 0,1439} = \sqrt[4]{1,3^4} \cdot \sqrt[4]{1 + \frac{0,1439}{2,8561}} \approx 1,3 \left( 1 + \frac{0,1439}{4 \cdot 2,8561} \right) \approx 1,3164;$$

$$\sqrt{2,5} = \sqrt{1,6^2 - 0,06} = \sqrt{1,6^2} \cdot \sqrt{1 - \frac{0,06}{2,56}} \approx 1,6 \left( 1 - \frac{0,06}{2 \cdot 2,56} \right) \approx 1,5813;$$

$$\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{1,2^4 - 0,0736} = \sqrt[4]{1,2^4} \cdot \sqrt[4]{1 - \frac{0,0736}{2,0736}} \approx 1,2 \left( 1 - \frac{0,0736}{2 \cdot 2,0736} \right) \approx 1,1787.$$

**567.** а) нет; б) нет; в) нет; г) да, т.к.  $x \geq 0$  и  $\min_{x \geq 0} f(x) = f(0) = 0$

#### 44. Понятие о дифференциальных уравнениях

**568.** а)  $y'(t) = -6\sin(2t + \pi)$ ,  $y''(t) = -12\cos(2t + \pi)$ ;

$$-12\cos(2t + \pi) = -12 \cdot \cos(2t + \pi);$$

$$б) y'(t) = 2\cos\left(\frac{1}{2}t - \frac{\pi}{3}\right), y''(t) = -\sin\left(\frac{1}{2}t - \frac{\pi}{3}\right);$$

$$-\sin\left(\frac{1}{2}t - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{4} \cdot 4\sin\left(\frac{1}{2}t - \frac{\pi}{3}\right);$$

в)  $y'(t) = -8\sin 4t$ ,  $y''(t) = -32\cos 4t$ ;  $-32\cos 4t + 32 \cdot \cos 4t = 0$ ;

г)  $y(t) = \frac{1}{30} \cos(0,1t + 1)$ ,  $y''(t) = -\frac{1}{300} \sin(0,1t + 1)$ ;

$$-\frac{1}{300} \sin(0,1t + 1) + \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{3} \sin(0,1t + 1) = 0$$

**569.**  $y(x) = 15e^{3x}$ ,  $15e^{3x} = 3 \cdot 5 \cdot e^{3x}$ .

**570.**  $y(x) = -14e^{-2x}$ ,  $-14e^{-2x} = -2 \cdot 7e^{-2x}$ .

**571.**  $y(x) = -21e^{-7x}$ ,  $-21e^{-7x} = -7 \cdot 3e^{-7x}$ .

**572.** а) очевидно, что  $y = Asinkx$  – решение;

$y'(x) = A \cdot k \cos kx$ ,  $y''(x) = -Ak^2 \sin kx$ ;

$$y'' + 25y = 0 \Rightarrow -Ak^2 \sin kx + 25Asinkx = 0, \sin kx(25 - k^2) = 0; k = \pm 5;$$

$y(x) = Asin5x$ , где  $A$  – const;

б) очевидно, что  $y = Asinkx$  – решение;

$$\frac{1}{9}y'' + 4y = 0 \Rightarrow -\frac{A}{9}k^2 \sin kx + 4A \sin kx = 0, \sin kx(36 - k^2) = 0, k = \pm 6;$$

$y(x) = Asin6x$ ,  $A$  – const;

в) очевидно, что  $y = Asinkx$  – решение;

$$4y'' + 16y = 0 \Rightarrow -4Ak^2 \sin kx + 16Asinkx = 0, \sin kx(4 - k^2) = 0, k = \pm 2;$$

$y(x) = Asin2x$ ;  $A$  – const;

г) очевидно, что  $y = Asinkx$  – решение;

$$y'' = -\frac{1}{4}y \Rightarrow -Ak^2 \sin kx + \frac{1}{4}A \sin kx = 0, \sin kx\left(\frac{1}{4} - k^2\right) = 0, k = \pm \frac{1}{2};$$

$$y(x) = A \sin \frac{kx}{2}; A \text{ – const.}$$

**573.** а)  $x' = -4\sin(2t - 1)$ ,  $x'' = -8\cos(2t - 1)$ ;

$$-8\cos(2t - 1) + 4 \cdot 2\cos(2t - 1) = 0 \text{ или } x'' + 4x = 0;$$

б)  $x' = -0,64 \sin\left(0,1t + \frac{\pi}{7}\right)$ ,  $x'' = -0,064 \cos\left(0,1t + \frac{\pi}{7}\right)$ ;

$$-0,064 \cos\left(0,1t + \frac{\pi}{7}\right) + 0,01 \cdot 6,4 \cos\left(0,1t + \frac{\pi}{7}\right) = 0$$

или  $x'' + 0,01x = 0$ ;

в)  $x = 4 \sin\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$ ;  $x' = 12 \cos\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$ ;

$$x'' = -36 \sin\left(3t - \frac{\pi}{4}\right); -36 \sin\left(3t - \frac{\pi}{4}\right) + 9 \cdot 4 \sin\left(3t - \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

или  $x'' + 9x = 0$ ;

г)  $x' = 0,213 \cos(0,3t - 0,7)$ ,  $x'' = -0,0639 \sin(0,3t - 0,7)$ ;

$$-0,0639 \sin(0,3t - 0,7) + 0,09 \cdot 0,071 \sin(0,3t - 0,7) = 0 \text{ или } x'' + 0,09x = 0.$$

**574.**

a) Пусть  $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$  –  
периодическая функция с наименьшим положительным периодом  $T$ .  
 $x(t+T) = A_1 \cos(\omega_1 t + \omega_1 T + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \omega_2 T + \varphi_2) =$   
 $= A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) = x(t)$ .

Если это выполнено при любых  $t$  и  $\varphi$ , то

$$\begin{cases} \omega_1 T = 2\pi k, \\ \omega_2 T = 2\pi n, \quad u \quad k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{k}{n} = r - \text{рациональное число при } n \text{ и } k \in \mathbb{Z}.$$

**575.** Зависимость массы вещества от времени:  $m(t) = m_0 e^{-kt}$ .

По условию  $n = m e^{-kt}$ ,  $\ln \frac{m}{n} = kt$ ,  $k = \frac{1}{t} (\ln m - \ln n)$ ; период полураспада

радия  $T$  находим из условия:  $\frac{m}{2} = m e^{-kT}$ ,

$$T = \frac{\ln 2}{k} \text{ или } T = \frac{\ln 2}{\frac{1}{t} (\ln m - \ln n)} = \frac{r \ln 2}{\ln m - \ln n}.$$

$$\mathbf{576.} \ m_1 = m_0 e^{-kt} \Rightarrow t = \frac{1}{k} \ln \frac{m_0}{m_1}; \ k = \frac{\ln 2}{T}, \ t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{m_0}{m_1} = \frac{3}{\ln 2} \cdot \ln \frac{1}{0,125} = 9 \text{ мин.}$$

$$\mathbf{577.} \ m_1 = m_0 e^{-kt}, \ t = \frac{T}{\ln 2} \cdot \ln \frac{m_0}{m_1}; \text{ при } \frac{m_0}{m_1} = 10, \ T = 1 \text{ ч.} : t = \frac{1}{\ln 2} \ln 10 = 3,3 \text{ ч.};$$

$$\frac{m_1}{m_0} = e^{-\frac{\ln 2}{T} t}, \text{ если } t = 100 \text{ лет и } T = 1500 \text{ лет, то } \frac{m_1}{m_0} = e^{-\frac{\ln 2}{1500} \cdot 1000} \approx 0,64.$$

**578.**

$$T' = -k(T - T_1), \ T_1 = 0.$$

Решение этого уравнения  $T(t) = T_0 e^{-kt}$ , где  $k > 0 - \text{const.}$

Для первого тела  $T^{(1)}(t) = T_0^{(1)} e^{-k_1 t}$ , для второго тела  $T^{(2)}(t) = T_0^{(2)} e^{-k_2 t}$ ;

через время  $t_1$  температура 1 тела была  $T_1^{(1)}$ , температура 2 тела  $T_1^{(2)}$ :

$$T_1^{(1)} = T_0^{(1)} e^{-k_1 t_1}, \ k_1 t_1 = \ln \frac{T_0^{(1)}}{T_1^{(1)}}, \ k_1 = \frac{1}{t_1} \ln \frac{T_0^{(1)}}{T_1^{(1)}} : T_1^{(2)} = T_0^{(2)} e^{-k_2 t_1}, \ k_2 = \frac{1}{t_1} \ln \frac{T_0^{(2)}}{T_1^{(2)}};$$

момент времени  $t$ , когда температуры тел сравняются, находим из условия

$$T^{(1)}(t) = T^{(2)}(t) : T_0^{(1)} e^{-\frac{t}{t_1} \ln \frac{T_0^{(1)}}{T_1^{(1)}}} = T_0^{(2)} e^{-\frac{t}{t_1} \ln \frac{T_0^{(2)}}{T_1^{(2)}}}, \frac{T_0^{(1)}}{T_0^{(2)}} = e^{-\frac{t}{t_1} \left[ \ln \frac{T_0^{(2)}}{T_1^{(2)}} - \ln \frac{T_0^{(1)}}{T_1^{(1)}} \right]},$$

$$\frac{t}{t_1} \cdot \ln \frac{T_0^{(2)} \cdot T_1^{(1)}}{T_0^{(1)} \cdot T_1^{(2)}} = \ln \frac{T_0^{(2)}}{T_0^{(1)}}, \quad t = t_1 \frac{\ln \frac{T_0^{(2)}}{T_0^{(1)}}}{\ln \frac{T_0^{(2)} T_1^{(1)}}{T_0^{(1)} T_1^{(2)}}};$$

при  $t_1 = 10$  мин,  $T_0^{(1)} = 200^\circ\text{C}$ ,  $T_0^{(2)} = 100^\circ\text{C}$ ,  $T_1^{(2)} = 80^\circ\text{C}$ ,  $T_1^{(1)} = 100^\circ\text{C}$ ;

$$t = 10 \cdot \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{8} \right)} = 10 \cdot \frac{\ln 2}{\ln 1,6} \approx 14,75 \text{ мин.}$$

### 579.

См. задачу 578.

$$T^{(1)}(t) = T_0^{(1)} e^{-\frac{t}{t_1} \ln \frac{T_0^{(1)}}{T_1^{(1)}}} \text{ и } T^{(2)}(t) = T_0^{(2)} e^{-\frac{t}{t_1} \ln \frac{T_0^{(2)}}{T_1^{(2)}}};$$

$$\Delta T = T^{(1)}(t) - T^{(2)}(t) = e^{\ln T_0^{(1)} - \frac{t}{t_1} \ln \frac{T_0^{(1)}}{T_1^{(1)}}} - e^{\ln T_0^{(2)} - \frac{t}{t_1} \ln \frac{T_0^{(2)}}{T_1^{(2)}}};$$

при  $\Delta T = 25^\circ\text{C}$ ,  $T_0^{(1)} = T_0^{(2)} = 100^\circ\text{C}$ ,  $T_1^{(1)} = 80^\circ\text{C}$ ,  $T_1^{(2)} = 64^\circ\text{C}$ ;  $t_1 = 10$  мин;

$$25 = 100 e^{-\frac{t}{10} \ln \frac{100}{8}} - 100 e^{-\frac{t}{10} \ln \frac{100}{64}}; \quad 25 = 100 \cdot (0,8)^{\frac{t}{10}} - 100 \cdot (0,64)^{\frac{t}{10}};$$

$$(0,8)^{\frac{2t}{10}} - (0,8)^{\frac{t}{10}} + 0,25 = 0, \quad \left( (0,8)^{\frac{t}{10}} - 0,5 \right)^2 = 0; \quad (0,8)^{\frac{t}{10}} = 0,5;$$

$$\frac{t}{10} = \log_{0,8} 0,5; \quad t = 10 \log_{0,8} 0,5 = 10 \frac{\ln 0,5}{\ln 0,8} \approx 31,08 \text{ мин.}$$

### 580.

Т.к.  $v'(t) = -kv(t) = -\frac{5}{3}v(t)$ , и  $v(0) = v_0$ , то

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{5}{3}t}; \quad \text{при } v_0 = 30 \frac{km}{min}, t = 3 \text{ мин};$$

$$v(3) = 500 \cdot e^{-\frac{5}{3} \cdot 3} = 500e^{-5} \approx 3,4 \frac{m}{min}.$$

## **ЗАДАЧИ НА ПОВТОРЕНИЕ**

## **§ 1. Действительные числа**

## **1. Рациональные и иррациональные числа**

1. а) да; б) нет; в) нет; г) да

2.

Обозначим три последовательных натуральных числа:  $a$ ;  $a + 1$ ;  $a + 2$ . Сумма:  $a+a+1+a+2=3a+3$  – делится на три, поскольку каждое слагаемое делится на три. Произведение этих чисел равно  $a(a+1)(a+2)$ . Одно из этих чисел делится на два, другое на три, значит, их произведение делится на шесть.

3. a) 52365; б) 52344.

4.

Число  $10^{56} - 1$  содержит пятьдесят пять девяток, значит, оно делится на 3, 9. На 11 не делится. Поскольку, попробовав поделить на 11 столбиком, получим

5. 35.

6.

Предположим, число  $\frac{ab}{a+b}$  сократима на число  $d$ ,  $d$  – делитель  $ab$ ,

значит, существует общий делитель  $c$  или у чисел  $a$  и  $d$ , или у чисел  $b$  и  $d$ . Пусть  $c$  — делитель  $a$  и  $d$ , тогда  $a + b$  делится на  $c$ .

следовательно,  $b$  делится на  $c$ , значит, дробь  $\frac{a}{c}$  сократима на  $c_1$ , что

противоречит условию. В случае, если  $c$  – делитель у чисел  $b$  и  $d$ , рассуждения аналогичные.

7

$$\text{а) } |a| = \begin{cases} a, & \text{при } a \geq 0, \\ -a, & \text{при } a < 0; \end{cases} \quad |-a| = \begin{cases} -a, & \text{при } a < 0, \\ a, & \text{при } a \geq 0; \end{cases} \quad \text{поэтому, } |a| = |-a|;$$

6)  $|x| = \begin{cases} x, & \text{при } x \geq 0, \\ -x, & \text{при } x < 0; \end{cases}$  для  $x \geq 0$  получим

$|x| = x$ , для  $x < 0$  получим  $x < |x|$ ;

в)  $|x|^2 = \begin{cases} x^2, & \text{если } x \geq 0, \\ (-x)^2, & \text{если } x < 0; \end{cases}$  но  $x^2 = (-x)^2$ ; значит,  $|x|^2 = x^2$ .

8.

а)  $\frac{2,75 : 1,1 + 3\frac{1}{3}}{2,5 - 0,4(-3\frac{1}{3})} = \frac{2,5 + 3\frac{1}{3}}{2,5 + \frac{4}{3}} = \frac{\frac{5}{2} + \frac{10}{3}}{\frac{5}{2} + \frac{4}{3}} = \frac{\frac{5 \cdot 3 + 10 \cdot 2}{6}}{\frac{5 \cdot 3 + 4 \cdot 2}{6}} = \frac{35}{23};$

б)  $\frac{3\frac{1}{3} : 10 + 0,175 : \frac{7}{20}}{1\frac{3}{4} - 1\frac{11}{17} \cdot \frac{51}{56}} = \frac{\frac{10}{3} : 10 + \frac{7}{40} : \frac{7}{20}}{\frac{7}{4} - \frac{28 \cdot 51}{17 \cdot 56}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{7}{4} - \frac{3}{2}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{20}{6} = 3\frac{1}{3};$

в)  $(1,4 - 3,5 : 1\frac{1}{4}) : 2,4 + 3,4 : 2\frac{1}{8} = \left(\frac{7}{5} - \frac{7 \cdot 4}{2 \cdot 5}\right) : \frac{12}{5} + \frac{17 \cdot 8}{5 \cdot 17} =$   
 $= \left(\frac{7}{5} - \frac{14}{5}\right) : \frac{12}{5} + \frac{8}{5} = -\frac{7 \cdot 5}{5 \cdot 12} + \frac{8}{5} = \frac{-7 \cdot 5 + 8 \cdot 12}{5 \cdot 12} = \frac{96 - 35}{60} = \frac{61}{60} = 1\frac{1}{60};$

г)  $\frac{1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{0,25}}{6 - \frac{46}{1 + 2,2 \cdot 10}} = \frac{1 + 2}{6 - \frac{46}{23}} = \frac{3}{4} = 0,75.$

9.

а)  $\frac{0,5^2 - 0,5}{0,4^2 + 0,1^2 + 2 \cdot 0,4 \cdot 0,1} = \frac{0,5(0,5 - 1)}{(0,4 + 0,1)^2} = \frac{(-0,5) \cdot 0,5}{0,5^2} = -1;$

б)  $\frac{1,2^2 - 1,8^2}{1,2 \cdot 0,2 - 1,2 \cdot 0,8} = \frac{(1,2 + 1,8)(1,2 - 1,8)}{1,2(0,2 - 0,8)} = \frac{3 \cdot (-0,6)}{1,2 \cdot (-0,6)} = \frac{3 \cdot 5}{6} = 2,5;$

в)  $\frac{0,6^2 + 0,1^2 - 2 \cdot 0,6 \cdot 0,1}{1,5 - 1,5^2} = \frac{(0,6 - 0,1)^2}{1,5(1 - 1,5)} = \frac{0,5^2}{1,5 \cdot (-0,5)} = -\frac{0,5}{1,5} = -\frac{1}{3};$

г)  $\left(1\frac{3}{5}\right)^2 - \left(4\frac{5}{8} - 2,4\right) : \frac{5}{8} = \left(\frac{8}{5}\right)^2 - \left(4\frac{5}{8} - 2\frac{2}{5}\right) : \frac{5}{8} = \frac{8}{5} \left(\frac{8}{5} - 4\frac{5}{8} + \frac{12}{5}\right) =$   
 $= \frac{8}{5} \left(4 - 4\frac{5}{8}\right) = \frac{8}{5} \cdot \left(-\frac{5}{8}\right) = -1.$

**10.**

- a)  $3,82 \pm 0,1$  – верные цифры – 3 и 8;  
 б)  $1,980 \cdot 10^4 \pm 0,001 \cdot 10^4$  – верные цифры 1 и 9;  
 в)  $7,891 \pm 0,1$  – верные цифры – 7, 9 и 1;  
 г)  $2,8 \cdot 10^4 \pm 0,3 \cdot 10^4$  – верных цифр нет.

**11.**

- a)  $1,002^5 = (1 + 0,002)^5 \approx 1 + 5 \cdot 0,002 = 1 + 0,01 = 1,01$ ;  
 б)  $0,997^4 = (1 - 0,003)^4 \approx 1 - 4 \cdot 0,003 = 1 - 0,012 = 0,988$ ;  
 в)  $2,004^3 = 8(1 + 0,002)^3 \approx 8(1 + 0,006) = 8,048$ ;  
 г)  $3,01^5 = 3^5 \left(1 + \frac{0,01}{3}\right)^5 = 243 \cdot \left(1 + \frac{1}{300}\right)^5 \approx 243 \cdot \left(1 + \frac{1}{60}\right) = 247,05$ .

**12.** а) 15,3; б) 30,7; в) 43,7; г) 3,0.

**13.**

$$\text{а) } 2,(3) = 2 \frac{1}{3}; \quad \text{б) } 0,(66) = \frac{2}{3}; \quad \text{в) } 1,0(8) = 1 \frac{8}{90}; \quad \text{г) } 1,(33) = 1 \frac{1}{3}.$$

**14.**

а) Пусть  $\sqrt{5} = \frac{p}{q}$ ,  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{p}{q}$  – несократимая дробь;

$\frac{p}{q} > 0$ , поэтому  $p$  и  $q$  натуральные числа. Тогда  $5 = \frac{p^2}{q^2}$ , то есть  $p^2 = 5q^2$ , откуда следует, что  $p^2$ . Таким образом, и  $p$  делится на 5, или  $p=5k$ . Подставляя  $p = 5k$  в равенство  $p^2 = 5q^2$ , получим  $25k^2 = 5q^2$ ,  $q^2 = 5k^2$ .

Получим, что и  $q$  делится на 5. Это противоречит тому, что  $\frac{p}{q}$  – несократима, значит предположение неверно и  $\sqrt{5}$  иррационально.

б)  $2\sqrt{7}$  рациональное, если  $\sqrt{7}$  – число рациональное. Пусть  $\sqrt{7} = \frac{m}{n}$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{m}{n}$  – несократимая дробь;  $\frac{m}{n} > 0$ , поэтому можно считать, что  $m$  и  $n$  – натуральные числа. Тогда  $7 = \frac{m^2}{n^2}$ , то есть  $m^2 = 7n^2$ , значит, что  $m^2$ , следовательно, и  $m$  делятся на 7, то есть  $m=7k$ . Подставляя  $m=7k$  в равенство  $m^2=7n^2$ , получаем  $49k^2=7n^2$ ,  $n^2=7k^2$ .

Отсюда видно, что и  $n$  делится на 7. Дробь  $\frac{m}{n}$  сократима на 7.

Предположение неверно,  $2\sqrt{7}$  – иррационально.

в) Пусть  $\sqrt{5} + 1 = r$  (где  $r$  – рационально), тогда  $\sqrt{5} = r - 1$  рационально, это противоречит иррациональности  $\sqrt{5}$ .

г)  $\frac{\sqrt{7}}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{7}$  не рационально, т.к.  $\sqrt{7}$  иррационально.

**15.** а) то  $a + b$  и  $a \cdot b$  числа рациональные.

б) то  $a + b$  также число иррациональное (кроме случая  $a = -b$ ), а  $a \cdot b$  может быть как рациональным, так и иррациональным. (Например:  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{14}$  – иррациональное,  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$  – рациональное).

в)  $a + b$  – иррациональное число,  $a \cdot b$  – иррациональное число.

**16.** а)  $\sqrt{2} + \frac{5}{9} \approx 1,42 + 0,55 = 1,97$ ; б)  $\sqrt{5} - \frac{2}{7} \approx 2,24 - 0,29 = 1,95$ ;

в)  $\sqrt{3} + \frac{5}{9} \approx 1,72 + 0,83 = 2,55$ ; г)  $\sqrt{6} - \frac{1}{11} \approx 2,45 - 0,09 = 2,36$ .

**17.** а)  $-2$  – рациональное,  $-1,7$  – рациональное,  $\frac{\pi}{3}$  – иррациональное,

$\sqrt{3}$  – иррациональное;

б)  $-\sqrt{5}$  – иррациональное,  $-1$  – рациональное,  $\frac{5}{6}$  – рациональное,  $\log_2 3$  – иррациональное;

в)  $-\frac{\sqrt{5}}{2}$  – иррациональное,  $0,2$  – рациональное,  $\frac{7}{6}$  – рациональное;

г)  $-1,6$  – рациональное,  $\lg 100$  – рациональное,  $e$  – иррациональное,  $\sqrt{10}$  – иррациональное.

**18.** а)  $4 < 7$  и  $\lg \frac{1}{2} < 0$ , поэтому  $\frac{4}{\lg \frac{1}{10}} > \frac{7}{\lg \frac{1}{2}}$ ;  $\sqrt{5} + 2 > 0$ ,  $\sqrt{17} > 0$ ;

б)  $(\sqrt{5} + 2)^2 = 5 + 4\sqrt{5} + 4 = 9 + 4\sqrt{5} > 17$ ,  $(\sqrt{17})^2 = 17$ , значит,  $\sqrt{5} + 2 > \sqrt{17}$ ;

в)  $\log_3 7 > 1$ ,  $\log_7 3 = \frac{1}{\log_3 7} < 1$ , значит,  $\log_3 7 > \frac{1}{\log_7 3}$ ;  $\log_3 7 > \log_7 3$ ;

г)  $(\sqrt{7} + 3)^2 = 7 + 6\sqrt{7} + 9 = 16 + 6\sqrt{7} > 31$ .  $(\sqrt{31})^2 = 31$ , значит,  
 $\sqrt{7} + 3 > 31$ .  $\sqrt{7} + 3 > 31$ .

**19.**

а)  $15^{\log_3 10} = (15^{\log_{15} 10})^{\frac{1}{\log_{15} 3}} = 10^{\log_3 15}$ , значит,  $15^{\log_3 10} = 10^{\log_3 5}$ ;

б)  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6} < 10$ ,

$(\sqrt{30} - \sqrt{3})^2 = 30 - 2\sqrt{90} + 3 = 33 - 2\sqrt{90} > 13$ , значит,

$(\sqrt{2} + \sqrt{3}) < (\sqrt{30} - \sqrt{3})$ ;

в)  $7,98 - 2\pi \approx 7,98 - 6,28 \approx 1,70$ ;  $\frac{\pi}{2} < 2,1 < \pi$ ,  $\frac{\pi}{2} < 1,7 < \pi$ ; поскольку

на  $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$   $\sin x$  – убывающая функция, то  $\sin 2,1 < \sin 7,98$ ;

г)  $(\sqrt{8} + \sqrt{5})^2 = 8 + 2\sqrt{40} + 5 = 13 + 4\sqrt{10}$ ,  $(\sqrt{3} + \sqrt{10})^2 = 3 + 2\sqrt{30} + 10 = 13 + 2\sqrt{30}$ , значит,  $\sqrt{8} + \sqrt{5} > \sqrt{3} + \sqrt{10}$ .

**20.**

а)  $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - 2\sqrt{6} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2}{3 - 2} - 2\sqrt{6} = 3 + 2\sqrt{6} + 2 - 2\sqrt{6} = 5$ ;

б)  $(\sqrt{2} + 1)^2 + (1 - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{7} + 1)(\sqrt{7} - 1) = 2 + 2\sqrt{2} + 1 + 1 - 2\sqrt{2} + 2 - 7 + 1 = 0$ ;

в)  $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} - \sqrt{35} = \frac{(\sqrt{7} + \sqrt{5})^2}{2} - \sqrt{35} = 6 + \sqrt{35} - \sqrt{35} = 6$ ;

г)  $(3\sqrt{18} + 2\sqrt{8} + 4\sqrt{50}) : \sqrt{2} = (9\sqrt{2} + 4\sqrt{2} + 20\sqrt{2}) : \sqrt{2} = 9 + 4 + 20 = 33$ .

## 2. Проценты. Пропорция

**21.**

а)  $320 - 100\%$ ,  $x - 2,5\%$ ;  $x = \frac{320 \cdot 2,5}{100} = 8$ ;

б)  $2,5\% - 75$ ,  $100\% - x$ ;  $x = \frac{100 \cdot 75}{2,5} = 3000$ ;

в)  $84 - 100\%$ ,  $2,8 - x$ ;  $x = \frac{2,8 \cdot 100}{84} = 3\frac{1}{3}\%$ ;

г)  $35 - 100\%$ ,  $x - 140\%$ ;  $x = \frac{35 \cdot 140}{100} = 49$ .

**22.**

За 1987 год выпуск продукции составил 104%, за следующий год прирост продукции составил 8% от выпущенного за 1 год. За два года прирост составил  $8,32\%+4\% = 12,32\%$ , значит, средний ежегодный прирост продукции в течение двух лет составил  $12,32\% : 2 = 6,16\%$ .

**23.**

Пусть I число  $-5x$ , II число  $-3x$ , III число  $-20x$  и IV число  $-20x \cdot 0,15 = 3x$ .  
По условию  $5x + 20x + 3x - 3x = 375$ ,  $x = 15$ ; I число  $-75$ ; II число  $-45$ ; III число  $-300$ , IV число  $-45$ .

**24.**

Пусть условная цена на овощи в начале осенне-зимнего периода составила 1, тогда в конце этого периода она составила 1,25 условных единиц.

$1,25 - 100\%$ ,  $1 - x\%$ ;  $x = \frac{1 \cdot 100}{1,25} = 80\%$ . Поэтому, цену весной нужно снизить на 20%.

$$25. \text{ a) } 12 : \frac{1}{8} = x : \frac{5}{6}, \quad \frac{1}{8}x = \frac{12 \cdot 5}{6}, \quad \frac{1}{8}x = \frac{5}{3}, \quad x = \frac{40}{3};$$

$$\text{б) } x : (-0,3) = 0,15 : 1,5, \quad x : (-0,3) = 0,1, \quad x = (-0,3) \cdot 0,1, \quad x = -0,03;$$

$$\text{в) } \frac{0,13}{x} = \frac{26}{3 \cdot \frac{1}{3}}, \quad 26x = \frac{13 \cdot 10}{100 \cdot 3}, \quad x = \frac{1}{3 \cdot 2 \cdot 10} = \frac{1}{60};$$

$$\text{г) } \frac{x}{2,5} = \frac{-6,2}{15}, \quad x = \frac{2,5(-6,2)}{15} = -\frac{2,5 \cdot 6,2}{15}, \quad x = -\frac{31}{30} = -1\frac{1}{30}.$$

$$26. \text{ а) } \frac{x-2}{2,5} = \frac{6}{x}, \quad x(x-2) = 15, \quad x^2 - 2x - 15 = 0, \quad x_1 = 5, \quad x_2 = -3; \quad (-3; 5);$$

$$\text{б) } \frac{x}{x+5} = \frac{4,8}{1,2}, \quad x = 4x + 20, \quad -3x = 20, \quad x = -6\frac{2}{3};$$

$$\text{в) } \frac{x-3}{x-2} = \frac{6,5}{1,5}, \quad (x-3)3 = (x-2)13, \quad 10x = 17, \quad x = 1,7;$$

$$\text{г) } \frac{4-x}{1,2} = \frac{5}{x+3}, \quad (4-x)(x+3) = 6, \quad -x^2 + x + 12 = 6, \\ x^2 - x - 6 = 0, \quad x_1 = -2, \quad x_2 = 3; \quad (-2; 3).$$

**27.**

a)  $\Delta ABC \sim \Delta EBK$  – по двум углам,


$$\frac{AB}{EB} = \frac{BC}{BK}, \quad EB = 22,5 - 18 = 4,5,$$

$$\frac{22,5}{4,5} = \frac{15}{BK}, \quad BK = \frac{4,5 \cdot 15}{22,5} = 3,$$

$$KC = 15 - 3 = 12;$$

$$6) k = \frac{AB}{BE} = \frac{7,5}{7,5 - 5} = \frac{7,5}{2,5} = 3,$$

$$k^2 = \frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta BEK}} = 9, \quad \frac{72}{S_{\Delta BEK}} = 9, \quad S_{\Delta BEK} = 8, \quad S_{\Delta AEKC} = 72 - 8 = 64.$$



### 3. Прогрессии

**28.**  $S_{20} = \frac{a_1 + a_{20}}{2} \cdot 20, \quad a_7 = a_1 + 6d, \quad 20 = 2 + 6d, \quad d = 3,$

$$a_{20} = a_1 + 19d = 2 + 57 = 59, \quad S_{20} = \frac{2 + 59}{2} \cdot 20, \quad S_{20} = 61 \cdot 10 = 610.$$

**29.**  $a_1 = 4, \quad a_6 = 40, \quad a_6 = a_1 + 5d, \quad 40 - 4 = 5d, \quad d = 7,2;$   
 $a_2 = 11,2, \quad a_3 = 18,4, \quad a_4 = 25,6, \quad a_5 = 32,8.$

**30.**  $\frac{1}{\log_3 2} = \log_2 3, \quad \frac{1}{\log_6 2} = \log_2 6 = \log_2 3 + \log_2 2 = \log_2 3 + 1,$

$\frac{1}{\log_{12} 2} = \log_2 12 = \log_2 3 + \log_2 4 = \log_2 3 + 2.$  Значит, числа  $\log_2 3; \log_2 3 + 1; \log_2 3 + 2$  образуют арифметическую прогрессию.

**31.**  $\begin{cases} a_1 + a_5 = 26, \\ a_2 \cdot a_4 = 160; \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 + a_1 + 4d = 26, \\ (a_1 + d)(a_1 + 3d) = 160; \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 = 13 - 2d, \\ a_1^2 + 4a_1d + 3d^2 = 160; \end{cases}$

$$\begin{cases} a_1 = 13 - 2d, \\ (13 - 2d)^2 + 4 \cdot (13 - 2d) \cdot d + 3d^2 = 160; \end{cases}$$

$$169 - 52d + 4d^2 + 52d - 8d^2 + 3d^2 - 160 = 0, \quad -d^2 + 9 = 0, \quad d_1 = 3, \quad d_2 = -3, \\ a_1 = 7, \quad a_1 = 19. \quad a_6 = 7 + 15 = 22 \text{ или } a_6 = 19 - 15 = 4.$$

$$S_6 = \frac{7 + 22}{2} \cdot 6 = 29 \cdot 3 = 87 \quad \text{или} \quad S_6 = \frac{19 + 4}{2} \cdot 6 = 23 \cdot 3 = 69.$$

**32.** Пусть  $a = b_1$ , тогда  $b = b_1 \cdot q, \quad c = b_1 \cdot q^2, \quad d = b_1 \cdot q^3.$

$$(b_1 - b_1 q^2)^2 + (b_1 q - b_1 q^2)^2 + (b_1 q - b_1 q^3)^2 - (b_1 - b_1 q^3)^2 = b_1^2 - 2b_1^2 q^2 + \\ + b_1^2 q^4 + b_1^2 q^2 - 2b_1^2 q^3 + b_1^2 q^4 + b_1^2 q^2 - 2b_1^2 q^4 + b_1^2 q^6 - b_1^2 + 2b_1^2 q^3 - b_1^2 q^6 = 0$$

$$33. \frac{1}{2-\sqrt{2}} : \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(2-\sqrt{2})(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{1}{2+\sqrt{2}}.$$

Произведение второго числа на  $\frac{1}{2+\sqrt{2}} : \frac{1}{2-\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2+\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ .

Получили третье число. Значит эти числа образуют геометрическую прогрессию.

$$34. \begin{cases} b_4 - b_2 = 24, \\ b_2 + b_3 = 6; \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 q^3 - b_1 q = 24, \\ b_1 q + b_1 q^2 = 6; \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 q(q^2 - 1) = 24, \\ b_1 q(1+q) = 6; \end{cases}$$

$$6(q-1) = 24, \quad q-1 = 4, \quad q = 5, \quad 5b_1 = \frac{6}{1+5}, \quad 5b_1 = 1, \quad b_1 = \frac{1}{5}.$$

$$35. b_1 = 3, \quad b_2 = 12, \quad b_n = 3072; \quad q = \frac{b_2}{b_1} = 4, \quad b_n = b_1 \cdot q^{n-1},$$

$$3072 = 3 \cdot 4^{n-1}, \quad 4^{n-1} = 1024; \quad n-1 = 5, \quad n = 6.$$

$$36. b_4 = \frac{1}{54}, \quad q = \frac{1}{3}, \quad b_4 = b_1 \cdot q^3, \quad b_1 = b_4 : q^3 = \frac{1}{54} : \frac{1}{27} = \frac{1}{2},$$

$$S_n = \frac{b_1 \cdot (1-q^n)}{1-q}, \quad \frac{121}{162} = \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}{1 - \frac{1}{3}}, \quad \frac{121}{162} = \frac{3}{4} \left(3 - \frac{1}{3^n}\right), \quad 1 - \frac{1}{3^n} = \frac{121 \cdot 4}{162 \cdot 3},$$

$$-\frac{1}{3^n} = \frac{121 \cdot 4}{162 \cdot 3} - 1, \quad \frac{1}{3^n} = \frac{1}{243}, \quad n = 5.$$

37. Пусть искомые числа  $b_1, b_2, b_3, b_4$ . По условию имеем

$$\begin{cases} b_2 + b_3 = 12, \\ b_1 + b_4 = 14, \end{cases} \quad \text{и} \quad b_4 = b_3 + (b_3 - b_2).$$

$$\begin{cases} b_1 \cdot q + b_1 \cdot q^2 = 12, \\ b_1 + b_3 + (b_3 - b_2) = 14; \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 \cdot q(1+q) = 12, \\ b_1 + 2b_3 - b_2 = 14; \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 \cdot q(1+q) = 12, \\ b_1(1+2q^2 - q) = 14; \end{cases}$$

$$b_1 = \frac{14}{1+2q^2-q} = \frac{12}{q(1+q)}, \quad 14q + 14q^2 = 12 + 24q^2 - 12q,$$

$$10q^2 - 26q + 12 = 0, \quad 5q^2 - 13q + 6 = 0,$$

$$q_1 = 2, \quad q_2 = 0,6, \quad b_1 = 2 \quad \text{или} \quad b_1 = 12,5, \quad \text{или} \quad b_2 = 4, \quad b_2 = 7,5, \quad b_3 = 8, \quad \text{или}$$

$$b_3 = 4,5, \quad b_4 = 12, \quad \text{или} \quad b_4 = 1,5.$$

Ответ: 2; 4; 8; 12 или 12,5; 7,5; 4,5; 1,5.

$$38. q = \frac{2}{\sqrt{3}+1} : \sqrt{3} = \frac{2}{(\sqrt{3}+1)\sqrt{3}} = \frac{2}{3+\sqrt{3}} = \frac{2(3-\sqrt{3})}{9-3} = \frac{3-\sqrt{3}}{3} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$S = \frac{b_1}{1-q}, \quad \frac{\sqrt{3}}{1-1+\frac{\sqrt{3}}{3}} = 3. \text{ Ответ: } 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}; \quad 3.$$

$$39. \begin{cases} \frac{b_1 \cdot (1-q^3)}{1-q} = 10,5, \\ \frac{b_1}{1-q} = 12; \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 \cdot (1+q+q^2) = 10,5, \\ b_1 = 12(1-q); \end{cases} \quad 12(1-q)(1+q+q^2) = 10,5,$$

$$12(1-q^3) = 10,5, \quad 1-q^3 = 10,5 : 12, \quad q^3 = \frac{1}{8},$$

$$q = \frac{1}{2}; \quad b_1 = 12 \cdot (1 - \frac{1}{2}) = 6. \text{ Ответ: } b_1 = 6; \quad q = \frac{1}{2}.$$

40.

Если  $b > 0$ ,  $b \neq -1$  и  $a^n, a^{n+k}, a^{n+2k}$  — геометрическая прогрессия, то  $\log_b a^n, \log_b a^{n+k}, \log_b a^{n+2k}$  — арифметическая прогрессия, значит,  $\log_b a^n, \log_b a^{n+k}, \log_b a^{n+2k}$  — арифметическая прогрессия.

## § 2. Тождественные преобразования

### 4. Преобразования алгебраических выражений

$$41. \text{ a) } a^2 + b^2 + 2a - 2b - 2ab = a^2 - 2ab + b^2 + 2(a - b) = (a - b)^2 + 2(a - b) = (a - b)(a - b + 2);$$

$$\text{б) } x^3 + (y - 1)x + y = x^3 + xy - x + y = x(x^2 - 1) + y(x + 1) = (x + 1)(x^2 - x + y);$$

$$\text{в) } a^6 - 8 = (a^2)^3 - 2^3 = (a^2 - 2)(a^4 + 2a^2 + 4) = (a + \sqrt{2})(a - \sqrt{2})(a^4 + 2a^2 + 4);$$

$$\text{г) } x^4 - x^2(y^2 + 1) + y^2 = x^4 - x^2y^2 - x^2 + y^2 = x^2(x^2 - 1) - y^2(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 - y^2) = (x + 1)(x - 1)(x + y)(x - y).$$

$$42. \text{ а) } n^4 + 2n^3 - n^2 - 2n = n^2(n^2 - 1) + 2n(n^2 - 1) = (n^2 - 1)(n^2 + 2n) = (n^2 - 1) \cdot n \cdot (n + 2) = (n - 1) \cdot n \cdot (n + 1) \cdot (n + 2)$$

произведение четырех последовательных натуральных чисел делится на 2, 3, 4, а значит, делится и на 24 при  $n = 2, 3, \dots$ ;

$$\text{б) } (n^2 + 4n + 3)(n^2 + 6n + 8) = (n + 3)(n + 1)(n + 2)(n + 4) = (n + 1)(n + 2)(n + 3)(n + 4)$$

это произведение четырех последовательных натуральных чисел, которое делится на 2, 3, 4, а значит, делится и на 24;

в)  $n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1)$  – произведение трех последовательных натуральных чисел, которое делится на 2 и на 3, а значит, делится и на 6 при  $n = 2, 3, \dots$ ;

г)  $n^3 - 4n = n(n^2 - 4) = n(n-2)(n+2) = (n-2)n \cdot (n+2)$ . Так как  $n = 2k$ ,  $k \in N$ , то  $(n-2)n(n+2) = (2k-2)2n(2k+2) = 2(k-1)2n \cdot 2(k+1) = 8(k-1)k(k+1)$  – это произведение делится на 8, на 3, на 2, а значит, делится на 48.

$$43. \text{ a)} \frac{a^3 + a^2 - a - 1}{a^2 + 2a + 1} = \frac{a^2(a+1) - (a+1)}{(a+1)^2} = \frac{(a+1)(a^2 - 1)}{(a+1)^2} = a - 1;$$

$$б) \frac{x^2 + x - 12}{x^2 + 8x + 16} = \frac{(x-3)(x-4)}{(x+4)^2} = \frac{x-3}{x+4};$$

$$\text{в)} \frac{2a^2 - 5a + 2}{ab - 2b - 3a + 6} = \frac{(a-2)(2a-1)}{a(b-3) - 2(b-3)} = \frac{(a-2)(2a-1)}{(a-2)(b-3)} = \frac{2a-1}{b-3};$$

$$\text{г)} \frac{x^3 - 27}{x^2y + 3xy + 9y} = \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)}{y(x^2 + 3x + 9)} = \frac{x-3}{y}.$$

$$44. \text{ a)} \left( m+n - \frac{4mn}{m+n} \right) \cdot \left( \frac{m}{m+n} - \frac{n}{n-m} - \frac{2mn}{m^2-n^2} \right) = \frac{(m+n)^2 - 4mn}{m+n};$$

$$: \frac{nm - m^2 - mn - n^2 - 2mn}{m^2 - n^2} = \frac{(m-n)^2}{m+n} : \frac{-(m+n)^2}{m^2 - n^2} =$$

$$= - \frac{(m-n)^2(m^2 - n^2)}{(m+n)(m+n)^2} = - \frac{(m-n)^3}{(m+n)^2};$$

$$б) \frac{a^3 + b^3}{a+b} : (a^2 - b^2) + \frac{2b}{a+b} - \frac{ab}{a^2 - b^2} = \frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 - b^2} + \frac{2b(a-b)}{a^2 - b^2} -$$

$$- \frac{ab}{a^2 - b^2} = \frac{a^2 - ab + b^2 + 2ab - 2b^2 - ab}{a^2 - b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 - b^2} = 1;$$

$$\text{в)} \left( \frac{x}{x^2 - 4} - \frac{8}{x^2 + 2x} \right) \cdot \frac{x^2 - 2x}{4-x} + \frac{x+8}{x+2} = \frac{(x^2 - 8x + 16)}{x(x^2 - 4)} \cdot \frac{x(x-2)}{4-x} + \frac{x+8}{x+2} =$$

$$= \frac{(x-4)^2(x-2)}{(x^2 - 4)(4-x)} + \frac{x+8}{x+2} = \frac{4-x}{x+2} + \frac{x+8}{x+2} = \frac{12}{x+2};$$

$$\begin{aligned}
& \text{r) } \left( \frac{1}{c^2+3c+2} + \frac{2c}{c^2+4c+3} + \frac{1}{c^2+5c+6} \right)^2 \cdot \frac{(c-3)^2+12c}{2} = \\
&= \left( \frac{1}{(c+1)(c+2)} + \frac{2c}{(c+1)(c+3)} + \frac{1}{(c+2)(c+3)} \right)^2 \cdot \frac{c^2-6c+9+12c}{2} = \\
&= \left( \frac{c+3+2c(c+2)+c+1}{(c+1)(c+2)(c+3)} \right)^2 \cdot \frac{(c+3)^2}{2} = \\
&= \left( \frac{2(c+1)(c+2)}{(c+1)(c+2)(c+3)} \right)^2 \cdot \frac{(c+3)^2}{2} = \frac{4 \cdot (c+3)^2}{(c+3)^2 \cdot 2} = 2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{45. a) } \left( \frac{3}{2x-y} - \frac{2}{2x+y} - \frac{1}{2x-5y} \right) : \frac{4y^2}{4x^2-y^2} = \left( \frac{6x+3y-4x+2y}{4x^2-y^2} - \frac{1}{2x-5y} \right) : \\
& \quad : \frac{4y^2}{4x^2-y^2} = \left( \frac{2x+5y}{4x^2-y^2} - \frac{1}{2x-5y} \right) : \frac{4y^2}{4x^2-y^2} = \frac{4x^2-25y^2-4x^2+y^2}{(4x^2-y^2)(2x-5y)} : \\
& \quad : \frac{4y^2}{4x^2-y^2} = \frac{-24y^2(4x^2-y^2)}{(4x^2-y^2)(2x-5y)4y^2} = \frac{-6}{2x-5y} = \frac{6}{5y-2x}; \\
& \text{b) } \left( \frac{3}{a-3} + \frac{4}{a^2-5a+6} + \frac{2a}{a-2} \right) : \left( \frac{3}{2a+1} \right)^{-1} - \frac{a-12}{3(3-a)} = \\
&= \frac{3a-6+4+2a^2-6a}{(a-2)(a-3)} : \frac{2a+1}{3} - \frac{a-12}{3(3-a)} = \frac{2a^2-3a-2}{(a-2)(a-3)} : \frac{2a+1}{3} - \frac{a-12}{3(3-a)} = \\
&= \frac{(a-2)(2a+1)3}{(a-2)(a-3)(2a+1)} - \frac{a-12}{3(3-a)} = \frac{3}{a-3} + \frac{a-12}{3(a-3)} = \frac{9+a-12}{3(a-3)} = \frac{a-3}{3(a-3)} = \frac{1}{3}; \\
& \text{b) } \left( \frac{x^3-8}{x-2} + 2x \right) : (4-x^2)^{-1} - \frac{x-1}{2-x} = (x^2+2x+4+2x) \cdot \frac{1}{4-x^2} - \frac{x-1}{2-x} = \\
&= \frac{(x+2)^2}{4-x^2} - \frac{x-1}{2-x} = \frac{x+2}{2-x} - \frac{x-1}{2-x} = \frac{3}{2-x}; \\
& \text{r) } \frac{k^2}{3+k} : \frac{9-k^2}{k^2-3k} + \frac{27+k^3}{3-k} : \left( 3 + \frac{k^2}{3-k} \right) = \frac{k^2}{3} \cdot \frac{(3-k)}{k(k-3)} + \frac{27+k^3}{3-k} : \\
& \quad : \left( \frac{9-3k+k^2}{3-k} \right) = -k + \frac{(27+k^3)(3-k)}{k^2-3k+9} = -k+3+k=3.
\end{aligned}$$

**5. Преобразование выражений, содержащих радикалы и степени с дробными показателями**

46. а)  $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{5})}{3 - 5} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{10}}{2} = \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2};$

б)  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = \frac{\sqrt{15} + \sqrt{6}}{3};$

в)  $\frac{2}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{15}}{15};$  г)  $\frac{3}{\sqrt{7} + \sqrt{2}} = \frac{3(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{7 - 2} = \frac{3(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{5}.$

47. а)  $\sqrt{(\sqrt{5} - 2,5)^2} - \sqrt[3]{(1,5 - \sqrt{5})^3} - 1 = |\sqrt{5} - 2,5| - (1,5 - \sqrt{5}) = 2,5 - \sqrt{5} - 1,5 + \sqrt{5} = 1;$

б)  $\frac{(5\sqrt{3} + \sqrt{50})(5 - \sqrt{24})}{(\sqrt{75} - 5\sqrt{2})} = \frac{(5\sqrt{3} + 5\sqrt{2})^2(5 - 2\sqrt{6})}{75 - 50} =$

$= \frac{(5\sqrt{3} + 5\sqrt{2})^2(5 - 2\sqrt{6})}{25} = (5 + 2\sqrt{6})(5 - 2\sqrt{6}) = 25 - 24 = 1;$

в)  $(\sqrt{(\sqrt{2} - 1,5)^2} - \sqrt[3]{(1 - \sqrt{2})^3})^2 + 0,75 = (1,5 - \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2})^2 + 0,75 = 0,5^2 + 0,75 = 1;$

г)  $\frac{2\sqrt{6} - \sqrt{20}}{2\sqrt{5} + \sqrt{24}} \cdot (11 + 2\sqrt{30}) = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{5})^2}{6 - 5} \cdot (11 + 2\sqrt{30}) =$

$= (6 - 2\sqrt{30} + 5)(11 + 2\sqrt{30}) = 121 - 120 = 1.$

48.

а)  $\left( \frac{a+2}{\sqrt{2a}} - \frac{a}{\sqrt{2a} + 2} + \frac{2}{a - \sqrt{2a}} \right) \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a+2} = \left( \frac{a+2}{\sqrt{2a}} - \frac{a}{\sqrt{2}(\sqrt{a} + \sqrt{2})} + \frac{2}{\sqrt{a}(\sqrt{a} - \sqrt{2})} \right) \times$   
 $\times \frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a+2} = \frac{(a+2)(a-2) - a(\sqrt{a} - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{a} + 2 \cdot \sqrt{2}(\sqrt{a} + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{a} - \sqrt{2}}{\sqrt{2a}(a-2)} \cdot \frac{a+2}{a+2} =$   
 $= \frac{a^2 - 4 - a^2 + a\sqrt{2a} + 2\sqrt{2a} + 4}{\sqrt{2a}(a-2)} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a+2} = \frac{a\sqrt{2a} + 2\sqrt{2a}}{\sqrt{2a}(a-2)} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a+2} =$   
 $= \frac{a+2}{a-2} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a+2} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a-2},$

б)  $\left( \frac{a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} - \sqrt{ab} \right) \left( \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a-b} \right)^2 = (a - \sqrt{ab} + b - \sqrt{ab}) \left( \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a-b} \right)^2 =$   
 $= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{(a-b)^2} = \frac{(a-b)^2}{(a-b)^2} = 1;$

$$\text{B)} \frac{\sqrt{x}+1}{1+\sqrt{x}+x} : \frac{1}{x^2-\sqrt{x}} = \frac{(\sqrt{x}+1)\sqrt{x}(x\sqrt{x}-1)}{1+\sqrt{x}+x} = \sqrt{x}(x-1);$$

$$\text{r)} \left( \frac{\sqrt{c}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{c}} \right)^2 \left( \frac{\sqrt{c}-1}{\sqrt{c}+1} - \frac{\sqrt{c}+1}{\sqrt{c}-1} \right) = \left( \frac{c-1}{2\sqrt{c}} \right)^2 \left( \frac{(\sqrt{c}-1)^2 - (\sqrt{c}+1)^2}{c-1} \right) = \\ = \frac{(c-1)^2(2\sqrt{c} \cdot (-2))^2}{4c(c-1)^2} = \frac{16c}{4c} = 4.$$

$$\text{49. a)} \left( \sqrt{k} - \frac{\sqrt[4]{k^3} + 1}{\sqrt[4]{k} + 1} \right)^{-1} - \frac{\sqrt[4]{k^3} + \sqrt{k}}{\sqrt{k} - 1} = (\sqrt{k} - \sqrt{k} + \sqrt[4]{k} - 1)^{-1} - \frac{\sqrt[4]{k}(\sqrt[4]{k^2} + \sqrt[4]{k})}{\sqrt{k} - 1} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt[4]{k} - 1} - \frac{\sqrt{k}(\sqrt[4]{k} + 1)}{\sqrt{k} - 1} = \frac{1 - \sqrt{k}}{\sqrt[4]{k} - 1} = \frac{\sqrt{k} - 1}{\sqrt[4]{k} - 1} = -\sqrt[4]{k} - 1;$$

$$\text{b)} \left( \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (2\sqrt{b})^2}{a-b} - \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right) : \frac{32b\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \\ = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b} - 2\sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b} + 2\sqrt{b}) - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{a-b} : \frac{32b\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \\ = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b} - \sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(a-b) \cdot 32b\sqrt{b}} = \frac{4\sqrt{b}}{32b\sqrt{b}} = \frac{1}{8b},$$

$$\text{b)} \left( \frac{\sqrt[4]{x^3} - \sqrt[4]{y^3}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} - (\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}) \right) \left( \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} + 1 \right) = \left( \frac{(\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y})(\sqrt{x} + \sqrt[4]{xy} + \sqrt{y})}{(\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y})(\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y})} - (\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}) \right) \times \\ \times \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}}{\sqrt[4]{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt[4]{xy} + \sqrt{y} - \sqrt{x} - 2\sqrt[4]{xy} - \sqrt{y}}{\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}} \cdot \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}}{\sqrt[4]{y}} = \frac{-\sqrt[4]{xy}(\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y})}{(\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y})\sqrt[4]{y}} = -\sqrt[4]{x};$$

$$\text{r)} \frac{\sqrt{a^3} + \sqrt{ab^2} - \sqrt{a^2b} - \sqrt{b^3}}{\sqrt[4]{b^5} + \sqrt[4]{a^4b} - \sqrt[4]{ab^4} - \sqrt[4]{a^5}} = \frac{\sqrt{a}(a+b) - \sqrt{b}(a+b)}{\sqrt[4]{b}(a+b) - \sqrt[4]{a}(a+b)} = \\ = \frac{(a+b)(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(a+b)(\sqrt[4]{b} - \sqrt[4]{a})} = \frac{(\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b})(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b})}{\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}} = -(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}).$$

$$\text{50. a)} \frac{x-1}{\frac{1}{x+x^{\frac{1}{2}}} + 1} : \frac{x^{0,5}+1}{x^{1,5}-1} + \frac{2}{x^{-0,5}} = \frac{(x^{0,5}-1)(x^{0,5}+1)(x^{1,5}+1)}{(x+x^{0,5}+1)(x^{0,5}+1)} + 2x^{0,5} = \\ = \frac{(x^{0,5}-1)(x^{0,5}-1)}{1} + 2x^{0,5} = (x^{0,5}-1)^2 + 2x^{0,5} = x+1;$$

$$6) \left( \frac{\frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{b^2} - \frac{ab}{a+a^2b^2}}{\frac{1}{a+b^2}} \right) : \frac{\frac{1}{(ab)^4} - \frac{1}{b^2}}{a-b} = \left( \frac{\frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{b^2} - \frac{ab}{a^2(a^2+b^2)}}{\frac{1}{a^2(a^2+b^2)}} \right) : \frac{\frac{1}{b^4}(a^4-b^4)}{a-b} =$$

$$= \frac{\frac{1}{a^2b^2}(a^2+b^2) - a^2b(a-b)}{(a^2+b^2)b^4(a^4-b^4)} = \frac{\frac{1}{a^2b^2}(a^2+b^2-b^2)(a^2-b^2)(a^2+b^2)}{(a^2+b^2)b^4(a^4-b^4)} =$$

$$= \frac{\frac{1}{a^2b^2} \cdot a^2(a^2-b^2)}{\frac{1}{a^4-b^4}} = \frac{ab^2(a^4+b^4)}{1} = ab^2(a^4+b^4);$$

$$b) \left( \frac{\frac{1}{2x+x^2y^2}}{3x} \right)^{-1} \cdot \left( \frac{\frac{3}{x^2-y^2}}{\frac{1}{x-x^2y^2}} - \frac{x-y}{x^2+y^2} \right) =$$

$$= \frac{3x}{\frac{1}{x^2}(2x^2+y^2)} \cdot \left( \frac{\frac{1}{x+x^2y^2} + y}{\frac{1}{x^2}} - \frac{\frac{1}{x^2-y^2}}{1} \right) = \frac{3x}{x^2(2x^2+y^2)} \times$$

$$\times \frac{\frac{1}{x+x^2y^2} + y}{\frac{1}{x^2}} = \frac{3x}{x^2(2x^2+y^2)} \cdot \frac{\frac{1}{y^2}(2x^2+y^2)}{\frac{1}{x^2}} = 3y^{\frac{1}{2}},$$

$$r) \left( \frac{\frac{1-c^{-2}}{1-\frac{1}{c^2}} - \frac{2c^{\frac{1}{2}}}{c^2} + \frac{c^{-2}-c}{c^2-c}}{\frac{1}{c^2-c} - \frac{1}{2}} \right) \cdot \left( 1 + \frac{2}{c^2} \right)^{-2} = \left( \frac{1-\frac{1}{c^2}}{\sqrt{c}-\frac{1}{\sqrt{c}}} - \frac{2\sqrt{c}}{c^2} + \frac{\frac{1}{c^2}-c}{\sqrt{c}-\frac{1}{\sqrt{c}}} \right) \times$$

$$\times \left( \frac{c^2+2}{c^2} \right)^{-2} = \left( \frac{(c^2-1)\sqrt{c}}{c^2(c-1)} - \frac{2\sqrt{c}}{c^2} + \frac{(1-c^3)\sqrt{c}}{c^2(c-1)} \right) \cdot \left( \frac{c^2}{c^2+2} \right)^2 =$$

$$= \frac{\sqrt{c}}{c^2} (c+1-2-(1+c+c^2)) \cdot \frac{c^4}{(c^2+2)^2} = \frac{c^2\sqrt{c}}{c^2+2}.$$

$$51. a) \frac{\frac{7}{a^3} - 2\frac{5}{a^3}b^{\frac{2}{3}} + ab^{\frac{4}{3}}}{\frac{5}{a^3} - \frac{4}{a^3}b^{\frac{1}{3}} - \frac{2}{ab^3} + \frac{2}{a^3b}} \cdot a^{-\frac{1}{3}} = \frac{a(\frac{4}{a^3} - 2\frac{2}{a^3}b^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{4}{3}})}{a^3((a^3-ab^3)-(a^3b^3-a^3b))} =$$

$$= \frac{a(a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}})^2}{\frac{1}{a^3} \frac{2}{(a^3 - b^3)} \frac{2}{(a - a^3 b^3)} \frac{1}{a(a^3 - b^3)}} = \frac{a(a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}})}{\frac{1}{a^3} \frac{1}{a(a^3 - b^3)}} = a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}};$$

$$6) \left( \frac{\frac{1}{2(x^4 - y^4)}}{\frac{1}{x} \frac{1}{2y} \frac{1}{4-x} \frac{1}{4y} \frac{1}{2}} - x - y \right) : \frac{y-x}{x} \frac{1}{2-y} \frac{1}{2} = \left( \frac{\frac{1}{2(x^4 - y^4)} x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{y^4 - x^4}} - x - y \right) \times$$

$$\times \frac{\frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{(y-x)x^2y^2} \frac{1}{(y^2+x^2)x^2y^2}} = \frac{(2x^2y^2 - x - y)}{\frac{1}{(y^2+x^2)x^2y^2}} = -\frac{(x^2 + y^2)}{\frac{1}{x^2y^2}} = -y^{-\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}};$$

$$b) \frac{\frac{c-1}{3} \cdot \frac{c^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{4}}}{c^{\frac{1}{4}} + c^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{c^{\frac{1}{2}} + 1}}{c^{\frac{1}{2}} + 1} + 1 = \frac{c-1}{c^2(c^{\frac{1}{4}} + 1)} \cdot \frac{\frac{1}{c^{\frac{1}{4}} + 1}}{\frac{1}{c^{\frac{1}{2}} + 1}} + 1 = c^{\frac{1}{2}} - 1 + 1 = c^{\frac{1}{2}};$$

$$r) \frac{\frac{1}{3(ab)^2} - 3b}{a-b} + \frac{\frac{1}{(a^2 - b^2)^3} + 2a^2 + b^2}{\frac{3}{a^2 + b^2}} = -\frac{\frac{1}{3b^2} \frac{1}{(a^2 - b^2)}}{\frac{1}{(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)}} + \\ + \frac{\frac{3}{a^2} - 3ab^2 + 3a^2b - b^2 + 2a^2 + b^2}{\frac{3}{a^2 + b^2}} = \\ = \frac{\frac{3b^2}{a^2 + b^2} + 3a^2 \frac{1}{a^2 + b^2} \frac{1}{a^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2}}{\frac{1}{a^2 + b^2}} = 3.$$

## 6. Преобразования тригонометрических выражений

$$52. a) \operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} - \sin^2 \alpha - \frac{\sin^4 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \\ = \frac{\sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha - \sin^4 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha (1 - \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)}{\cos^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha \cdot 0}{\cos^2 \alpha} = 0; \\ 6) \sqrt{\frac{\sin^2 \beta (\sin \beta + \cos \beta)}{\sin \beta} + \frac{\cos^2 \beta (\cos \beta + \sin \beta)}{\cos \beta}} = \\ = \sqrt{\sin \beta (\sin \beta + \cos \beta) + \cos \beta (\cos \beta + \sin \beta)} = \sqrt{(\sin \beta + \cos \beta)^2} = |\sin \beta + \cos \beta|;$$

$$\text{B) } (3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha)^2 + (2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha)^2 = 9 \sin^2 \alpha + 12 \sin \alpha \cdot \cos \alpha + 4 \cos^2 \alpha + 4 \sin^2 \alpha - 12 \sin \alpha \cdot \cos \alpha + 9 \cos^2 \alpha = 9(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + 4(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 13;$$

$$\text{r) } \frac{\cos \beta \cdot \operatorname{tg} \beta}{\sin^2 \beta} - \operatorname{ctg} \beta \cdot \cos \beta = \frac{1}{\sin \beta} - \frac{\cos^2 \beta}{\sin \beta} = \frac{1 - \cos^2 \beta}{\sin \beta} = \frac{\sin^2 \beta}{\sin \beta} = \sin \beta.$$

$$\text{53. a) } 2 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}(\alpha - \pi) + \operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = 2 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha;$$

$$\text{б) } \frac{\sin(-\alpha)}{\sin(\pi - \alpha)} - \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}{\operatorname{ctg} \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)} = -1 - 1 + 1 = -1;$$

$$\text{в) } \frac{\operatorname{tg}(\pi - \beta) \cdot \cos(\pi - \beta) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \cdot \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)} = \\ = \frac{(-\operatorname{tg} \beta) \cdot (-\cos \beta) \cdot \operatorname{ctg} \beta}{(-1) \cos \beta \cdot (-\operatorname{tg} \beta) - \operatorname{ctg} \beta} = \frac{\cos \beta}{\cos \beta} = 1;$$

$$\text{г) } \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) \cdot \sin \frac{3\pi}{2} \cdot \sin \frac{16\pi}{9} \cdot \cos \frac{13\pi}{18}}{\operatorname{ctg}(\pi - \alpha) \cdot \cos \frac{5\pi}{18} \cdot \sin \frac{11\pi}{9} \cdot \cos 2\pi} = \\ = \frac{-\operatorname{ctg} \alpha \cdot \sin\left(2\pi - \frac{2\pi}{9}\right) \cos\left(\pi - \frac{5\pi}{18}\right)}{-\operatorname{ctg} \alpha \cdot \cos \frac{5\pi}{18} \cdot \sin\left(\pi + \frac{2\pi}{9}\right) \cdot 1} = \frac{(-1)(-1) \sin \frac{2\pi}{9} \left(-\cos \frac{5\pi}{18}\right)}{\cos \frac{5\pi}{18} \cdot \left(-\sin \frac{2\pi}{9}\right)} = 1.$$

$$\text{54. а) } \frac{\operatorname{tg}(\alpha + \beta) - \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \beta)} = \operatorname{tg} \beta;$$

$$\begin{aligned} & \frac{\operatorname{tg}(\alpha + \beta) - \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \beta)} = \\ & = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} = \\ & = \frac{\operatorname{tg} \alpha (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta)}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} = \\ & = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \beta}{\operatorname{tg} \alpha (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta)} = \\ & = \frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta)}{\operatorname{tg} \alpha (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta)} = \operatorname{tg} \beta. \end{aligned}$$

Таким образом, равенство истинное.

$$6) \frac{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha} = \operatorname{tg} \alpha ;$$

$$\frac{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha} = \frac{2 \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha .$$

Тождество доказано.

$$b) \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)} = \operatorname{ctg} \alpha ;$$

$$\frac{\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta + \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta + \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta} = \frac{2 \cos \alpha \cdot \cos \beta}{2 \sin \alpha \cdot \cos \beta} = \operatorname{ctg} \alpha .$$

Тождество доказано.

$$g) \frac{\sin \alpha - \sin 3\alpha}{\cos \alpha - \cos 3\alpha} = -\operatorname{ctg} 2\alpha ;$$

$$\begin{aligned} \frac{\sin \alpha - \sin 3\alpha}{\cos \alpha - \cos 3\alpha} &= \frac{\sin \alpha - (\sin \alpha \cos 2\alpha + \cos \alpha \sin 2\alpha)}{\cos \alpha - (\cos \alpha \cos 2\alpha - \sin \alpha \sin 2\alpha)} = \\ &= \frac{\sin \alpha - (\sin \alpha (1 - 2 \sin^2 \alpha) + \cos \alpha \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha)}{\cos \alpha - (\cos \alpha (1 - 2 \sin^2 \alpha) - \sin \alpha \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha)} = \\ &= \frac{\sin \alpha - \sin \alpha + 2 \sin^3 \alpha - 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha}{\cos \alpha - \cos \alpha + 2 \cos \alpha \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos \alpha} = \\ &= \frac{\sin \alpha (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)}{2 \sin^2 \alpha \cos \alpha} = -\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha} = -\frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = -\operatorname{ctg} 2\alpha . \end{aligned}$$

Мы доказали тождество.

$$55. a) \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \alpha}} = \cos \frac{\alpha}{4} \text{ при } \pi < \alpha < 2\pi .$$

$$\text{Если } \pi < \alpha < 2\pi, \text{ то } \frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \pi \text{ и } \cos \frac{\alpha}{2} < 0 .$$

$$\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} (1 + \cos \alpha)}} = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}} = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left| \cos \frac{\alpha}{2} \right|} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2} (1 + \cos \frac{\alpha}{2})} = \sqrt{\cos^2 \frac{\alpha}{4}} = \left| \cos \frac{\alpha}{4} \right| =$$

$$= \cos \frac{\alpha}{4}, \quad \text{так как } \frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{4} < \frac{\pi}{2}, \quad \cos \frac{\alpha}{4} > 0, \quad \left| \cos \frac{\alpha}{4} \right| = \cos \frac{\alpha}{4} .$$

Мы доказали тождество.

$$6) \sqrt{1 - \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\alpha}} = \sqrt{2} \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right) \text{ при } \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}.$$

Если  $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ , то  $\sin \alpha < 0$ ,  $|\sin \alpha| = -\sin \alpha$ .

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \sqrt{\sin^2 \alpha}} &= \sqrt{1 + \sin \alpha} = \sqrt{\sin \frac{\pi}{2} + \sin \alpha} = \sqrt{2 \sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2}} = \\ &= \sqrt{2 \sin \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2} \right) \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right)} = \sqrt{2 \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right) \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right)} = \\ &= \sqrt{2 \cos^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right)} = \sqrt{2} \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right), \\ \frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} < -\frac{\pi}{4}, \quad \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right) > 0. \end{aligned}$$

Мы доказали тождество.

$$b) \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha}} = -\cos \frac{\alpha}{2} \text{ при } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi, \quad \frac{3\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \pi.$$

Значит,

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha}} &= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\cos 2\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \alpha} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (1 + \cos \alpha)} = \sqrt{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} = -\cos \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

Мы доказали тождество.

$$g) \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \alpha}} = \sqrt{2} \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right) \text{ при } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi, \quad \frac{3\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \pi.$$

Значит,

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \alpha}} &= \sqrt{1 + \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}} = \sqrt{1 + \sin \frac{\alpha}{2}} = \sqrt{\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}} = \\ &= \sqrt{2 \sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2}} = \sqrt{2 \sin \left( \frac{\pi}{2} - \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{4} \right) \right) \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{4} \right)} = \\ &= \sqrt{2 \cos^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{4} \right)} = \sqrt{2} \cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{4} \right). \end{aligned}$$

Если  $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ , то  $-\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{4} < -\frac{\pi}{8}$ ,  $\cos \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{4} \right) > 0$ .

Тождество доказано.

$$56. \text{ a) } \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \left( \pi - \frac{2\pi}{7} \right) = -\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7};$$

$$-\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cdot \sin \frac{\pi}{7} = \frac{1}{8} \sin \frac{\pi}{7};$$

преобразуем левую часть равенства:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} &= -\frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{2\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} = \\ &= -\frac{1}{4} \cdot 2 \sin \frac{2\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} = -\frac{1}{4} \sin \frac{4\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} = -\frac{1}{8} \sin \frac{8\pi}{7} = \\ &= -\frac{1}{8} \sin \left( \pi + \frac{\pi}{7} \right) = \frac{1}{8} \sin \frac{\pi}{7}; \end{aligned}$$

полученное выражение равно правой части, исходное равенство верно.

$$6) \frac{\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} - 4 \sin 20^\circ \cdot \sin 50^\circ = \sin 20^\circ \left( \frac{1}{\cos 20^\circ} - 4 \sin 50^\circ \right) =$$

$$= \sin 20^\circ \left( \frac{1 - 2(\sin 30^\circ + \sin 70^\circ)}{\cos 20^\circ} \right) =$$

$$= \sin 20^\circ \left( \frac{1 - 1 - 2 \sin 70^\circ}{\cos 20^\circ} \right) = -2 \sin 20^\circ \left( \frac{\sin(90^\circ - 20^\circ)}{\cos 20^\circ} \right) =$$

$$= -2 \sin 20^\circ \cdot \left( \frac{\cos 20^\circ}{\cos 20^\circ} \right) = -2 \sin 20^\circ. \quad \text{Равенство верно.}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{1}{\sin 10^\circ} - 4 \sin 70^\circ &= \frac{1 - 4 \sin 10^\circ \sin 70^\circ}{\sin 10^\circ} = \frac{1 + 2(\cos 80^\circ - \cos 60^\circ)}{\sin 10^\circ} = \\ &= \frac{1 + 2 \cos 80^\circ - 2 \cdot \frac{1}{2}}{\sin 10^\circ} = 2 \frac{\cos(90^\circ - 10^\circ)}{\sin 10^\circ} = 2 \frac{\sin 10^\circ}{\sin 10^\circ} = 2. \end{aligned}$$

Равенство справедливо.

$$\begin{aligned} \text{r) } \cos 20^\circ + 2 \sin^2 55^\circ - \sqrt{2} \sin 65^\circ &= \cos 20^\circ + 1 - \cos 110^\circ - \\ &- 2 \sin 45^\circ \sin 65^\circ = \cos 20^\circ + 1 - \cos 110^\circ + \cos 110^\circ - \cos 20^\circ = 1. \end{aligned}$$

Равенство справедливо.

**57.** а) Вычтем из левой части правую.

$$\operatorname{tg}x + \operatorname{ctg}x - 2 = \operatorname{tg}x + \frac{1}{\operatorname{tg}x} - 2 = \frac{\operatorname{tg}^2 x + 1 - 2\operatorname{tg}x}{\operatorname{tg}x} = \frac{(\operatorname{tg}x - 1)^2}{\operatorname{tg}x} \geq 0,$$

так как  $(\operatorname{tg}x - 1)^2 \geq 0$ ;  $\operatorname{tg}x > 0$  при всех  $x \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Неравенство верно.

б) Преобразуем дробь в левой части неравенства, учитывая, что

$$\begin{aligned} \frac{5\pi}{12} - \frac{\alpha}{4} &= \frac{\pi}{2} - \left( \frac{\pi}{12} + \frac{\alpha}{4} \right) : \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\alpha}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\alpha}{4}\right)\right)} = \\ &= \frac{2\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)}{2\sin\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\alpha}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\alpha}{4}\right)} = \frac{2\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{4\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\alpha}{2}\right)} = \\ &= 4\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\alpha}{2}\right) = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\frac{\alpha}{2} - 4 \cdot \sin\frac{\alpha}{2} = \\ &= 2\sqrt{3} \cos\frac{\alpha}{2} - 2\sin\frac{\alpha}{2}. \text{ Теперь равенство принимает вид} \end{aligned}$$

$$2\sqrt{3} \cos\frac{\alpha}{2} - 2\sin\frac{\alpha}{2} + 2\sin\frac{\alpha}{2} \leq 2\sqrt{3} \quad \text{или} \quad 2\sqrt{3} \cos\frac{\alpha}{2} \leq 2\sqrt{3},$$

что верно при любых  $\alpha$ .

в) Рассмотрим левую часть неравенства и перемножим первую скобку на четвертую, а вторую на третью:

$$\begin{aligned} (1 + \sin\varphi + \cos\varphi)(\sin\varphi + \cos\varphi - 1)(1 + (\cos\varphi - \sin\varphi)) \times \\ \times (1 - (\cos\varphi - \sin\varphi)) &= ((\sin\varphi + \cos\varphi)^2 - 1)(1 - (\cos\varphi - \sin\varphi)^2) = \\ &= (\sin^2\varphi + \cos^2\varphi + 2\sin\varphi\cos\varphi - 1) \cdot (1 - \cos^2\varphi - \sin^2\varphi + 2\sin\varphi\cos\varphi) = \\ &= 2\sin\varphi\cos\varphi \cdot 2\sin\varphi\cos\varphi = \sin^2 2\varphi \leq 1. \end{aligned}$$

Неравенство верно при всех  $\varphi$ .

г) Преобразуем левую часть неравенства:

$$2\sin 4\alpha \sin 2\alpha + \cos 6\alpha = \cos 2\alpha - \cos 6\alpha + \cos 6\alpha = \cos 2\alpha \geq -1.$$

Неравенство верно при любых  $\alpha$ .

$$\begin{aligned} \text{58. а) } \cos^4 \alpha + \sin^4 \alpha, \text{ если } \sin 2\alpha = \frac{2}{3}. \cos^4 \alpha + \sin^4 \alpha &= \cos^4 \alpha + 2\sin^2 \alpha \times \\ \times \cos^2 \alpha + \sin^4 \alpha - 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha &= (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)^2 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha; \end{aligned}$$

если  $\sin 2\alpha = \frac{2}{3}$ , то  $1 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$ .

б)  $\frac{1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \sin \alpha}$ , если  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = m$ .

$$\begin{aligned} \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \sin \alpha} &= \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{(\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2})^2} = \\ &= \frac{\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\cos \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}; \end{aligned}$$

$$\text{если } \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = m, \text{ то } \frac{1 - \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - m}{1 + m}.$$

в) Поскольку  $\sin \alpha \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$ , то  $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{2}$ ,  $2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha - 2 = 0$ ,

откуда  $\cos \alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$ , но  $\frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4} < -1$ , значит  $\cos \alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$ .

г) Поскольку  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ , то  $-\sqrt{2} = \frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}{\sin \alpha}$ ,

$$-\sqrt{2} \sin \alpha - 1 = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}, \quad 1 + 2\sqrt{2} \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha,$$

$$3 \sin^2 \alpha + 2\sqrt{2} \sin \alpha = 0, \quad (3 \sin \alpha + 2\sqrt{2}) \cdot \sin \alpha = 0, \quad \text{но } \sin \alpha \neq 0,$$

так что  $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ . Тогда  $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{8}{9} = -\frac{7}{9}$ ;

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos \alpha) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 - \frac{8}{9}}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3},$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \text{и так как } \frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{2}, \quad \text{то } \cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

**59.** а)  $\lg \operatorname{tg} 1^\circ + \lg \operatorname{tg} 2^\circ + \dots + \lg \operatorname{tg} 89^\circ \operatorname{tg} 1^\circ = \operatorname{tg} 89^\circ$ ,  
поскольку  $\operatorname{tg} 1^\circ = \operatorname{tg}(90^\circ - 89^\circ) = \operatorname{ctg} 89^\circ$ ,  $\operatorname{tg} 2^\circ = \operatorname{ctg} 88^\circ$ .  
 $\lg \operatorname{tg} 1^\circ + \lg \operatorname{tg} 2^\circ + \dots + \lg \operatorname{tg} 89^\circ = \lg (\operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 2^\circ \dots \operatorname{tg} 89^\circ) =$   
 $= \lg (\operatorname{ctg} 89^\circ \cdot \operatorname{ctg} 88^\circ \cdot \dots \cdot \operatorname{tg} 45^\circ \cdot \dots \cdot \operatorname{tg} 88^\circ \cdot \operatorname{tg} 89^\circ) = \lg 1 = 0$ .  
б)  $\operatorname{lg} \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{lg} \operatorname{tg} 2^\circ \dots \operatorname{lg} \operatorname{tg} 89^\circ = \operatorname{lg} \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{lg} \operatorname{tg} 2^\circ \dots \operatorname{lg} \operatorname{tg} 45^\circ \dots \operatorname{lg} \operatorname{tg} 89^\circ = 0$ .

**60.** а)  $\lg \sin 32^\circ \cdot \lg \cos 7^\circ \cdot \lg \operatorname{tg} 40^\circ \cdot \lg \operatorname{ctg} 20^\circ$ .  
Все эти числа отрицательны;  $\operatorname{ctg} 20^\circ$  – больше 1, его логарифм по основанию 10 больше 0; следовательно, произведение трех отрицательных чисел и одного положительного числа число отрицательное, значит,  $\lg \sin 32^\circ \cdot \lg \cos 7^\circ \cdot \lg \operatorname{tg} 40^\circ \cdot \lg \operatorname{ctg} 20^\circ < 0$ .  
б)  $\operatorname{lg} \operatorname{tg} 2^\circ + \operatorname{lg} \operatorname{tg} 4^\circ + \lg \operatorname{ctg} 2^\circ + \lg \operatorname{ctg} 4^\circ = \lg (\operatorname{tg} 2^\circ \cdot \operatorname{tg} 4^\circ \cdot \operatorname{ctg} 2^\circ \cdot \operatorname{ctg} 4^\circ) = \lg 1 = 0$ .

**61.** Воспользуемся формулой  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}}$ . Тогда

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + \operatorname{tg}^2 \frac{y}{2} + \operatorname{tg}^2 \frac{z}{2} &= \frac{1-\cos x}{1+\cos x} + \frac{1-\cos y}{1+\cos y} + \frac{1-\cos z}{1+\cos z} = \frac{1-\frac{a}{b+c}}{1+\frac{a}{b+c}} + \\ &+ \frac{1-\frac{a}{b+c}}{1+\frac{a}{b+c}} + \frac{1-\frac{a}{b+c}}{1+\frac{a}{b+c}} = \frac{b+c-a}{a+b+c} + \frac{c+a-b}{a+b+c} + \frac{a+b-c}{a+b+c} = \\ &= \frac{b+c-a+c+a-b+a+b-c}{a+b+c} = \frac{a+b+c}{a+b+c} = 1. \end{aligned}$$

## 7. Преобразования выражений, содержащих степени и логарифмы

**62.** а)  $3^{400}$  и  $4^{300}$ ;  $3^{400} = (3^4)^{100} = 81^{100}$ ,  $4^{300} = (4^3)^{100} = 64^{100}$ ,  
поскольку  $81 > 64$ , то  $81^{100} > 64^{100}$ , а значит,  $3^{400} > 4^{300}$ ;

б)  $-\log_5 \frac{1}{5}$  и  $7^{\log_3 1}$ ;  $-\log_5 \frac{1}{5} = -\log_5 \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = \log_5 5 = 1$ ,

$$7^{\log_3 1} = 7^{\log_3 1} = 7^0 = 1, \text{ следовательно, } -\log_5 \frac{1}{5} = 7^{\log_3 1};$$

в)  $5^{200}$  и  $2^{500}$ ;  $5^{200} = 25^{100}$ ,  $2^{500} = 32^{100}$ , так как  
 $32 > 25$ , то  $25^{100} < 32^{100}$ , значит,  $5^{200} < 2^{500}$ ;

г)  $\log_4 \sqrt{2}$  и  $\log_3 \frac{1}{81}$ ;  $\log_4 \sqrt{2} = \log_2 (\sqrt{2})^{\frac{1}{2}} = \log_2 2^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}$ ,

$$\log_3 \frac{1}{81} = \log_3 (3)^{-4} = -4; \text{ значит, } \log_4 \sqrt{2} > \log_3 \frac{1}{81}.$$

**63.** а)  $\log_3 2 + \log_3 7 = \log_3 (2 \cdot 7) = \log_3 14$ ;  $\log_3 (2 + 7) = \log_3 9 = 2$ ;  
 $y = \log_3 t$  – возрастает, поскольку  $3 > 1$ , значит,  $\log_3 14 > \log_3 9$ ,  
поэтому,  $\log_3 2 + \log_3 7 > \log_3 (2 + 7)$ ;

б)  $\log_4 5 - \log_4 3 = \log_4 \frac{5}{3}$ ,  $\log_4 (5 - 3) = \log_4 2$ ;  $y = \log_4 t$  – возрастает,

так как  $4 > 1$ , значит,  $\log_4 2 > \log_4 \frac{5}{3}$ , значит,  $\log_4 5 - \log_4 3 < \log_4 (5 - 3)$ ;

в)  $3\log_7 2 = \log_7 8 > 0$ ,  $\log_7 (3 - 2) = \log_7 1 = 0$ , значит,  $3\log_7 2 > \log_7 (3 - 2)$ ;

г)  $\log_3 1,5 + \log_3 2 = \log_3 (1,5 \cdot 2) = \log_3 3 = 1$ ,  $\log_3 1,5^2 = \log_3 2,25$ , так  
как  $y = \log_3 t$  – возрастает и  $3 > 2,25$ , то  $\log_3 2,25 < \log_3 3$ , поэтому,  
 $\log_3 1,5 + \log_3 2 > \log_3 1,5^2$ .

**64.** а)  $81^{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_9 4} + 25^{\log_{125} 8} = 81^{\frac{1}{4}} : 81^{\log_9 \sqrt{4}} + 25^{\log_{125} 8} = \sqrt[4]{81} : (9^{\log_9 \sqrt{4}})^2 +$

$$+ (5^{\frac{1}{3} \log_5 8})^2 = 3 : 4 + (8^{\frac{1}{3}})^2 = \frac{3}{4} + \sqrt[3]{8^2} = \frac{3}{4} + 4 = 4\frac{3}{4};$$

б)  $2^{4\log_4 a} - 5^{2^{\frac{1}{2} \log_{\sqrt{5}} a}} - a^0 = 2^{2 \log_2 a} - 5^{\log_5 a} - 1 = 2^{\log_2 a^2} - 5^{\log_5 a} - 1 =$   
 $= a^2 - a - 1$ .

**65.** а)  $49^{1-\log_7 2} + 5 = \frac{49}{(7^{\log_7 2})^2} + 5 = \frac{49}{4} + 5 = 12\frac{1}{4} + 5 = 17,25$ ;

б)  $36^{2^{\frac{1}{2} \log_6 5}} + 2^{-\log_2 10} = \frac{\sqrt{36}}{(6^{\log_6 5})^2} + \frac{1}{2^{\log_2 10}} = \frac{6}{25} + \frac{1}{10} = \frac{24+10}{100} = 0,34$ .

**66.** а)  $\frac{\lg 8 + \lg 18}{2 \lg 2 + \lg 3} = \frac{\lg 144}{\lg 12} = \frac{\lg 12^2}{\lg 12} = \frac{2 \lg 12}{\lg 12} = 2$ ;

б)  $2\log_{0,3} 3 - 2\log_{0,3} 10 = \log_{0,3} 9 - \log_{0,3} 100 = \log_{0,3} \frac{9}{100} = \log_{0,3} (0,3)^2 = 2$ ;

в)  $\frac{3 \lg 2 + 3 \lg 5}{\lg 13 - \lg 130} = \frac{\lg 8 + \lg 125}{\lg 0,1} = \frac{\lg 1000}{\lg 0,1} = \frac{3}{-1} = -3$ ;

г)  $(2\log_{12} 2 + \log_{12} 3)(2\log_{12} 6 - \log_{12} 3) = \log_{12} 12 \cdot \log_{12} 12 = 1$ .

**67.** а)  $25b^3 \sqrt[4]{c^7}$  при  $a = 5$ ;

$$\log_5 25 + \log_5 b^3 + \log_5 \sqrt[4]{c^7} = 2 + 3 \log_5 b + \frac{7}{4} \log_5 c;$$

б)  $\frac{0,0016b^4}{c^7 \sqrt{c^2}}$  при  $a = 0,2$ ,  $b > 0$ ,  $c > 0$ ;

$$\log_{0,2}0,0016 + 4 \log_{0,2}b - \log_{0,2}c^{\frac{1}{7}} = 4 + 4 \log_{0,2}b - 1 \frac{2}{7} \log_{0,2}c.$$

68. a)  $\log_4 x = 2\log_4 10 + \frac{3}{4} \log_4 81 - \frac{2}{3} \log_4 125;$

$$x = \frac{10^2 \cdot \sqrt[4]{81^3}}{\sqrt[3]{125^2}} = \frac{100 \cdot 27}{25} = 108;$$

6)  $\log_{\frac{1}{3}} x = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}} 16 - \log_{\frac{1}{3}} 8 + \log_{\frac{1}{3}} 28; \quad x = \frac{\sqrt{16} \cdot 28}{8} = 4.$

69. a)  $\frac{7,832 \cdot \sqrt[4]{12,98}}{5,256^2} \approx \frac{7,832 \cdot 1,8981}{27,6256} \approx 0,5381;$

6)  $\frac{102,3^2}{\sqrt[3]{92,14 \cdot 6,341}} \approx \frac{10465,3}{4,5101 \cdot 6,341} \approx 365,94.$

70.  $\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_{10} 9 =$   
 $= \frac{\lg 2}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 3}{\lg 4} \cdot \frac{\lg 4}{\lg 5} \cdot \frac{\lg 5}{\lg 6} \cdot \frac{\lg 6}{\lg 7} \cdot \frac{\lg 7}{\lg 8} \cdot \frac{\lg 8}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 9}{\lg 10} = \frac{\lg 2}{\lg 10} = \lg 2 \approx 0,3010.$

71. Поскольку  $\sqrt{3}-1 = \frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} = \frac{3-1}{\sqrt{3}+1} = \frac{2}{\sqrt{3}+1},$

$$\sqrt{6}+2 = \frac{(\sqrt{6}+2)(\sqrt{6}-2)}{\sqrt{6}-2} = \frac{6-4}{\sqrt{6}-2} = \frac{2}{\sqrt{6}-2}, \text{ то}$$

$$\log_2(\sqrt{3}-1) + \log_2(\sqrt{6}+2) = \log_2 \frac{2}{\sqrt{3}+1} + \log_2 \frac{2}{\sqrt{6}-2} = \\ = \log_2 2 - \log_2(\sqrt{3}+1) + \log_2 2 - \log_2(\sqrt{6}-2) = 2 - A.$$

### § 3. Функции


#### 8. Рациональные функции

72. a) Пусть  $AB=CB=DC=x,$

тогда  $CF=BE=\frac{x}{2}, AE=DF=\frac{x\sqrt{3}}{2}.$

$$S = \frac{BC+AD}{2} \cdot BE;$$

$$S(x) = \frac{x+x+\frac{x\sqrt{3}}{2} \cdot 2}{2} \cdot \frac{x}{2} = \frac{(2x+x\sqrt{3})}{4}.$$



6) Пусть  $BE = x$ , тогда  $AB = BC = CD = 2x = EF$ ,  $AE = x\sqrt{3}$ .

Периметр трапеции равен:

$$P(t) = 2x + 2x + 2x + 2x + 2\sqrt{3}x = 2x(4 + \sqrt{3}).$$


73.

a) Пусть  $AB = x$ , тогда  $BC = AC = AA_1 = x$ ,

$$AD = \frac{x\sqrt{3}}{2}. \text{ Объем призмы равен:}$$

$$V = S_{ABC} \cdot AA_1; S_{ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AD.$$

$$V(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2} \cdot x = \frac{x^3\sqrt{3}}{4}.$$



б) Если объем призмы  $v$ , то сторона основания  $AB = \sqrt[3]{\frac{4v}{\sqrt{3}}}$

$$S_{\text{бок}} = P_{ABC} \cdot AA_1; P_{ABC} = 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{4v}{\sqrt{3}}}, AA_1 = AB = \sqrt[3]{\frac{4v}{\sqrt{3}}};$$

$$S_{\text{бок}}(v) = 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{4v}{\sqrt{3}}} \cdot \sqrt[3]{\frac{4v}{\sqrt{3}}} = 3 \sqrt[3]{\frac{16v^2}{3}}. \text{ Ответ: } S(v) = 3 \sqrt[3]{\frac{16v^2}{3}}.$$

74. 1)  $x = A \sin \omega t + x_0$ ; 2)  $v = x'(t) = A\omega \cos \omega t$ .

75.

а) I – в В в 6 ч 30 мин, II – в А в 7 часов;


б) I турист –  $4 \text{ ч} + 1,5 = 5,5 \text{ ч}$ , II турист –  $2,5 + 2 = 4,5 \text{ ч}$ ;

в) I турист – 4 ч, II турист – в 2 ч 30 мин;

г) I турист – 1 час, II турист – 2,5 часа;

д) I турист до остановки двигался со скоростью  $v = \frac{20}{4} = 5 \text{ (км/ч)}$ ,

после остановки  $v = \frac{20}{1,5} = 13 \frac{1}{3} \text{ (км/ч)}$ ;



II турист до остановки  $v = \frac{20}{2,5} = 8$  (км/ч), после остановки


$$v = \frac{20}{2} = 10 \text{ (км/ч);}$$

e) Средняя скорость движения первого туриста  $v = \frac{40}{5,5} = 7\frac{3}{11}$  (км/ч),

$$\text{второго туриста } v = \frac{40}{4} = 8\frac{8}{9} \text{ (км/ч).}$$

**76.**

a) 1)  $(-\infty; -3] \cup [-2; 1,5)$



2)  $[-3; -2] \cup (1,5; \infty)$ ;


3)  $x_{\max} = -3, y(-3) = 2,5, x_{\min} = -2, y(-2) = 0,5$ ;

4)  $y_{\max} = 3,5$  при  $x = 1,5, y_{\min} = 0,5$  при  $x = -2$ ;

5) в точке  $x = 1,5, y(1,5) = 3,5$ ; 6) на  $(-\infty; 1,5)$  и на  $(1,5; \infty)$ ;

7) ни четная, ни нечетная.

б) 1) функция возрастает в каждой точке непрерывности;




2) нет; 3) нет; 4)  $y_{\max} -$  нет,  $y_{\min} = 0$ , при  $x = -2, 0, 2, 6$ ;

5) в точках  $-2; 0; 2; 4; 6; 8$ ; значения функции в них равны 0;

6) на  $(-4; -2), (-2; 0), (2; 4), (4; 6), (6; 8)$ ;

7) ни четная, ни нечетная.

в) 1) возрастает на  $(-\infty; -3] \cup [-1; 0) \cup (0; 1] \cup [3; \infty)$ ;




2) убывает на  $[-3; -1] \cup (1; 3]$ ;

3)  $x_{\max} = -3, y(-3) = -1,5, x_{\max} = 1, y(1) = 2$ ,

$x_{\min} = -1, y(-1) = -2, x_{\min} = 3, y(3) = 1,5$ ;

4)  $y_{\max} = 2$  при  $x = 1, y_{\min} = -2$  при  $x = -1$ ;

- 5) в точке  $x = 0$ , значения функции нет в этой точке;  
 6) непрерывна на  $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ; 7) нечетная.  
 г) 1) возрастает на  $(-\infty; -2,5] \cup (0; 2,5]$ ;



- 2) убывает на  $[-2,5; 0) \cup [2,5; \infty)$ ;  
 3)  $x_{\max} = -2,5$ ,  $y(-2,5) = 2,5$ ,  $x_{\max} = 2,5$ ,  $y(2,5) = 2,5$ ,  
 $x_{\min} = 0$ ,  $y(0) = 0,5$ ;  
 4)  $y_{\max} = 2$  при  $x = -2$  и  $x = 2$ ,  $y_{\min} = 0,5$  при  $x = 0$ ;  
 6) непрерывна при всех  $x$ ; 7) четная.

77. а)  $D(y) : x^2 + 2x - 8 \neq 0$ ,  $x \neq -4$ ,  $x \neq 2$ ,

$D(y) : x \in (-\infty; -4) \cup (-4, 2) \cup (2; +\infty)$ ;

б)  $x^4 - 1 \neq 0$ ,  $(x^2 - 1)(x^2 + 1) \neq 0$ ,  $x \neq 1$ ,  $x \neq -1$ ,

$D(y) : x \in (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; \infty)$ ;

в)  $x^4 - 9x^2 + 20 \neq 0$ ,  $x \neq \sqrt{5}$ ,  $x \neq -\sqrt{5}$ ,  $x \neq 2$ ,  $x \neq -2$ ,

$D(y) : x \in (-\infty; -\sqrt{5}) \cup (-\sqrt{5}; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; \sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$ ;

г)  $3x^2 - 5x + 4 \neq 0$ ,  $D < 0$ ,  $D(y) : x \in (-\infty; \infty)$ .

78. а)  $x^3 - x \neq 0$ ,  $x(x^2 - 1) \neq 0$ ,  $x \neq 0$ ,  $x \neq 1$ ,  $x \neq -1$ ; промежутки непрерывности  $(-\infty; -1) \cup (-1; 0) \cup (0; 1) \cup (1; \infty)$ ;

б)  $x - 1 \neq 0$ ,  $x \neq 1$ ; непрерывность на  $(-\infty; 1) \cup (1; \infty)$ ;

в)  $x \neq 0$ . Функция непрерывна на  $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ;

г)  $3x^3 - 2x^2 + 5 = 0$ ,  $(x + 1)(3x^2 - 5x + 5) = 0$ ,

$x = -1$ ,  $3x^2 - 5x + 5 \neq 0$  — т.к.  $D < 0$ , то функция непрерывна на  $(-\infty; -1) \cup (-1; \infty)$ .

79.

а)  $y(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -y(x)$  — нечетность доказана;


б)  $y(-x) = \frac{5(-x)^3}{1 - (-x)^2} = \frac{-5x^3}{1 - x^2} = -\frac{-5x^3}{1 - x^2} = -y(x)$  — нечетная;

в)  $y(-x) = (-x)^4 ((-x)^2 + 2) = x^4 (x^2 + 2) = y(x)$  — четная;

г)  $y(-x) = \frac{|-x| + 2}{(-x)^2} = \frac{|x| + 2}{(-x)^2} = y(x)$  — четная.

80.

а)  $\frac{x-1}{3x} > 0$ ,  $(x-1)3x > 0$ ,



$$y(3) > 0, \quad y\left(\frac{1}{2}\right) < 0, \quad y(-2) > 0; \quad y > 0 \quad \text{при } x \in (-\infty; 0) \cup (1; \infty),$$


$y < 0$  при  $x \in (0; 1)$ ;

б)  $\frac{x^2 - 4x - 5}{9-x^2} > 0, \quad \frac{(x-5)(x+1)}{(3-x)(3+x)} > 0, \quad y(8) < 0, y(4) > 0, y(-4) < 0,$

$y(0) < 0, y(-2) > 0;$

$y > 0$  при  $x \in (-3; -1) \cup (3; 5)$ ,

$y < 0$  при  $x \in (-\infty; -3) \cup (-1; 3) \cup (5; \infty)$ ;




в)  $1 - \frac{2x-3}{5-x} > 0,$

$$\frac{5-x-2x+3}{5-x} > 0,$$

$$\frac{8-3x}{5-x} > 0, \quad y(9) > 0, y(4) < 0, y(0) > 0; y > 0 \quad \text{при}$$


$$x \in (-\infty; 2\frac{2}{3}) \cup (5; \infty), \quad y < 0 \quad \text{при } x \in (2\frac{2}{3}; 5);$$



г)  $y = 2x^2 - 5x + 2, \quad 2x^2 - 5x + 2 > 0,$

$$2(x - \frac{1}{2})(x - 2) > 0, \quad y > 0 \quad \text{при}$$

$$x \in (-\infty; \frac{1}{2}) \cup (2; \infty), \quad y < 0 \quad \text{при } x \in (\frac{1}{2}; 2).$$




### 81.

а)  $y = 4x^2 + 3x - 1$ . Производная функции:  $y' = 8x + 3$ . Критическая

точка:  $8x + 3 = 0, \quad 8x = -3, \quad x = -\frac{3}{8},$

$$y'(0) > 0, \quad y'(-1) < 0,$$



значит,  $x = -\frac{3}{8}$  – точка минимума; функция возрастает на


$$[-\frac{3}{8}; \infty), \quad \text{убывает на } (-\infty; -\frac{3}{8}].$$

б)  $y = 1 - \frac{2}{x}$ . Производная функции:  $y' = \frac{2}{x^2}$ .

Критическая точка  $x = 0$ .


$$y'(2) > 0, \quad y'(-3) > 0;$$

функция возрастает на  $D(y)$ .



в)  $y = (x - 1)^4 - 2$ . Производная:  $y' = 4(x - 1)^3$ .

Критическая точка  $x = 1$ .



$$y'(3) > 0, y'(0) < 0;$$

$x = 1$  – точка минимума;

функция возрастает на  $[1; \infty)$ , убывает на  $(-\infty; 1]$ .

г)  $y = \frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$

Производная:

$$\frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}.$$

Критическая точка  $x = 1$ .  $y'(3) < 0, y'(0) < 0$ ;

Функция убывает на  $D(y)$ .

82.

а)  $y = 3x - 5$ ;

$D(x) : x \in (-\infty; \infty)$ ;  $E(y) : y \in (-\infty; \infty)$ ;

нули:  $3x - 5 = 0, x = 1 \frac{2}{3}$ ;

промежутки

знакопостоянства:

$$y > 0 \text{ при } x \in (1 \frac{2}{3}; \infty), y < 0 \text{ при } x \in (-\infty; 1 \frac{2}{3});$$

экстремумов нет,  $y' = 3 = \text{const}$ , функция возрастает на  $D$ .

б)  $y = 2x^2 - 7x + 3$ ;  $D(x) : x \in (-\infty; \infty)$ ;




$$x_0 = \frac{-8}{2a} = -\frac{7}{4}, y_0 = -3 \frac{1}{8},$$

$$E(y) : y \in (-3 \frac{1}{8}; \infty);$$

нули:  $2x^2 - 7x + 3 = 0, x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 3$ ;

промежутки

знакопостоянства:




$$y > 0 \text{ при } x \in (-\infty; \frac{1}{2}) \cup (3; \infty), \quad y < 0 \text{ при } x \in (\frac{1}{2}; 3);$$

$y' = 4x - 7$ ,  $4x - 7 = 0$ ,  $x = 1\frac{3}{4}$  – точка минимума,

$$y = (1\frac{3}{4}) = -3\frac{1}{8};$$

$$y'(2) > 0, y'(0) < 0,$$

возрастает на  $[1\frac{3}{4}; \infty)$ ,



убывает на  $(-\infty; 1\frac{3}{4}]$ .


в)  $y = 2 - \frac{1}{4}x$ ;  $D(x) : x \in (-\infty; \infty)$ ,  $E(y) : y \in (-\infty; \infty)$ ;

нули:  $2 - \frac{1}{4}x = 0$ ,

$$x = 8;$$

промежутки

знакопостоянства:



$y > 0$  при  $x < 8$ ,  $y < 0$  при  $x > 8$ ;  $y' = -\frac{1}{4}$  – функция убывает на  $D(y)$ ;

г)  $y = 12 - 4x - x^2$ ;

$$D(x) : x \in (-\infty; \infty); x_0 = -2; y_0 = 16;$$


$$E(y) : y \in (-\infty; 16];$$

нули:  $12 - 4x - x^2 = 0$ ,

$$x_1^2 + 4x - 12 = 0, x_1 = -6,$$

$$x_2 = 2, y > 0 \text{ при } x \in (-6; 2),$$


$y < 0$  при  $x \in (-\infty; -6) \cup (2; \infty)$ ;



$$y' = -4 - 2x, -4 - 2x = 0,$$

$$x = -2, y'(-2) < 0, y'(-6) > 0, x = -2 \text{ – точка максимума},$$

$y(-2) = 16$ ; возрастает на  $(-\infty; -2]$ , убывает на  $[-2; \infty)$ .




83. а)  $y = 2 - \frac{3}{x+1}$ ,

$$D(x) : x \in (-\infty; -1) \cup (-1; \infty);$$


$$E(y) : y \in (-\infty; 2) \cup (2; \infty);$$

нули:  $2 - \frac{3}{x+1} = 0, \frac{2x+2-3}{x+1} = 0$ ,

$$2x - 1 = 0, x = \frac{1}{2};$$



промежутки знакопостоянства:



$$\frac{2x-1}{x+1} > 0, \quad (2x-1)(x+1) > 0, \quad y(2) > 0,$$

$$y(0) < 0,$$

$$y(-2) > 0, \quad y > 0 \text{ при } x \in (-\infty; -1) \cup (\frac{1}{2}; \infty), \quad y < 0 \text{ при } x \in (-1; \frac{1}{2});$$

$$y' = \frac{3}{(x+1)^2},$$

$$y'(-2) > 0, \quad y'(0) > 0, \\ \text{критическая точка}$$

$x = -1$ ; экстремумов нет; функция возрастает на  $(-\infty; -1) \cup (-1; \infty)$ .


6)  $y = (x-2)^3 - 1; D(x): x \in (-\infty; \infty); E(y): y \in (-\infty; \infty);$  нули:

$$(x-2)^3 - 1 = 0, \quad (x-2-1)(x^2 - 4x + 4 + x - 2 + 1) = 0,$$

$$(x-3)(x^2 - 3x + 3) = 0, \quad x = 3 \text{ или } x^2 - 3x + 3 = 0 - \text{ уравнение решений не имеет;}$$

промежутки

знакопостоянства:




$$y(4) > 0, \quad y(2) < 0, \quad y > 0$$

при  $x \in (3; \infty)$ ,  $y < 0$

при  $x \in (-\infty; 3)$ ;

$$y' = 3(x-2)^2,$$

$$3(x-2)^2 = 0, \quad x = 2,$$



$$y'(4) > 0, \quad y'(0) > 0,$$

экстремумов нет;

Функция возрастает на  $D(y)$ .

в)  $y = \frac{x^4 + 1}{x^4} = 1 + \frac{1}{x^4};$


$$D(y): x \in (-\infty; 0) \cup (0; \infty);$$

$E(y): y \in (1; \infty)$ ; нулей нет;



$y > 0$  при всех  $x \in D(x)$ ;

$x = 0$  – критическая точка;


$$y'(1) < 0, \quad y'(-1) > 0,$$



$x = -1$ ; экстремумов нет; функция возрастает на  $(-\infty; -1) \cup (-1; \infty)$ .



возрастает на  $(-\infty; 0)$ ,  
убывает на  $(0; \infty)$ .





г)  $y = 4 - (x + 2)^4$ ;  
 $D(x): x \in (-\infty; \infty)$ ;

$E(y): y \in (-\infty; 4]$ ;

нули:  $4 - (x + 2)^4 = 0$ ,  
 $(x + 2)^4 = 4$ ,  $x_1 + 2 = \sqrt{2}$ ,  
 $x_1 = \sqrt{2} - 2$ ,  
 $x_2 = -\sqrt{2} - 2$ ;

промежутки знакопостоянства:



$y(-2) > 0$ ,  $y(3) < 0$ ,

$y(-10) < 0$ ;

$y' = -4(x + 2)^3$ ,


$-4(x + 2)^3 = 0$ ,

$(x + 2)^3 = 0$ ,  $x = -2$ ,


$y'(0) < 0$ ,  $y'(-3) > 0$ ,  $x = -2$  – точка максимума,  $y(-2) = 4$ ;  
возрастает на  $(-\infty; -2)$ , убывает на  $(-2; \infty)$ .

84.


а)




б)



б)



г)



85.





- a) При  $x \geq 0$   $y = 3x + x$ ,  
 $y = 4x$ , при  $x < 0$  имеем  
 $y = 2x$ ;

б)  $-x^2 - x + 2 = 0$ ,  
 $x^2 - x + 2 = 0$ ,  
 $x_1 = -2$ ,  $x_2 = 1$ ,

при  $x \in [-2; 1]$   
 $y = -x^2 - x + 2$ ,  
при  $x \in (-\infty; -2) \cup (1; \infty)$   
 $y = x^2 + x - 2$ ;

в) при  $x > 3$  имеем  
 $y = 2x - x + 3$ ,  
 $y = x + 3$ ,  
при  $x < 3$  имеем  
 $y = 2x - (-x + 3)$ ,  
 $y = 3x - 3$ ;


г) при  $x > 0$  имеем  
 $y = x^2 - 4x + 3$ ,  
при  $x < 0$  имеем  
 $y = x^2 + 4x + 3$ .




86.

a) При  $x > 0$  имеем  $y = \frac{x+1}{x}$ ,

при  $x < 0$  имеем  $y = -1 - \frac{1}{x}$ ;



б)  $y = \frac{1}{x^2} + 2$ ;




в) При  $x > 0$  имеем


$$y = \frac{x-2}{x}, \quad y = 1 - \frac{2}{x},$$

при  $x < 0$  имеем

$$y = \frac{-x-2}{x}, \quad y = -1 - \frac{2}{x};$$



г)  $y = \frac{2x^3 - 1}{x^3}$ ,



87. а)  $x^2 = x + 6$ ,  $x^2 - x - 6 = 0$ ,  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = -2$ . Ответ: да.

б)  $\frac{3}{x} = 4(x+1)$ ,  $x \neq 0$ ,  $3 = 4(x+1) \cdot x$ ,  $3 = 4x^2 + 4x$ ,

$$4x^2 + 4x - 3 = 0, \quad D = 16 + 48 = 64, \quad x_1 = \frac{-4 - 8}{8} = -1\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{1}{2}.$$

Ответ: да.

в)  $x^4 = 2x^2 + 1$ ,  $x^4 - 2x^2 - 1 = 0$ .

$D = 4 + 4 = 8$ ,  $x^2 = 1 + \sqrt{2}$ ,  $x^2 = 1 - \sqrt{2}$  – корни есть,  
 $x^2 = 1 - \sqrt{2}$  – корней нет. Ответ: да.

г)  $\frac{1}{x^2} = x^2 - 2$ ,  $x \neq 0$ ,  $1 = x^4 - 2x^2$ ,  $x^4 - 2x^2 - 1 = 0$ . Пусть  $x^2 = y$ ,

$D = 4 + 4 = 8$ ,  $x^2 = 1 + \sqrt{2}$ ,  $x^2 = 1 - \sqrt{2}$ ,  
 $x^2 = 1 + \sqrt{2}$  – корни есть,  $x^2 = 1 - \sqrt{2}$  – корней нет. Ответ: да.

88. а) Функция  $y = x^3 - 6x + 2$  определена на  $[0; 1]$ .  $y(0) = 0 - 0 + 2 > 0$ ,  
 $y(1) = 1 - 6 + 2 = -3 < 0$ . Уравнение имеет корень на данном промежутке, т.к. функция непрерывна и она принимает значение 0.

б)  $y(1) = 1 - 3 + \frac{2}{9} = -1\frac{7}{9} < 0$ ,  $y(2) = 16 - 12 + \frac{2}{9} = 4\frac{2}{9} > 0$ , уравнение имеет  
корень на  $[1; 2]$ .


в)  $y(1) = 1 + 3 - 5 = -1 < 0$  для  $y(x) = x^5 + 3x - 5$  – непрерывной на  $I$ ;

$y(2) = 32 + 6 - 5 = 33 > 0$ , уравнение имеет корень на  $[1; 2]$ .

г)  $y = 4 + 2x^3 - x^5$  – непрерывна на  $I$ ;  $y(-1) = 4 - 2 + 1 = 3 > 0$ ,  
 $y(2) = 4 + 16 - 32 < 0$ , уравнение имеет корень на  $[-1; 2]$ .


89.

а)  $y_1 = 4 - 3x$  и  $y_2 = x + 2$ .




Ответ:  $x \in [0,5; \infty)$ .

б)  $y_1 = x^2 - 2x$  и  $y_2 = -x$ .




Ответ:  $0; 1$ .

в)  $y_1 = \frac{1}{x}$  и  $y_2 = 4x$ .



Ответ:  $-0,5; 0,5$ .


г)  $y_1 = x^2 + 2x + 2$  и  $y_2 = x + 1$ .



Ответ:  $x \in (-\infty; \infty)$ .


**90.**

a)  $y_1 = x^3$  и  $y_2 = \frac{8}{x-1}$ .




Ответ: 2 и приблизительно -1,5.

b)  $y_1 = x^3$  и  $y_2 = \frac{1}{x}$ .




Ответ: -1; 1.

б)  $y_1 = |1-x|$  и  $y_2 = 2-|x|$



Ответ: -0,5; 1,5.

г)  $y_1 = |x-1|$  и  $y_2 = 3-|x|$



Ответ: -1; 2.

**91.**


Из условия найдем  $a$  и  $b$ .

$$\begin{cases} 1 = 2a + b, \\ 10 = 5a + b, \end{cases} \quad 3a = 9, \quad a = 3, \quad b = -5$$


Ответ:  $a = 3, \quad b = -5$ .

**92.**


a)




б)




в)




г)



д)



е)



a)  $a > 0$ , так как ветви параболы направлены вверх;

$b > 0$ , так как абсцисса вершины параболы,  $x_0 = -\frac{b}{2a} < 0$ ;

$c < 0$ , так как ордината точки пересечения графика с осью  $Oy$  отрицательна;

$D > 0$ , так как парабола пересекает ось  $Ox$  в двух точках;

б) аналогично а) имеем:  $a < 0, b < 0, c < 0, D = 0$ ;

в)  $a > 0, b < 0, c > 0, D < 0$ ; г)  $a < 0, b < 0, c = 0, D > 0$ ;

д)  $a < 0, b < 0, c < 0, D < 0$ ; е)  $a > 0, b > 0, c > 0, D = 0$ ;

**93. а)** может, например:  $y = x^2$ ,  $y = c$ ;

**б)** может линейная функция, например  $y = ax$ ; в) не может.

**94. а)**  $y = \frac{1}{|x|} + \frac{x}{|x|}$ ; б)  $y = (3) + (x^3 - x|x|)$ ;


в)  $y = \frac{x^2}{x^4 - 1} + \frac{x^3 - x}{x^4 - 1}$ ; г)  $y = (x^4 + 8) + (2x^5 - 3x)$ .

95. а)  $y(-x) = 5 \cdot (-x)^6 - 2(-x)^2 - 3 = 5x^6 - 2x^2 - 3 = y(x)$  – четная;  
 б)  $y(-x) = 4(-x)^5 - 2(-x)^3 + (-x) = -4x^5 + 2x^3 - x = -y(x)$  – нечетная;  
 в)  $y(-x) = \frac{3}{(-x)^2 + 1} = \frac{3}{x^2 + 1} = y(x)$  – четная;  
 г)  $y(-x) = -\frac{2}{(-x)^3} = \frac{2}{x^3} = -y(x)$  – нечетная.

## 9. Тригонометрические функции

96. а)  $\cos^2 x \neq 0, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z;$   
 б)  $1 + 2 \sin 2x \neq 0, \sin 2x \neq -\frac{1}{2}, 2x \neq (-1)^k \left( -\frac{\pi}{6} \right) + \pi k, k \in Z,$   
 $x \neq (-1)^{k+1} \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z;$   
 в)  $\sqrt{3} \cos x - \frac{3}{2} \neq 0, \sqrt{3} \cos x \neq \frac{3}{2}, \cos x \neq \frac{3}{2\sqrt{3}}, \cos x \neq \frac{\sqrt{3}}{2}, x \neq \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z;$   
 г)  $\sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} \neq 0, \sin \frac{x}{2} \neq 0 \text{ или } \cos \frac{x}{2} \neq 0,$   
 $\frac{x}{2} \neq \frac{\pi k}{2} + \pi n, k \in Z, x = \pi k, k \in Z.$

97. а)  $\sin x \cdot \cos x \geq 0, \begin{cases} \sin x \geq 0 \\ \cos x \geq 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} \sin x \leq 0 \\ \cos x \leq 0 \end{cases}$



Ответ:  $x \in [\pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n], n \in Z.$

б)  $\begin{cases} x \geq 0, \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n. \end{cases} n - \text{целые положительные числа.}$


в)  $\sin^2 x - \cos^2 x \geq 0, \cos 2x \leq 0, \frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq 2x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi n,$

$$n \in Z, \quad \frac{\pi}{4} + \pi n \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + \pi n, \quad n \in Z.$$

Ответ:  $x \in [\frac{\pi}{4} + \pi n; \frac{3\pi}{4} + \pi n], \quad n \in Z$ .

г)  $\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \cos x \geq 0. \end{cases}$

Ответ:  $x \in [2\pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n], \quad n \in Z$ .



- 98.** а)  $E(y) : y \in [-2; 4];$       б)  $E(y) : y \in (-2; 2);$   
 в)  $E(y) : y \in [-1; 5];$       г)  $E(y) : y \in [-1; 1].$

**99. а)**  $E(y) : y \in [\frac{1}{2}; +\infty);$

б)  $y = \sqrt{1 - \cos 4x}, -1 \leq \cos 4x \leq 0, 0 < y \leq \sqrt{2}, \quad E(y) : y \in [0; \sqrt{2}];$

в)  $y = \frac{3}{\cos x - 1} = \frac{-3}{1 - \cos x} = -\frac{3}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}, \quad E(y) : y \in [-\infty; -\frac{3}{2}];$

г)  $y = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = \operatorname{tg} x + \frac{1}{\operatorname{tg} x}, \quad \left| a + \frac{1}{a} \right| \geq 2, \quad E(y) : y \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty).$

**100. а)**  $y > 0 \text{ при } -\frac{\pi}{2} + 2\pi n < x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z,$

$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n < x < \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in Z;$

$y < 0 \text{ при } \frac{\pi}{2} + 2\pi n < x + \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z,$

$\frac{\pi}{4} + 2\pi n < x < \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in Z.$

Ответ:  $y > 0 \text{ при } x \in (-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n), \quad n \in Z;$

$y < 0 \text{ при } x \in (\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{5\pi}{4} + 2\pi n), \quad n \in Z.$

б)  $y < 0, \text{ если } 1 - \operatorname{tg} 3x < 0, \quad \operatorname{tg} 3x > 1 \text{ при } \frac{\pi}{4} + \pi n < 3x < \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z,$

$\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{3} < x < \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, \quad n \in Z; \quad y > 0, \text{ если } 1 - \operatorname{tg} 3x > 0,$

$$\operatorname{tg} 3x < 1 \text{ при } \frac{\pi}{2} + \pi n < 3x < \frac{5\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3} < x < \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:  $y < 0$  при  $x \in \left( \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{3}; \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3} \right), \quad n \in \mathbb{Z};$

$$y > 0 \text{ при } x \in \left( \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}; \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi n}{3} \right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

в)  $y > 0$ , если  $\sin \frac{x}{2} < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,

$$\frac{x}{2} \in \left( -\frac{5\pi}{4} + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n \right), \quad x \in \left( -\frac{5\pi}{2} + 4\pi n; \frac{\pi}{2} + 4\pi n \right);$$

$$y < 0, \text{ если } \sin \frac{x}{2} > \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x \in \left( \frac{\pi}{2} + 4\pi k; \frac{3\pi}{2} + 4\pi k \right), \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

г)  $y > 0$ , если  $1 + 2 \cos 2x > 0, \quad 2 \cos 2x > -1, \quad \cos 2x > -\frac{1}{2},$

$$-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n < 2x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{\pi}{3} + \pi n < x < \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$y < 0$ , если  $1 + 2 \cos 2x < 0, \quad 2 \cos 2x < -1, \quad \cos 2x < -\frac{1}{2},$

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi n < 2x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \frac{\pi}{3} + \pi n < x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:  $y > 0$  при  $x \in (-\frac{\pi}{3} + \pi n; \frac{\pi}{3} + \pi n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad y < 0$

при  $x \in (\frac{\pi}{3} + \pi n; \frac{2\pi}{3} + \pi n), \quad n \in \mathbb{Z}.$

**101.** а)  $y(-x) = \operatorname{tg}(-3x) - \operatorname{ctg}(-\frac{x}{2}) = -\operatorname{tg}3x + \operatorname{ctg}\frac{x}{2} = -y(x)$  – нечетная;

б)  $y(-x) = \frac{\sin(-x) \cdot \cos^2(-x)}{(-x)} = \frac{-\sin x \cdot \cos^2 x}{-x} = y(x)$  – четная;

в)  $y(-x) = \sin\left(\frac{(-x)^3 - (-x)}{(-x)^2 - 1}\right) = \sin\left(\frac{-x^3 + x}{x^2 - 1}\right) = \sin\left(-\frac{x^3 - x}{x^2 - 1}\right) =$

$$= -\sin \frac{x^3 - x}{x^2 - 1} = -y(x)$$
 – нечетная;

г)  $y(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} - \cos(-x) = \frac{-\sin x}{-x} - \cos x = \frac{\sin x}{x} - \cos x = y(x)$  – четная.

**102.** а) Периодическая с периодом  $T = \frac{2\pi}{5}$ ; б) непериодическая;

в) периодическая, период  $T = 2\pi$ ;


г)  $y = \sin^2 x + 2 \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x = 1 + \sin 2x$ , периодическая,  $T = \pi$ .

**103.**

а) Производная функции:  $\cos(x - \frac{\pi}{6}) = y'$

$$\cos(x - \frac{\pi}{6}) = 0, \quad x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$x = \frac{2\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$



$y' > 0$  на  $(-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , значит,

на этом промежутке функция возрастает;

$y' < 0$  на  $(\frac{2\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , значит, функция на этом промежутке убывает. В  $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , производная меняет знак с

«+» на «-», это точка максимума; в  $x = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , производная меняет знак с «-» на «+», значит, это точка минимума.

Ответ: возрастает на  $[-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

убывает на  $[\frac{2\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

$$x_{\max} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad x_{\min} = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б)  $y' = \frac{-2(\sin x)}{(1 - \cos x)^2} = \frac{-\cos \frac{x}{2}}{2 \sin^3 \frac{x}{2}}, \quad y' = 0.$

$$\cos \frac{x}{2} = 0, \quad x = \pi + 2\pi n, \quad x \neq 2\pi k, \quad k, n \in \mathbb{Z};$$

$$y' > 0 \quad x \in (\pi + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

$y' < 0 \quad x \in (2\pi n; \pi + 2\pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ . Таким образом,

функция возрастает при  $x \in [\pi + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n]$ , функция убывает при  $x \in [2\pi n; \pi + 2\pi n]$ , следовательно, в точке  $x = \pi + 2\pi n$  производная меняет знак с «-» на «+», значит, это точка минимума, а точки максимума нет, т.к.  $x \neq 2\pi k$ .

$$\text{в) } y' = 0,5(-\sin(\frac{\pi}{3} - 2x)) \cdot (-2) = \sin(\frac{\pi}{3} - 2x) = -\sin(2x - \frac{\pi}{3}),$$

$$-\sin(2x - \frac{\pi}{3}) = 0,$$

$$2x - \frac{\pi}{3} = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$2x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad y'(x) > 0 \text{ при}$$

$$(\frac{2\pi}{3} + \pi n; \frac{7\pi}{6} + \pi n), \quad n \in \mathbb{Z}, \text{ значит, при } x \in [\frac{2\pi}{3} + \pi n; \frac{7\pi}{6} + \pi n]$$

функция возрастает,  $y' < 0$  на  $(\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{2\pi}{3} + \pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , значит,

при  $x \in [\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{2\pi}{3} + \pi n]$  функция убывает;

$$x_{\max} = \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad x_{\min} = \frac{5\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{г) } y' = \frac{1}{2\sqrt{1-\sin^2 x}} (-2 \sin x \cdot \cos x) = -\frac{\sin 2x}{2|\cos x|}.$$

Функция возрастает на  $\left[\frac{\pi}{2} + \pi n; \pi + \pi n\right]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , убывает на


$$\left[\pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad x_{\max} = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \text{ точек минимума нет.}$$

**104. а)** так как  $y = \cos^2 x - \sin^2 x + \sin^2 x = \cos^2 x$ ,  $y_{\max} = 1$ ,  $y_{\min} = 0$ ;


**б)**  $y_{\min} = -3$ ,  $y_{\max} = 5$ ; **в)**  $y_{\min} = -\sqrt{2}$ ,  $y_{\max} = \sqrt{2}$ ;

**г)**  $y_{\min} = 1$ ,  $y_{\max}$  не существует.


$$\text{105. а) } y = 2\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x; \quad \text{б) } y = \sqrt{1 - \cos^2 x} = |\sin x|;$$



b)  $y = 1 + 2 \cos 2x$ ;



г)  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2$ .




**106.**

a)  $y = \frac{|x| \sin x}{x}$ ,


при  $x > 0$   $y = \sin x$ ,

при  $x < 0$   $y = -\sin x$ ;




б)

$$y = (\sin x - \cos x)^2 = 1 - \sin 2x;$$




в)  $y = \cos x + |\cos x|$ , при  $x \in (-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n)$ ,  $n \in Z$ ,

$$y = 2 \cos x; \text{ при } x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n), n \in Z, y = 0;$$



г)  $y = \sin x \cdot \operatorname{ctgx} = \sin x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \cos x, \quad x \neq \pi n, \quad n \in Z.$



107.

a)  $y = \frac{1}{2} + \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$  1)  $D(y) : x \in (-\infty; \infty).$  2)  $E(y) : y \in \left[-\frac{1}{2}; 1\frac{1}{2}\right].$

3) Нули:  $\frac{1}{2} + \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 0, \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2},$

$$x - \frac{\pi}{6} = (-1)^k \left(-\frac{\pi}{6}\right) + \pi k, \quad k \in Z, \quad x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z.$$

4) Промежутки знакопостоянства:

$$y > 0, \quad -\frac{\pi}{6} + 2\pi m < x - \frac{\pi}{6} < \frac{7\pi}{6} + 2\pi m, \quad m \in Z,$$



$$2\pi m < x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in Z; \quad y < 0, \quad -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m < x - \frac{\pi}{6} < -\frac{\pi}{6} + 2\pi m, \quad m \in Z,$$

$$-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi m, \quad m \in Z.$$

5) Функция ни четная, ни нечетная.

6)  $y' = \cos(x - \frac{\pi}{6}), \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 0,$

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in Z,$$



$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in Z; \quad \text{возрастает на } \left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{2\pi}{3} + 2\pi n\right], \quad n \in Z,$$

$$\text{убывает на } \left[\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \frac{5\pi}{3} + 2\pi n\right], \quad n \in Z,$$

$$x_{\max} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad x_{\min} = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

7) Периодичная с периодом  $2\pi$ .

$$6) \quad y = \frac{1}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$1) \quad D(y): \frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad \frac{x}{2} \neq \frac{5\pi}{6} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad x \neq \frac{5\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$2) \quad E(y): \quad y \in (-\infty; \infty).$$

$$3) \quad \text{Нули: } \frac{1}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = 0, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = 0, \quad \frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4) Промежутки знакопостоянства:

$$y > 0, \quad x \in (\frac{2\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z},$$



$$y < 0, \quad x \in (-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z},$$

5) Функция ни четная, ни нечетная.

$$6) \quad y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right)} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4 \cos^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right)} > 0$$

при всех  $x \in D(y)$ , функция возрастает, экстремумов нет.

7) Периодичная, период  $2\pi$ .



в)  $y = 1 + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 1 + \frac{1}{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ .

1)  $D(y): x \in (-\infty; \infty)$ .

2)  $E(y): y \in \left[\frac{1}{2}; 1\frac{1}{2}\right]$ .

3) Нулей нет.

4)  $y > 0$  при всех  $x \in D(y)$ .

5) Ни четная, ни нечетная.



6) Периодичная, период  $2\pi$ .

7)  $y' = -\frac{1}{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right), \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0,$

$$x - \frac{\pi}{4} = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

возрастает на  $\left[-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n\right],$

$n \in \mathbb{Z}$ , убывает на  $\left[\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{5\pi}{4} + 2\pi n\right], \quad n \in \mathbb{Z},$



$$x_{\max} = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad x_{\min} = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n.$$

г)  $y = 1 - \operatorname{tg} 2x$ .

1)  $D(y): 2x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$

2)  $E(y): y \in (-\infty; \infty)$ .

3) Нули:  $\operatorname{tg} 2x = 1, \quad 2x = \frac{\pi}{4} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi m}{2}, \quad m \in \mathbb{Z}$ .

4) Промежутки знакопостоянства:

$$y > 0, \quad -\frac{\pi}{2} + \pi n < 2x < \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} < x < \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z},$$


$$y < 0, \quad \frac{\pi}{4} + \pi n < 2x < \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2} < x < \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5) Ни четная, ни нечетная.

6) Периодичная с периодом  $\frac{\pi}{2}$ .

$$7) y' = -\frac{2}{\cos^2 2x} < 0$$

при всех  $x \in D(y)$ ,  
функция убывает.




**108.** Поскольку функции  $y_1 = \sin \frac{x}{10}$  и  $y_2 = x^3$  нечетные, то

$y_1(x_0) = -y_1(-x_0)$  и  $y_2(x_0) = -y_2(-x_0)$ ; значит,  $y_1(-x_0) = y_2(-x_0)$ ,  
т.е.  $x_0$  – корень уравнения.

$$\begin{aligned} 109. \text{ a)} \quad & \sin(\pi + \frac{1}{\pi}) - \cos(\pi + \frac{1}{\pi}) = \sqrt{2} (\sin(\pi + \frac{1}{\pi}) \cos \frac{\pi}{4} - \cos(\pi + \frac{1}{\pi}) \sin \frac{\pi}{4}) = \\ & = \sqrt{2} \sin(\pi + \frac{1}{\pi} - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \sin(\frac{3\pi}{4} + \frac{1}{\pi}), \frac{1}{\pi} < \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{\pi} < \pi, \\ & \text{значит, } \sqrt{2} \sin(\frac{3\pi}{4} + \frac{1}{\pi}) > 0, \quad \sin(\pi + \frac{1}{\pi}) > \cos(\pi + \frac{1}{\pi}); \end{aligned}$$

$$\text{б)} \quad 3\pi < \pi^2 < 3\frac{1}{4}\pi,$$

значит,  $\operatorname{tg} \pi^2 < 1$ ,  
а  $\operatorname{ctg} \pi^2 > 1$ , тогда  
 $\operatorname{tg} \pi^2 < \operatorname{ctg} \pi^2$ ;



в)  $\operatorname{tg} 2 < -1$ ,  $\operatorname{ctg} 2 > -1$ , значит,  $\operatorname{tg} 2 < \operatorname{ctg} 2$ ;

г)  $\sin 1 > \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\cos 1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ , значит,  $\sin 1 > \cos 1$ .

**110.**

а)  $\sin \alpha + \cos \alpha > 1$ , если  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ;  $\sin \alpha + \cos \alpha > 1$ ,  $\sin \alpha + \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} > 1$ ,

$\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} > 1 - \sin \alpha$ ; возведем в квадрат обе части:

$$1 - \sin^2 \alpha > (1 - \sin \alpha)^2, \quad 1 - \sin^2 \alpha > 1 - 2\sin \alpha + \sin^2 \alpha,$$


$$-\sin^2 \alpha > -2\sin \alpha + \sin^2 \alpha, \quad -\sin^2 \alpha > \sin \alpha (\sin \alpha - 2),$$

$$-\sin \alpha > \sin \alpha - 2, \quad 1 > \sin \alpha, \quad \text{что верно на } (0; \frac{\pi}{2});$$

6) Так как  $|\sin \alpha| \leq 1 < \frac{\pi}{2}$ , то  $\cos(\sin \alpha) > 0$ .

**111.**


a)  $y_1 = \sin x$  и  $y_2 = -x$ .



Ответ: 0.


б)  $y_1 = \operatorname{tg} x$ ;  $y_2 = \sqrt{2} \cos x$ ,

$$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{4}.$$



в)  $y_1 = \operatorname{tg} x$ ;  $y_2 = x$ .


Ответ: 0.



г)


$$y_1 = \cos x \\ \text{и } y_2 = 1 - x^2.$$

Ответ: 0.




## 10. Степенная, показательная и логарифмическая функции

**112. а)**  $16x - x^3 \geq 0, x(16 - x^2) \geq 0, x(4 - x)(4 + x) \geq 0.$



Ответ:  $x \in (-\infty; -4] \cup [0; 4].$

**б)**  $x^3 + 8 > 0, x^3 > -8, x > -2.$




Ответ:  $x \in (-2; \infty).$

**в)**  $5 - x - \frac{4}{x} \geq 0, \frac{5x - x^2 - 4}{x} \geq 0, (-x^2 + 5x - 4)x \geq 0,$   
 $(-x^2 + 5x - 4)x \geq 0, x(x - 1)(x - 4) \leq 0.$



Ответ:  $x \in (-\infty; 0) \cup [1; 4].$

**г)**  $x^2 + x - 20 > 0, (x - 4)(x + 5) > 0.$



Ответ:  $x \in (-\infty; -5) \cup (4; \infty).$

**113. а)**  $x^2 \cdot 3^x - 3^{x-1} \geq 0, 3^x(x^2 - \frac{1}{3}) \geq 0, 3^x(x - \frac{1}{\sqrt{3}})(x + \frac{1}{\sqrt{3}}) \geq 0,$

$3^x > 0$  при всех  $x, x \leq -\frac{1}{\sqrt{3}}$  или  $x \geq \frac{1}{\sqrt{3}}.$

Ответ:  $x \in (-\infty; -\frac{1}{\sqrt{3}}] \cup [\frac{1}{\sqrt{3}}; \infty).$

**б)**  $2^{\sin x} - 1 \geq 0, 2^{\sin x} \geq 2^0, y = 2^x$  – возрастает,  $\sin x \geq 0.$

Ответ:  $x \in [2\pi n; \pi + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}.$

**в)**  $4 - 3x + x^2 > 0, x^2 - 3x + 4 > 0, D < 0.$

Ответ:  $x \in (-\infty; \infty).$

**г)**  $\sin x > 0.$

Ответ:  $x \in (2\pi n; \pi + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}.$

**114.**

a)  $\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0, \\ \lg(x+10) \neq 0, \\ (x+10)^2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 2, \quad x \geq 3, \\ x+10 \neq 1, \\ x \neq -10. \end{cases}$


Ответ:  $x \in (-\infty; -10) \cup (-10; -9) \cup (-9; 2] \cup [3; \infty)$ .

б)  $\begin{cases} \log_5 \cos x \geq 0, \\ \cos x > 0; \end{cases} \quad y = \log_5 t \text{ -- возрастае}, \quad \begin{cases} \cos x \geq 1, \\ \cos x > 0; \end{cases}$

$\cos x = 1, \quad x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ .

в)  $\begin{cases} 3x - 2 > 0, \\ x^2 - x - 2 \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 3x > 2, \\ x \neq 2, x \neq -1; \end{cases} \quad \begin{cases} x > \frac{2}{3}, \\ x \neq 2, x \neq -1. \end{cases}$

Ответ:  $x \in (\frac{2}{3}; 2) \cup (2; \infty)$ .



г)  $\begin{cases} \lg(3x^2 - 2x) \geq 0, \\ 3x^2 - 2x > 0; \end{cases} \quad y = \lg t \text{ -- возрастае}, \quad \begin{cases} 3x^2 - 2x \geq 1, \\ x(3x - 2) > 0; \end{cases}$

$$3x^2 - 2x - 1 \geq 0, \quad x \geq 1 \text{ или } x \leq -\frac{1}{3}; \quad \begin{cases} x < 0 \text{ или } x > \frac{2}{3}, \\ x \geq 1 \text{ или } x \leq -\frac{1}{3}. \end{cases}$$

Ответ:  $x \in (-\infty; -\frac{1}{3}] \cup [1; \infty)$ .

**115.** а)  $\sqrt{x+1} \geq 0, \quad E(y): y \in [0; \infty);$  б)  $y = 25 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^x - 1, \quad E(y): y \in (-1; \infty);$

в)  $E(y): y \in (-\infty; \infty);$  г)  $E(y): y \in (0; +\infty).$

**116.** а)  $E(y): y \in [\frac{1}{2}; 2];$  б)  $E(y): y \in (-\infty; 2];$

в)  $E(y): y \in [1; \infty);$  г)  $E(y): y \in [1; \infty).$

**117.** а)  $\left(\frac{1}{2}\right)^x - 4 > 0, \quad 2^{-x} > 2^2, \quad y = 2^t \text{ -- возрастае}, \quad -x > 2, \quad x < -2.$

Ответ:  $y > 0 \text{ при } x \in (-\infty; -2), \quad y < 0 \text{ при } x \in (-2; \infty).$

б)  $\begin{cases} \log_4(x+3) > 0, \\ x+3 > 0; \end{cases} \quad y = \log_4 t \text{ -- возрастае}, \quad \begin{cases} x+3 > 1, \\ x+3 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -2, \\ x > -3; \end{cases} \quad x > -2.$

Ответ:  $y > 0 \text{ при } x \in (-2; \infty), \quad y < 0 \text{ при } x \in (-3; -2).$

в)  $2 - 3^x > 0, -3^x > -2, 3^x < 2, y = 3^t$  – возрастает,  $x < \log_3 2$ .

Ответ:  $y > 0$  при  $x \in (-\infty; \log_3 2)$ ,  $y < 0$  при  $x \in (\log_3 2; \infty)$ .

г)  $\begin{cases} \sqrt{x} - 4 > 0, \\ x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x} > 4, \\ x > 16. \end{cases}$

Ответ:  $y > 0$  при  $x \in (16; \infty)$ ,  $y < 0$  при  $x \in [0; 16)$ .

**118.** а)  $4^{x+2} - 4^x > 0, 16 \cdot 4^x - 4^x > 0, 15 \cdot 4^x > 0, x$  – любое число.

Ответ:  $y > 0$  при всех  $x$ .

б)  $\begin{cases} \lg(x-2)-1 > 0, \\ x-2 > 0; \end{cases} \quad \lg(x-2) > 1, y = \lg t$  – возрастает,

$$\begin{cases} \lg(x-2) > \lg 10, \\ x > 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x-2 > 10, \\ x > 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 12, \\ x > 2. \end{cases}$$

Ответ:  $y > 0$  при  $x \in (12; \infty)$ ,  $y < 0$  при  $x \in (2; 12)$ .

в)  $\begin{cases} \sqrt{x} + 3 > 0, \\ x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x} > -3, \\ x \geq 0. \end{cases}$

Ответ:  $y > 0$  при  $x \in [0; \infty)$ .

г)  $2 - \sqrt[3]{x} > 0, \sqrt[3]{x} < 2, x < 8$ .

Ответ:  $y > 0$  при  $x \in (8; \infty)$ ,  $y < 0$  при  $x \in (-\infty; 8)$ .

**119.** а)  $y(-x) = 5^{-x} + 5^{-(-x)} = 5^{-x} + 5^x = y(x)$  – четная;

б)  $y(-x) = \lg(1 - (-x)^2) = \lg(1 - x^2) = y(x)$  – четная;

в)  $y(-x) = \frac{1}{2}^{(-2x)} = 2^{2x}$  – ни четная, ни нечетная;

г)  $y(-x) = -x \cdot \sqrt[3]{(-x)^2} = x \cdot \sqrt[3]{x^2}$  – четная.

**120.** а)  $y(-x) = (-x)^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}} = y(x)$  – четная;


б)  $y(-x) = 3^{-x} - 3^{-(-x)} = 3^{-x} - 3^x = -(3^x - 3^{-x}) = -y(x)$  – нечетная;

в)  $y(-x) = 2^{\cos(-x)} = 2^{\cos x} = y(x)$  – четная;

г)  $y(-x) = \sqrt[5]{(-x)^4} + 1 = \sqrt[5]{x^4} + 1 = y(x)$  – четная.

**121.**

- а) 1)  $D(y)$ :  $x \in [0; \infty)$ ;  
 2)  $E(y)$ :  $y \in [-1; \infty)$ ;  
 3) нули:  $2\sqrt{x} - 1 = 0$ ,  
 $2\sqrt{x} = 1, \sqrt{x} = \frac{1}{2}, x = \frac{1}{4}$ ;



4)  $y > 0$  при  $x > \frac{1}{4}$ ,  $y < 0$  при  $x \in [0; \frac{1}{4})$ ;

5)  $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ,  $y' > 0$  при всех  $x$ , экстремумов нет, возрастает;

6) ни четная, ни нечетная.

б) 1)  $D(y)$ :  $x \in (-\infty; \infty)$ ;

2)  $E(y)$ :  $y \in (-2; \infty)$ ;

3) нули:  $4^{x-1} = 2$ ,  $2^{2x-2} = 2^1$ ,

$2x - 2 = 1$ ,  $2x = 3$ ,  $x = 1,5$ ;


4)  $4^{x-1} - 2 > 0$ ,  $2^{2x-2} > 2^1$ ,

$y = 2^t$  – возрастает,  $2x - 2 > 1$ ,

$2x > 3$ ,  $x > 1,5$ ,  $y > 0$  при  $x \in (1,5; \infty)$ ,  $y < 0$  при  $x \in (-\infty; 1,5)$ ;

5)  $y' = 4^{x-1} \cdot \ln 4$ ,  $4^{x-1} \cdot \ln 4 > 0$ , экстремумов нет, возрастает на  $D(y)$ ;

6) ни четная, ни нечетная, не периодическая.



в) 1)  $D(y)$ :  $x > -1$ ;

2)  $E(y)$ :  $y \in (-\infty; \infty)$ ;

3) нули:  $\log_2(x+1) = 0$ ,

$x+1 = 1$ ,  $x = 0$ ;


4)  $\log_2(x+1) > 0$ ,

$y = \log_2 t$  – возрастает,

$x+1 > 1$ ,  $x > 0$ ;  $y > 0$  при  $x > 0$ ,

$y < 0$  при  $x \in (-1; 0)$ ;

5)  $y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x+1) \ln 2} = \frac{1}{2(x+1) \ln 2} \neq 0$ ,



экстремумов нет, при  $x > -1$   $y' > 0$ , возрастает;

6) ни четная, ни нечетная, не периодическая.

г) 1)  $D(y)$ :  $x \in (-\infty; \infty)$ ;

2)  $E(y)$ :  $y \in (-\infty; \infty)$ ;


3) нули:  $\sqrt[3]{x-2} + 1 = 0$ ,

$x-2 = -1$ ,  $x = 1$ ;

4)  $y > 0$  при  $x \in (1; \infty)$ ,

$y < 0$  при  $x \in (-\infty; 1)$ ;


5)  $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-2)^2}} > 0$ , при всех  $x$ , возрастает, экстремумов нет;




6) ни четная, ни нечетная, не периодическая.

122.


a)  $y = \sqrt{x-2} + 1;$




b)  $y = 2 - \sqrt[3]{x+1};$



б)  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1};$




г)  $y = 1 + \log_2(x+2).$




123.


a)  $x > 1, y = x - 1, y = 5^{\log_2(x-1)};$




б)  $y = 2^{|x|};$



б)  $y = \left|\log_{\frac{1}{2}} x\right| - 1;$



г)  $y = \log_2 x^2 = \begin{cases} 2\log_2 x \text{ при } x > 0, \\ 2\log_2(-x) \text{ при } x < 0. \end{cases}$



**124.** а)  $y_{\text{наим}} = 0$  при  $x = 6$  или  $x = -6$ ,  $y_{\text{наиб}} = 6$  при  $x = 0$ ;


б)  $y_{\text{наиб}} = 1$  при  $x = 0$ ,  $y_{\text{наим}} = -7$  при  $x = -2$ ;

в)  $y_{\text{наиб}} = 3$  при  $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $y_{\text{наим}} = \frac{1}{3}$  при  $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ;

г)  $y_{\text{наиб}} = 4$  при  $x = -1$ ,  $y_{\text{наим}} = 0$  при  $x = 1$ .


**125.**

а)  $y_1 = \log_{\frac{1}{2}} x$  и  $y_2 = x - 3$ .




Ответ: 2.

б)  $y_1 = \sqrt{x-2}$  и  $y_2 = \frac{3}{x}$ .




Ответ: 3.

в)  $y_1 = \log_2 x$  и  $y_2 = 2^{5-x}$ .



Ответ: 4.


г)  $y_1 = 2^{|x|}$  и  $y_2 = 11 - |x|$ .



Ответ: 3; -3.


**126.**

a)  $y_1 = \log_{\frac{1}{2}} x$  и  $y_2 = x - 3$ .




Ответ:  $x = (0; 2)$ .

b)  $y_1 = 2^{-|x|}$  и  $y_2 = x^2 + 1$ .




Ответ:  $0$ .

б)  $y_1 = \sqrt{x-2}$  и  $y_2 = \frac{3}{x}$ .



Ответ:  $x \in [2; 3]$

г)  $y_1 = \log_{\frac{1}{3}} x$  и  $y_2 = 2x - 7$ .



Ответ:  $x \in (0; 3)$ .

**127.**

$y = (\log_2 3)^{\sin x}$ ,  $y = (\log_3 2)^{\cos x}$ .

$\log_2 3 > 1$ , значит, наибольшее значение первой функции равно  $\log_2 3$  при  $\sin x = 1$ ;  $\log_3 2 < 1$ , поэтому наибольшее значение второй функции достигается при  $\cos x = -1$  и равно  $\frac{1}{\log_3 2}$ .  $\log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2}$ .

**128. а)**  $D(y): \begin{cases} 4x+1 > 0, \\ 1-x^2 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x > -\frac{1}{4}, \\ -1 \leq x \leq 1; \end{cases} x \in (-\frac{1}{4}; 1];$

$$\frac{1}{\sqrt{4x+1}} - \sqrt{1-x^2} = 0, \quad \frac{1}{\sqrt{4x+1}} = \sqrt{1-x^2}, \quad \frac{1}{4x+1} = 1-x^2,$$

$$(4x+1)(1-x^2) = 1, \quad 4x - 4x^3 + 1 - x^2 = 1,$$

$$-4x^3 - x^2 + 4x = 0, \quad -x(4x^2 + x - 4) = 0, \quad x_1 = 0, \quad 4x^2 + x - 4 = 0,$$

$$D = 65, \quad x_2 = \frac{\sqrt{65}-1}{8}, \quad x_3 = \frac{-1-\sqrt{65}}{8} \text{ не входит в } D(y);$$

б)  $D(f): \begin{cases} x+15 > 0, \\ x > 0; \end{cases} 2 = \lg x(x+15), \quad x^2 + 15x = 100,$

$$x^2 + 15x - 100 = 0, \quad x_1 = -20 \text{ не входит в } D(f), \quad x_2 = 5.$$

**129. а)** Пусть  $x_1 > x_2$  на  $R$ , тогда рассмотрим разность

$$y(x_1) - y(x_2) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x_1+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{x_2+1} = \frac{1}{3} \left( \left(\frac{1}{3}\right)^{x_1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{x_2} \right) < 0,$$

$y(x_1) < y(x_2)$ . Таким образом,  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1}$  убывает на  $R$ ;

б)  $x_1 > x_2$  на  $(0; \infty)$ .  $f(x_1) - f(x_2) = \log_2 3x_1 - \log_2 3x_2 = \log_2 \frac{x_1}{x_2} > 0$  (т.к.  $\log_2 t$  возрастает и  $\frac{x_1}{x_2} > 1$ ), а, значит,  $f(x) = \log_2 3x$  возрастает на  $(0; \infty)$ .

## § 4. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств

### 11. Рациональные уравнения и неравенства

**130.**

а)  $3(x-2)-5=4-(5x-1), \quad 3x-6-5=4-5x+1, \quad 8x=16, \quad x=2;$

б)  $|2x-3|=5, \quad 2x-3=5$  или  $2x-3=-5, \quad 2x=8$  или  $2x=-2, \quad x_1=4$  или  $x_2=-1$ . Ответ:  $-1; 4$ .

в)  $7-2(3-x)=4(x-1)+5, \quad 7-6+2x=4x-4+5, \quad -2x=0, \quad x=0;$

г)  $|4-3x|=2, \quad 4-3x=2$  или  $4-3x=-2, \quad -3x=-2$  или  $-3x=-6$ ,

$$x_1 = \frac{2}{3} \text{ или } x_2 = 2. \quad \text{Ответ: } \frac{2}{3}; 2.$$

**131.** а)  $\frac{3x+1}{5} = 2 - \frac{4(x-3)}{15}$ ,  $3(3x+1) = 30 - 4(x-3)$ ,  $9x+3 = 30 - 4x + 12$ ,

$13x = 39$ ,  $x = 3$ . Ответ: 3.

б)  $\left| \frac{x-3}{2} + 5 \right| = 4$ ,  $\frac{x-3}{2} + 5 = 4$  или  $\frac{x-3}{2} + 5 = -4$ ,  $x-3+10=8$  или

$x-3+10=-8$ ,  $x=1$ ,  $x=-15$ . Ответ: 1; -15.

в)  $1 - \frac{x-3}{2} = x - \frac{3(5-2x)}{7}$ ,  $14 - 7(x-3) = 14x - 6(5-2x)$ ,

$14 - 7x + 21 = 14x - 30 + 12x$ ,  $-33x = -65$ ,  $x = \frac{65}{33}$ ,  $x = 1\frac{32}{33}$ ;

г)  $\left| 1 - \frac{x+2}{3} \right| = 5$ ,  $1 - \frac{x+2}{3} = 5$  или  $1 - \frac{x+2}{3} = -5$ ,  $1-x=15$  или

$1-x=-15$ ,  $x_1=-14$  или  $-x=-16$ ,  $x_2=16$ . Ответ: 16; -14.

**132.** а)  $ax - 2x = 3(x-1)$ ,  $ax - 2x - 3x = -3$ ,  $(a-5)x = -3$ ; при  $a \neq 5$  одно решение; при  $a = 5$  – нет решений;

б)  $a(1-x) + 2 = 3x - ax$ ,  $a - ax + 2 - 3x + ax = 0$ ,  $-3x = a + 2$ ,  
 $3x = a + 2$ ; при любых  $a$  одно решение;

в)  $x(2-a) - x = 5 + x$ ,  $2x - ax - x - x = 5$ ,  $-ax = 5$ ; при  $a \neq 0$  одно решение; при  $a = 0$  нет решений;

г)  $5+3(x+3a)=9a+5$ ,  $3x - 9a - 9a = 0$ ; при любых  $a$  одно решение.

**133.** а)  $\frac{x-1}{2} + x < 1,5x + 3,5$ ,  $x-1+2x < 3x+7$ ,  $0 \cdot x < 8$ . Ответ:  $x \in (-\infty; \infty)$ .

б)  $\frac{5x-2}{3} - \frac{3-x}{2} > 1$ ,  $2(5x-2) - (3-x)3 > 6$ ,  $10x - 4 - 9 + 3x > 6$ ,

$13x > 19$ ,  $x > 1\frac{6}{13}$ . Ответ:  $x \in (1\frac{6}{13}; \infty)$ .

в)  $x - 4(3 - x) \geq 2x + 7$ ,  $x - 12 + 4x - 2x \geq 7$ ,  $3x \geq 19$ ,  $x \geq 6\frac{1}{3}$ .

Ответ:  $x \in [6\frac{1}{3}; \infty)$ .

г)  $3 + \frac{2-3x}{4} \leq 2x$ ,  $14 - 3x \leq 8x$ ,  $11x \geq -14$ ,  $x \geq 1\frac{3}{11}$ . Ответ:  $x \in [1\frac{3}{11}; \infty)$ .

**134.** а)  $|4x-3| < 5$ ,  $-5 < 4x-3 < 5$ ,  $-2 < 4x < 8$ ,  $-\frac{1}{2} < x < 2$ . Ответ:  $x \in (-\frac{1}{2}; 2)$ .

б)  $|2x+5| \geq 1$ ,  $\begin{cases} 2x+5 \geq 1, \\ 2x+5 \leq -1; \end{cases}$  Ответ:  $x \in (-\infty; -3] \cup [-2; \infty)$ .

в)  $\frac{|x-7|}{3} \leq 2$ ,  $|x-7| \leq 6$ ,  $-6 \leq x-7 \leq 6$ ,  $1 \leq x \leq 13$ .

г)  $4|2-x| \leq 12$ ,  $|2-x| \leq 3$ ,  $-3 \leq 2-x \leq 3$ ,  $-5 \leq -x \leq 1$ ,  $-1 \leq x \leq 5$ .

**135.** а)  $\frac{|2x-3|}{x} > 0$ ,  $x > 0$ , поскольку  $|2x-3| \geq 0$ ;  $2x-3 \neq 0$ ,  $x \neq \frac{3}{2}$ .

Ответ:  $x \in (0; \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}; \infty)$ .

б)  $\frac{x+2}{|x+4|} \leq 0$ ,  $x+2 \leq 0$ ,  $x \leq -2$ , так как  $|x+4| \geq 0$ , но  $x \neq -4$ .

Ответ:  $x \in (-\infty; -4) \cup (-4, -2]$ .

в)  $(x-4)|5-3x| < 0$ ,  $x-4 < 0$ ,  $x < 4$ , так как  $|5-3x| \geq 0$ ;  $5-3x \neq 0$ .

$x \neq 1\frac{2}{3}$ .

Ответ:  $x \in (-\infty; 1\frac{2}{3}) \cup (1\frac{2}{3}; 4)$ .

г)  $|2x+7|(3-x) \leq 0$ ,  $3-x \leq 0$ ,  $x \geq -3$ , так как  $|2x+7| \geq 0$  и  $x = -3,5$ .

Ответ:  $x \in \{-3,5\} \cup [3; +\infty)$ .

**136.** а)  $x^2 + 2x - 15 = 0$ ,  $x_1 = -5$ ,  $x_2 = 3$ .

б)  $7x^2 + 5x = 0$ ,  $x(7x+5) = 0$ ,  $x_1 = 0$  и  $7x+5 = 0$ ,  $x_2 = -\frac{5}{7}$ .

в)  $(x-3)(x-2) = 6(x-3)$ ,  $(x-3)(x-8) = 0$ ,  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 8$ .

г)  $x^2 - \frac{11x}{6} + \frac{1}{2} = 0$ ,  $6x^2 - 11x + 3 = 0$ ,  $D = 121 - 72 = 49$ ,  $x_1 = \frac{11+7}{12}$ ,

$x_2 = \frac{11-7}{12}$ ,  $x_1 = 1,5$ ,  $x_2 = \frac{1}{3}$ .

**137. а)** Если имеется общий корень, то  $x^2 - ax = x^2 - x - 3a$ ,  $-ax = -x - 3a$ ,

$3a - ax = -x$ ,  $a(3-x) = -x$ ,  $a = \frac{x}{x-3}$ . При этом  $a$  оба выражения равны

нулю:  $x^2 - \frac{x}{x-3} \cdot x = 0$ ,  $x^2 \left(1 - \frac{1}{x-3}\right) = 0$ ,  $x_1 = 0$  или  $x-4 = 0$ ,  $x_2 = 4$ .

$a_1 = 0$  или  $a_2 = 4$ .

Ответ: 0; 4.

б)  $x^2 - (a-1)x - 3 = 4x^2 - (4a+3)x + 9$ ,  $3x^2 - (4a+3)x + (a-1)x + 12 = 0$ ,

$3x^2 + 12 = (4a+3-a+1)x$ ,  $3a+4 = \frac{3x^2+12}{x} = \frac{3x^2-4x+12}{3x}$ . При

этом  $a$  оба выражения равны нулю:

$$x^2 - \left( \frac{3x^2 - 4x + 12}{3x} \right) x - 3 = 0, \quad x^2 - \frac{1}{3}(3x^2 - 4x + 12) + x - 3 = 0,$$

$$3x^2 - 3x^2 + 4x - 12 + 3x - 9 = 0, \quad 7x - 21 = 0, \quad x = 3.$$

$$a = \frac{3 \cdot 9 - 3 \cdot 4 + 12}{3 \cdot 3} = 3.$$

в)  $x^2 + ax + 8 = x^2 + x + a, \quad a(x-1) = x-8, \quad a = \frac{x-8}{x-1}.$

Но при этом  $a$  каждое из данных выражений обращается в ноль,  
так что  $x^2 + \frac{x-8}{x-1}x + 8 = 0, \quad x^2(x-1) + (x-8)x + 8(x-1) = 0,$

$$x^3 - x^2 + x^2 - 8x + 8x - 8 = 0, \quad x^3 = 8, \quad x = 2. \quad \text{При } x = 2 \text{ получим}$$

$$a = \frac{2-8}{2-1} = -6. \quad \text{Ответ: } -6.$$

г)  $2x^2 + (3a-1)x - 3 = 6x^2 - (2a-3)x - 1,$

$$4x^2 - (2a-3)x - (3a-1)x + 2 = 0,$$

$$(5a-4)x = 4x^2 + 2,$$

$$5a-4 = \frac{4x^2 + 2}{x}, \quad a = \frac{4x^2 + 4x + 2}{x}. \quad \text{При этом } a \text{ оба значения}$$

должны обращаться в ноль;  $2x^2 + \left( 3 \cdot \frac{4x^2 + 4x + 2}{5x} - 1 \right) x - 3 = 0,$

$$2x^2 + \frac{3}{5}(4x^2 + 4x + 2) - x - 3 = 0, \quad 10x^2 + 12x^2 + 12x + 6 - 5x - 15 = 0,$$

$$22x^2 + 7x - 9 = 0, \quad D = 49 + 9 \cdot 88 = 841, \quad x_1 = \frac{-7 \pm \sqrt{841}}{44}, \quad x_2 = \frac{-7 \pm 29}{44},$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad x_2 = -\frac{9}{11}. \quad \text{Тогда } a_1 = \frac{4 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{2} + 2}{5 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1+2+2}{5 \cdot \frac{1}{2}} = 2 \quad \text{или}$$

$$a_2 = \frac{4 \cdot \frac{81}{121} - 4 \cdot \frac{9}{11} + 2}{-5 \cdot \frac{9}{11}} = \frac{4 \cdot \frac{81}{121} - 4 \cdot 9 + 22}{-5 \cdot 9} = \frac{4 \cdot 81 - 14 \cdot 11}{-5 \cdot 9 \cdot 11} =$$

$$= \frac{2}{5 \cdot 99} (77 - 2 \cdot 81) = -\frac{2 \cdot 85}{5 \cdot 99} = -\frac{34}{99}. \quad \text{Ответ: } 2, -\frac{34}{99}.$$

**138. а)**  $D = (k+4)^2 - 4(k+7)(k-1) = -3k^2 - 16k + 44$ ,  $-3k^2 - 16k + 44 = 0$ ,

или  $k_1 = 2$ ,  $k_2 = -7\frac{1}{3}$ ; при  $k = 1$  также одно решение.

Ответ:  $k = 2$ ,  $k = -7\frac{1}{3}$  и  $k = 1$ .

б)  $9x^2 - 2x + k - 6 + kx = 0$ ,  $9x^2 + (k-2)x + k - 6 = 0$ ,

$$D = (k-2)^2 - 4(k-6) \cdot 9 = k^2 - 40k + 220,$$

$$k^2 - 40k + 220 = 0, D_1 = 1600 - 880 = 720, k_1 = \frac{40 + \sqrt{720}}{2},$$

$$k_1 = 20 + 6\sqrt{5}, k_2 = \frac{40 - \sqrt{720}}{2}, k_2 = 20 - 6\sqrt{5}.$$

Ответ: при  $k = 20 + 6\sqrt{5}$  и  $k = 20 - 6\sqrt{5}$ .

в)  $D = (2(k-1))^2 - 4 \cdot 3 \cdot (2k-5) = 4k^2 - 8k + 4 - 24k + 60 = 4k^2 - 32k + 64$ ,

$k^2 - 8k + 16 = 0$ ,  $k = 4$ ; при  $k=4$ ; при  $k=2,5$  также  $x = 1$  – один корень.

Ответ: при  $k = 4$  и  $k = 2,5$ .

г)  $D = 36 - 4(k-2) \cdot 3k = 36 - 12k^2 + 24k, -12k^2 + 24k + 36 = 0$ ,

$$k^2 - 2k - 3 = 0, k_1 = 3, k_2 = -1; \text{ при } k = 0 \text{ – одно решение.}$$

Ответ: при  $k = -1$ ,  $k = 3$  и  $k = 0$ .

**139. а)**  $x_1 + x_2 = \frac{5}{3}$ ; **б)**  $x_1 \cdot x_2 = -\frac{2}{3}$ ;

**в)**  $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 = \left(\frac{5}{3}\right)^2 + \frac{2 \cdot 2}{3} = \frac{25}{9} + \frac{4}{3} = \frac{37}{9} = 4\frac{1}{9}$ ;

**г)**  $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 \cdot x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2 - x_1 \cdot x_2) =$

$$= \frac{5}{3} \cdot \left(4\frac{1}{9} + \frac{2}{3}\right) = \frac{5}{3} \cdot \left(\frac{37+6}{9}\right) = \frac{5 \cdot 43}{3 \cdot 9} = \frac{215}{27}.$$

**140. а)**  $\frac{6x - x^2 - 6}{x-1} - \frac{2x-3}{x-1} = 1$ ,  $x \neq 1$ ,  $6x - x^2 - 6 - 2x + 3 - x + 1 = 0$ ,

$$-x^2 + 3x - 2 = 0, x^2 - 3x + 2 = 0, x_1 = 2, x_2 = 1 - \text{не удовлетворяется.}$$

**б)**  $\frac{2x+1}{x} + \frac{4x}{2x+1} = 5$ ,  $x \neq 0$ ,  $x \neq -\frac{1}{2}$ ,  $(2x+1)^2 + 4x^2 - 5x(2x+1) = 0$ ,

$$4x^2 + 4x + 1 + 4x^2 - 10x^2 - 5x = 0, \quad 2x^2 + x - 1 = 0,$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = \frac{1}{2}.$$

Ответ: 0,5; -1.

$$\text{в)} \quad \frac{2}{x^2 + 5x} + \frac{3}{2x - 10} = \frac{5}{x^2 - 25}, \quad x \neq 0, \quad x \neq 5, \quad x \neq -5,$$

$$\frac{4(x-5) + 3x(x+5) - 30x}{2x(x^2 - 25)} = 0,$$

$$4x - 20 + 3x^2 + 15x - 30x = 0, \quad 3x^2 - 11x - 20 = 0, \quad x_1 = -\frac{4}{3}, \quad x_2 = 5 - \text{при}$$

$$x_2 \text{ условие лишено смысла.} \quad \text{Ответ: } -\frac{4}{3}.$$

$$\text{г)} \quad \frac{14}{x^2 - 4} + \frac{3}{(2-x)^2} = \frac{5}{(x+2)^2}, \quad x \neq 2, \quad x \neq -2, \quad \frac{14}{x^2 - 4} + \frac{3}{(x-2)^2} - \frac{5}{(x+2)^2} = 0,$$

$$14(x+2)(x-2) + 3(x+2)^2 - 5(x-2)^2 = 0,$$

$$14x^2 - 56 + 3x^2 + 12x + 12 - 5x^2 + 20x - 20 = 0;$$

$$3x^2 + 8x - 16 = 0, \quad x_1 = -4, \quad x_2 = 1\frac{1}{3}.$$

$$\text{141. а)} \quad \frac{4}{x^2 + 4} + \frac{5}{x^2 + 5} = 2, \quad 4(x^2 + 5) + 5(x^2 + 4) - 2(x^2 + 4)(x^2 + 5) = 0,$$

$$4x^2 + 20 + 5x^2 + 20 - 2x^4 - 18x^2 - 40 = 0, \quad -2x^4 - 9x^2 = 0, \quad x = 0;$$

$$\text{б)} \quad 2x^4 - 5x^2 + 2 = 0.$$

$$x^2 = 2 \text{ или } x^2 = \frac{1}{2}, \quad x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = -\sqrt{2}, \quad x_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\text{в)} \quad \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 - 3\left(\frac{x-1}{x}\right) + 2 = 0, \quad x \neq 0. \quad \text{Пусть } \frac{x-1}{x} = y, \quad \text{тогда}$$

$$y^2 - 3y + 2 = 0, \quad y_1 = 2, \quad y_2 = 1, \quad \frac{x_1 - 1}{x_1} = 2, \quad \frac{x_2 - 1}{x_2} = 1, \quad x_1 - 1 - 2x_1 = 0,$$

$x_1 = -1$ ;  $x_2 - 1 = x_2$  — корней нет;

$$\text{г)} \quad \frac{x^2 + 1}{x} + \frac{x}{x^2 + 1} = 2,5, \quad x \neq 0. \quad \text{Пусть } \frac{x^2 + 1}{x} = y, \quad y \neq 0,$$

$$y + \frac{1}{y} - \frac{5}{2} = 0, \quad 2y^2 - 5y + 2 = 0, \quad y_1 = 2, \quad y_2 = \frac{1}{2},$$

$$\frac{x_1^2 + 1}{x_1} = 2, \quad \frac{x_2^2 + 1}{x_2} = \frac{1}{2}, \quad x_1^2 - 2x_1 + 1 = 0, \quad x_1 = 1;$$

$2x_2^2 - x_2 + 2 = 0$  – корней нет.

Ответ: 1.

**142.** а)  $2x^2 + 6x + 17 > 0, \quad 2x^2 + 6x + 17 = 0, \quad D < 0$ , так как

$a = 2 > 0$  и  $D < 0$ , то  $2x^2 + 6x + 7 > 0$  при всех  $x$ . Ответ:  $x \in (-\infty; \infty)$ .

б)  $x^2 - 3,2x < 0, \quad x^2 - 3,2x = 0, \quad x(x - 3,2) = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 3,2; \quad x^2 - 3,2x < 0$  при  $0 < x < 3,2$ ;

в)  $(3x - 2)^2 - 4x(2x - 3) \geq 0, \quad 9x^2 - 12x + 4 - 8x^2 + 12x \geq 0, \quad x^2 + 4 \geq 0$

при любом  $x$ . Ответ:  $x \in (-\infty; \infty)$ .


г)  $(6x - 1)(1 + 6x) + 14 < 7x(2 + 5x), \quad 36x^2 - 1 + 14 - 14x - 35x^2 < 0,$

$x^2 - 14x + 13 < 0; \quad x^2 - 14x + 13 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 13; \quad x^2 - 14x + 13 < 0$  при  $1 < x < 13$ .

**143.**

а)  $\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)} \geq 0; \quad y(-2) < 0, \quad y\left(\frac{1}{2}\right) > 0,$

$$y\left(\frac{5}{2}\right) < 0, \quad y(4) > 0.$$



Ответ:  $x \in [1; 2] \cup (3; \infty)$ .


б)  $\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 2x + 8} \leq 0; \quad \frac{(x-1)(x+3)}{(x^2 - 2x + 8)} \leq 0, \quad x^2 - 2x + 8 > 0$  при любом  $x$ ,

$$(x-1)(x+3) \leq 0, \quad -3 \leq x \leq 1.$$

Ответ:  $x \in [-3; 1]$ .


в)  $\frac{x-2}{(x-3)(x-5)} < 0; \quad (x-2)(x-3)(x-5) < 0$ .

Ответ:  $x \in (-\infty; 2) \cup (3; 5)$ .



г)  $\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 5x - 6} > 0;$

$$\frac{(x+1)(x+4)}{(x-6)(x+1)} > 0, \quad (x+1)^2(x+4)(x-6) > 0.$$




Ответ:  $x \in (-\infty; -4) \cup (6; \infty)$ .

**144.**

a)  $(x-1)(x+2)(x-3)(x-4) \leq 0$ .


Ответ:  $x \in [-2; 1] \cup [3; 4]$ .



б)  $x^4 - 3x^2 + 2 \leq 0 ; x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ ,

$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = \sqrt{2}, x_4 = -\sqrt{2}$ ;

$$(x+1)(x-1)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) \leq 0. x \in [-\sqrt{2}; -1] \cup [1; \sqrt{2}]$$



в)  $\frac{4-x}{x-5} > \frac{1}{1-x}, \quad \frac{(4-x)(1-x)-(x-5)}{(x-5)(1-x)} > 0,$

$$\frac{4-5x+x^2-x+5}{(x-5)(1-x)} > 0, \quad \frac{x^2-6x+9}{(x-5)(1-x)} > 0, \quad \frac{(x-3)^2}{(x-5)(1-x)} > 0,$$


$$(x-3)^2 > 0 \text{ при } x \neq 3, \quad (x-5)(1-x) > 0 \text{ при } 1 < x < 5.$$

Ответ:  $x \in (1; 3) \cup (3; 5)$ .

г)  $1 + \frac{12}{x^2} < \frac{7}{x}, x \neq 0, \quad \frac{x^2+12-7x}{x^2} < 0, \quad \frac{x^2-7x+12}{x^2} < 0,$

$$\frac{(x-3)(x-4)}{x^2} < 0, \quad (x-3)(x-4) \cdot x^2 < 0, \quad x^2 > 0 \text{ при } x \neq 0.$$

Ответ:  $x \in (3; 4)$ .



**145.**

а)  $m + \frac{4}{m} - 4 = \frac{m^2 - 4m + 4}{m} = \frac{(m-2)^2}{m}$ , при  $m > 0$  выражение больше нуля;

б)  $\frac{2m}{1+m^2} - 1 = \frac{2m - 1 - m^2}{1+m^2} = -\frac{(m-1)^2}{1+m^2}$ , эта разность при всех  $m$

неположительна, значит,  $\frac{2m}{1+m^2} \leq 1$  при любых  $m$ ;

в)  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{ab} = \frac{(a-b)^2}{ab}$ , при  $a > 0$  и  $b > 0$  эта

разность неотрицательна, значит,  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ ;

г)  $\frac{a}{b} - \frac{a+c}{b+c} = \frac{ab+ac-ab-bc}{b(b+c)} = \frac{c(a-b)}{b(b+c)}$ . Эта разность при  $a > 0$ ,

$b > 0, c > 0$  и  $a < b$  отрицательна. Таким образом  $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+c}$ .

## 12. Иррациональные уравнения и неравенства

146. а)  $\sqrt{x^2 + 2x + 10} = 2x - 1$ ;  $x^2 + 2x + 10 > 0$  при любых  $x$   $D < 0$ ;

$$2x - 1 \geq 0, \quad x \geq \frac{1}{2}; \quad x^2 + 2x + 10 = (2x - 1)^2, \quad x^2 + 2x + 10 - 4x^2 + 4x - 1 = 0,$$

$3x^2 - 6x - 9 = 0$ ,  $x^2 - 2x - 3 = 0$ ,  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = -1$  — не удовлетворяет

$$\text{условию } x = \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: } 3.$$

б)  $\sqrt{x^2 - 16} = x^2 - 22$ ;  $\begin{cases} x^2 - 16 \geq 0, \\ x^2 - 22 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} |x| \geq 4, \\ |x| \geq \sqrt{22}; \end{cases}$

$$x^2 - 16 = (x^2 - 22)^2, \quad x^2 - 16 = x^4 - 44x^2 + 484, \quad x^4 - 45x^2 + 500 = 0,$$

$$x^2 = 25 \text{ или } x^2 = 20, \quad x_1 = 5, \quad x_2 = -5, \quad x_3 = -2\sqrt{5}, \quad x_4 = 2\sqrt{5};$$

$x_3, x_4$  не удовлетворяют условию  $|x| \geq \sqrt{22}$ .

в)  $\sqrt{17 + 2x - 3x^2} = x + 1$ ;  $\begin{cases} x + 1 \geq 0, \\ -3x^2 + 2x + 17 \geq 0; \end{cases}$

$$17 + 2x - 3x^2 = x^2 + 2x + 1, \quad 4x^2 - 16 = 0, \quad x = 2, \quad x = -2 \text{ — не удовлетворяют условию.}$$

г)  $\sqrt{x^2 + 9} = x^2 - 11$ ;  $x^2 - 11 \geq 0, x \leq -\sqrt{11}$  или  $x \geq \sqrt{11}$ ;

$$x^2 + 9 = x^4 - 22x^2 + 121, \quad x^4 - 23x^2 + 112 = 0, \quad x_1 = 4, \quad x_2 = -4, \quad x_3 = -\sqrt{7},$$

$x_4 = \sqrt{7}$ ,  $x_3, x_4$  не удовлетворяют условиям.

147. а)  $\sqrt{x+17} - \sqrt{x-7} = 4$ ;  $\begin{cases} x+17 \geq 0, \\ x-7 \geq 0; \end{cases} \quad x \geq 7;$

$$x+17 - 2\sqrt{(x+17)(x-7)} + x-7 = 16, \quad 2x-6 - 2\sqrt{(x+17)(x-7)} = 0,$$

$$\sqrt{(x+17)(x-7)} = x-3, \quad (x+17)(x-7) = x^2 - 6x + 9,$$

$$x^2 - 7x + 17x - 119 - 9 + 6x - x^2 = 0, \quad 16x = 128, \quad x = 8. \quad \text{Ответ: } 8.$$

б)  $2\sqrt{x-1} + \sqrt[4]{x-1} = 3$ ;  $x-1 \geq 0, x \geq 1$ . Пусть  $\sqrt[4]{x-1} = y$ , тогда

$$2y^2 + y - 3 = 0, \quad y_1 = 1, \quad y_2 = -\frac{3}{2}; \quad \sqrt[4]{x-1} = 1, \quad x-1 = 1, \quad x = 2; \quad \text{или} \quad \sqrt[4]{x-1} =$$

$= -\frac{3}{2}$  — не имеет смысла.

в)  $\sqrt{x+7} + \sqrt{x-2} = 9$ ;  $\begin{cases} x+7 \geq 0, \\ x-2 \geq 0; \end{cases} \quad x+7 + 2\sqrt{(x+7)(x-2)} + x-2 = 81,$

$$2x+5+2\sqrt{(x+7)(x-2)}=81, \quad 2\sqrt{(x+7)(x-2)}=76-2x,$$

$$\sqrt{(x+7)(x-2)}=38-x, \quad x < 38, \quad (x+7)(x-2)=1444-76x+x^2,$$

$$x^2-2x+7x-14=1444-76x+x^2, \quad 81x=1458, \quad x=18. \quad \text{Ответ: } 18.$$

г)  $2\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[6]{x+1}=6; \quad x+1 \geq 0, \quad x \geq -1.$  Пусть  $\sqrt[6]{x+1}=y,$  тогда

$$2y^2-y-6=0, \quad y_1=-1\frac{1}{2}, \quad y_2=2; \quad \sqrt[6]{x+1}=2 \quad \text{или} \quad \sqrt[6]{x+1}=-1\frac{1}{2} \quad \text{не имеет смысла.} \quad x+1=64, \quad x=63. \quad \text{Ответ: } 63.$$

**148.** а)  $\sqrt{x}-\frac{4}{\sqrt{2+x}}+\sqrt{2+x}=0; \quad \begin{cases} x \geq 0, \\ 2+x \geq 0; \end{cases} \quad x \geq 0;$

$$\sqrt{x(2+x)}-4+2+x=0, \quad \sqrt{x(2+x)}=2-x, \quad x \leq 2, \quad 8x+x^2=4-4x+x^2,$$

$$6x=4, \quad x=\frac{2}{3}.$$

б)  $\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}-2=0; \quad x \geq 0.$  Пусть  $\sqrt[4]{x}=y,$  тогда  $y^2+y-2=0,$

$$y_1=-2, \quad y_2=1; \quad \sqrt[4]{x_1}=-2 \quad \text{не имеет смысла.} \quad \sqrt[4]{x_2}=1, \quad x_2=1;$$

в)  $\frac{x-\sqrt{x+5}}{x+\sqrt{x+5}}=\frac{1}{7}; \quad x+5 \geq 0, \quad x \geq -5; \quad 7x-7\sqrt{x+5}=x+\sqrt{x+5},$

$$6x=8\sqrt{x+5}, \quad 36x^2=64(x+5), \quad 36x^2=64x+320, \quad 9x^2-16x-80=0,$$

$$x_1=4, \quad x_2=-\frac{20}{9}, \quad x_2=-2\frac{2}{9}. \quad \text{Ответ: } 4; -2\frac{2}{9}.$$

г)  $\sqrt[3]{3x+1}-\sqrt{3x+1}=0; \quad 3x+1 \geq 0, \quad x \geq -\frac{1}{3}; \quad \sqrt[6]{(3x+1)^2}-\sqrt[6]{(3x+1)^3}=0;$

$$\sqrt[6]{(3x+1)^2}\left(1-\sqrt[6]{3x+1}\right)=0, \quad \sqrt[3]{3x+1}=0 \quad \text{или} \quad 1-\sqrt[6]{3x+1}=0,$$

$$3x+1=0, \quad \sqrt[3]{3x+1}=1, \quad x=-\frac{1}{3}; \quad 3x+1=1, \quad x=0. \quad \text{Ответ: } -\frac{1}{3}; 0.$$

**149.** а)  $\sqrt{225+x^2}=x^2-47; \quad x^2-47 \geq 0, \quad x^2 \geq 47, \quad x \leq -\sqrt{47} \quad \text{или} \quad x \geq \sqrt{47};$   
 $225+x^2=x^4-94x^2+2209, \quad x^4-95x^2+1984=0.$  Пусть  $x^2=y,$   
 тогда  $y^2-95y+1984=0, \quad y_1=64, \quad y_2=31; \quad x^2=64 \quad \text{или} \quad x^2=31,$   
 $x_1=8, \quad x_2=-8, \quad x_3=\sqrt{31} \quad \text{не удовлетворяет условиям,} \quad x_4=-\sqrt{31}$   
 $\text{не удовлетворяет условиям.} \quad \text{Ответ: } -8; 8.$

б)  $\sqrt[3]{x-2}=x-2, \quad \sqrt[3]{x-2}-\sqrt[3]{(x-2)^3}=0, \quad \sqrt[3]{x-2}\left(1-\sqrt[3]{(x-2)^2}\right)=0.;$

$$\sqrt[3]{x-2}=0 \quad \text{или} \quad 1-\sqrt[3]{(x-2)^2}=0, \quad x_1=2, \quad \sqrt[3]{(x-2)^2}=1,$$

$$x-2=\pm 1, \quad x_2=3, \quad x_3=1. \quad \text{Ответ: } 2; 3; 1.$$

в)  $\sqrt{x^2 + 36} = x^2 - 54$ ;  $x^2 - 54 \geq 0$ ,  $x < -\sqrt{54}$  или  $x > \sqrt{54}$ ,  
 $x^4 - 109x^2 + 2880 = 0$ . Тогда  $x^2 = y$ , тогда  $y^2 - 109y + 2880 = 0$ ,  
 $y_1 = 64$ ,  $y_2 = 45$ ;  $x^2 = 64$  и  $x^2 = 45$ ,  $x_1 = 8$ ,  $x_2 = -8$ ,  
 $x_3 = 3\sqrt{5}$  и  $x_4 = -3\sqrt{5}$  не удовлетворяют условиям.

г)  $\sqrt[3]{x^3 - 5x^2 + 16x - 5} = x - 2$ ,  $x - 5x^2 + 16x - 5 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ ,  
 $x^2 + 4x + 3 = 0$ ,  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = -3$ .

**150. а)**  $\sqrt{x^2 - 5} \geq 2$ ,  $x^2 - 5 \geq 4$ ,  $x^2 \geq 9$ ,  $x^5 \leq -3$  или  $x \geq 3$ .

Ответ:  $x \in (-\infty; -3] \cup [3; \infty)$ .

б)  $\sqrt{(x-2)(1-2x)} > -1$ ,  $\sqrt{(x-2)(1-2x)} \geq 0$ ,  $(x-2)(1-2x) \geq 0$ ,  
 $x \in [0,5; 2]$ . Ответ:  $x \in [0,5; 2]$ .

в)  $\sqrt{x^2 - 16} \geq 1$ ,  $x^2 - 16 \geq 1$ ,  $x^2 \geq 16$ ,  $x \leq -\sqrt{17}$  или  $x \geq \sqrt{17}$ .  
Ответ:  $x \in (-\infty; -\sqrt{17}] \cup [\sqrt{17}; \infty)$ .

г)  $(\sqrt{x}-3)(x^2+1) > 0$ ,  $x^2+1 > 0$ ,  $\sqrt{x}-3 > 0$ ,  $\sqrt{x}-3 > 0$ ,  
 $\sqrt{x} > 3$ ,  $x > 9$ . Ответ:  $x \in (9; \infty)$ .

**151. а)**  $\sqrt{x^2 - 6x + 9} > 3$ ,  $\sqrt{(x-3)^2} > 3$ ,  $|x-3| > 3$ ,  $x-3 > 3$  и  
 $x-3 < -3$ ,  $x > 6$ ,  $x < 0$ . Ответ:  $x \in (-\infty; 0) \cup (6; \infty)$ .

б)  $\frac{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}{2x^2 + x + 1} \geq 0$ ,  $2x^2 + x + 1 > 0$ ; ( $D < 0$ ),  $\sqrt{x^2 - 2x + 3} \geq 0$ ,  
 $x^2 - 2x + 3 \geq 0$ ,  $D < 0$ ,  $x$  – произвольное. Ответ:  $x \in (-\infty; \infty)$ .

в)  $\sqrt{25 - 20x + 4x^2} \leq 1$ ,  $\begin{cases} 25 - 20x + 4x^2 \geq 0, \\ 25 - 20x + 4x^2 \leq 1; \end{cases}$   $\begin{cases} (5-2x)^2 \geq 0, \\ (5-2x)^2 \leq 1; \end{cases}$   
 $-1 \leq 5 - 2x \leq 1$ ,  $2 \leq x \leq 3$ . Ответ:  $x \in [2; 3]$ .

г)  $\sqrt{2x - x^2 + 15}(3x + x^2 - 4) \leq 0$ ,  $\sqrt{2x - x^2 + 15}(-x^2 + 3x - 4) \leq 0$ ,  
 $-x^2 + 3x - 4 < 0$ ; ( $D < 0$ ),  $\sqrt{2x - x^2 + 15} \geq 0$ ,  $-x^2 + 2x + 15 \geq 0$ ,  
 $x^2 - 2x - 15 = 0$ ,  $x_1 = 5$ ,  $x_2 = -3$ ,  $x \in [-3; 5]$ . Ответ:  $x \in [-3; 5]$ .

### 13. Тригонометрические уравнения и неравенства

**152.** а)  $\cos x + 2 \cos 2x = 1$ ,

$$2 \cos^2 x + \cos x - 2(1 - \cos^2 x) - 1 = 0,$$

$$2 \cos^2 x + \cos x - 2 + 2 \cos^2 x - 1 = 0, \quad 4 \cos^2 x + \cos x - 3 = 0.$$

$$\cos = y, \quad 4y^2 + y - 3 = 0, \quad y_1 = -1, \quad y_2 = \frac{3}{4}; \quad \cos x_1 = -1,$$

$$\cos x_2 = \frac{3}{4}, \quad x_1 = -\pi + 2\pi n, \quad n \in Z, \quad x_2 = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k, \quad k \in Z.$$

Ответ:  $-\pi + 2\pi n, \quad n \in Z; \quad \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k, \quad k \in Z$ .

б)  $4 \sin 2x - 3 \sin(2x - \frac{\pi}{2}) = 5, \quad 4 \sin 2x + 3 \sin(\frac{\pi}{2} - 2x) = 5, \quad 4 \sin 2x + 3 \cos 2x = 5,$

$$8 \sin x \cdot \cos x + 3 \cos^2 x - 3 \sin^2 x - 5 \sin^2 x - 5 \cos^2 x = 0, \quad \cos \neq 0,$$

$$8 \operatorname{tg}^2 x - x 8 \operatorname{tg} x + 2 = 0, \quad \operatorname{tg} x = y, \quad 8y^2 - 8y + 2 = 0,$$

$$4y^2 - 4y + 1 = 0, \quad (2y - 1)^2 = 0, \quad 2y = 1, \quad y = \frac{1}{2}; \quad x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, \quad n \in Z.$$

Ответ:  $\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, \quad n \in Z$ .

в)  $2 \cos^2 x + 4 \cos x = 3 \sin^2 x, \quad 2 \cos^2 x + 4 \cos x - 3(1 - \cos^2 x) = 0,$

$$2 \cos^2 x + 3 \cos^2 x + 4 \cos x - 3 = 0, \quad 5 \cos^2 x + 4 \cos x - 3 = 0. \quad \cos x = y,$$

$$5y^2 + 4y - 3 = 0, \quad D = 16 + 60 = 76, \quad x_1 = \frac{-2 + \sqrt{19}}{5},$$

$$x_2 = \frac{-2 - \sqrt{19}}{5}, \quad \cos x = \frac{-2 + \sqrt{19}}{5}; \quad x = \pm \arccos \left( \frac{-2 + \sqrt{19}}{5} \right) + 2\pi n, \quad n \in Z;$$

$$\cos x = \frac{-2 - \sqrt{19}}{5} < -1 - \text{не имеет смысла.}$$

Ответ:  $\pm \arccos \left( \frac{-2 + \sqrt{19}}{5} \right) + 2\pi n, \quad n \in Z$ .

г)  $\cos^2 x + 4 \sin^2 x = 2 \sin 2x, \quad \cos^2 x + 4 \sin^2 x - 4 \sin x \cdot \cos x = 0,$

$$\cos x \neq 0, \quad 1 + 4 \operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x = 0, \quad 4 \operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x + 1 = 0, \quad (2 \operatorname{tg} x - 1)^2 = 0,$$

$$2 \operatorname{tg} x - 1 = 0, \quad 2 \operatorname{tg} x = 0, \quad \operatorname{tg} x = \frac{1}{2}, \quad x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, \quad n \in Z.$$

Ответ:  $\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, \quad n \in Z$ .

**153. a)**  $\sin^3 x - \cos^3 x = 1 + \frac{\sin 2x}{2}$ ,  $(\sin x - \cos x)(\sin^2 x + \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x) =$   
 $= 1 + \sin x \cdot \cos x$ ,  $(\sin x - \cos x)(1 + \sin x \cdot \cos x) - (1 + \sin x \cdot \cos x) = 0$ ,  
 $(1 + \sin x \cdot \cos x) \cdot (\sin x - \cos x - 1) = 0$ ,  $1 + \sin x \cdot \cos x = 0$  и  
 $\sin x - \cos x - 1 = 0$ ,  $\frac{1}{2} \sin 2x = -1$ ,  $\sin x - \cos x = 1$ ,  $\sin 2x = -2$  не  
имеет смысла;  $\sin x = 1 + \cos x \sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = 1$ ,  
 $-2 \sin x \cos x = 0$ ,  $\sin x = 0$  или  $\cos x = 0$ ,  $\sin x \geq 0$ ,  $\cos x \leq 0$ ,  
 $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $x = \pi + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ . Ответ:  $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $x = \pi + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ .

б)  $\cos(\frac{\pi}{4} + x) + \cos(\frac{\pi}{4} - x) = 1$ ,  
 $2 \cos(\frac{\pi}{4}) \cos x = 1$ ,  $\sqrt{2} \cos x = 1$ ,  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  
 $\cos(\frac{\pi}{4} - x) \geq 0$ ,  $\sin^2(\frac{\pi}{4} - x) + \cos^2(\frac{\pi}{4} - x) + 2 \sin(\frac{\pi}{4} - x) \cos(\frac{\pi}{4} - x) = 1$ ,  
 $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ ;

в)  $\cos^4 x - \sin^4 x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $(\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  
 $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $2x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ ,  $x = \pm \frac{\pi}{12} + \pi n$ ,  $n \in Z$ ;  
г)  $\sin(\frac{\pi}{6} + x) - \sin(\frac{\pi}{6} - x) = 1$ ,  $2 \sin \frac{\frac{\pi}{6} + x - \frac{\pi}{6} + x}{2} \cdot \cos \frac{\frac{\pi}{6} + x + \frac{\pi}{6} - x}{2} = 1$ ,  
 $2 \sin x \cdot \cos \frac{\pi}{6} = 1$ ,  $2 \sin x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1$ ,  $\sqrt{3} \sin x = 1$ ,  $x = (-1)^k \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}} + \pi k$ ,  $k \in Z$ .

**154. а)**  $\cos 4x + 2 \cos^2 x = 1$ ,  $\cos^2 2x - \sin^2 2x + 1 + \cos 2x = 1$ ,  
 $2 \cos^2 2x - 1 + 2x + \cos 2x = 0$ ;  $\cos 2x = y$ ,  
 $2y^2 + y - 1 = 0$ ,  $y_1 = -1$ ,  $y_2 = \frac{1}{2}$ ;  $\cos 2x = -1$  или  $\cos 2x = \frac{1}{2}$ ,  
 $2x = \pi + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ ,  $2x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$ ,  $k \in Z$ ,  $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ ,  $n \in Z$ ;  
 $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k$ ,  $k \in Z$ . Ответ:  $\frac{\pi}{2} + \pi n$ ,  $n \in Z$ ;  $\pm \frac{\pi}{6} + \pi k$ ,  $k \in Z$ .

$$6) \quad 4(1 + \cos x) = 3 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}, \quad 4 \cdot 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 3 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} = 0,$$

$$\cos \frac{x}{2} (8 \cos \frac{x}{2} - 3 \sin^2 \frac{x}{2}) = 0. \quad \cos \frac{x}{2} = 0, \quad \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z, \quad x_1 = \pi + 2\pi k, \quad k \in Z;$$

$$8 \cos \frac{x}{2} - 3 + 3 \cos^2 \frac{x}{2} = 0; \quad \cos \frac{x}{2} = y,$$

$$3y^2 + 8y - 3 = 0, \quad y_1 = -3, \quad y_2 = \frac{1}{3}; \quad \cos \frac{x}{2} = -3 - \text{не имеет смысла};$$

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{3}; \quad \frac{x}{2} = \pm \arccos \frac{1}{3} + 2\pi n, \quad x = \pm 2 \arccos \frac{1}{3} + 4\pi n, \quad n \in Z.$$

Ответ:  $\pi + 2\pi k, \quad k \in Z; \quad \pm 2 \arccos \frac{1}{3} + 4\pi n, \quad n \in Z.$

в)  $\cos 3x + \sin x \cdot \sin 2x = 0, \quad \cos 3x + \frac{1}{2}(\cos x - \cos 3x) = 0,$

$$\cos 3x + \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} \cos 3x = 0, \quad \frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{2} \cos x = 0, \quad \frac{1}{2} (\cos 3x + \cos x) = 0,$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2x \cdot \cos x = 0, \quad \cos 2x = 0 \quad \text{или} \quad \cos x = 0, \quad 2x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in Z,$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z, \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in Z. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in Z; \quad \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z.$$

г)  $4(1 - \cos x) = 3 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}, \quad 4 \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2} - 3 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} = 0,$

$$\sin \frac{x}{2} (8 \sin \frac{x}{2} - 3 \cos^2 \frac{x}{2}) = 0.$$

1)  $\sin \frac{x}{2} = 0, \quad \frac{x}{2} = \pi n, \quad n \in Z, \quad x = 2\pi n, \quad n \in Z;$

2)  $8 \sin \frac{x}{2} - 3 \cos^2 \frac{x}{2} = 0, \quad 8 \sin \frac{x}{2} - 3 + 3 \sin^2 \frac{x}{2} = 0;$

$$\sin \frac{x}{2} = y, \quad 3y^2 + 8y - 3 = 0, \quad y_1 = -3, \quad y_2 = \frac{1}{3}; \quad \sin \frac{x}{2} = -3 - \text{не имеет смысла};$$

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{3}, \quad \frac{x}{2} = (-1)^k \arcsin \frac{1}{3} + \pi k, \quad k \in Z, \quad x = 2 \cdot (-1)^k \arcsin \frac{1}{3} + 2\pi k, \quad k \in Z.$$

Ответ:  $2\pi n, \quad n \in Z; \quad 2 \cdot (-1)^k \arcsin \frac{1}{3} + 2\pi k, \quad k \in Z.$

**155. а)**  $\cos 2x - \cos 6x = 0, \quad -2 \sin \left( \frac{-4x}{2} \right) \cdot \sin \frac{8x}{2} = 0, \quad 2 \sin 2x \cdot \sin 4x = 0,$

$$\sin 2x = 0 \quad \text{или} \quad \sin 4x = 0, \quad 2x = \pi k, \quad 4x = \pi n, \quad x = \frac{\pi k}{2}, \quad k \in Z, \quad x = \frac{\pi n}{4}, \quad n \in Z;$$

6)  $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$ ,  $2 \sin \frac{4x}{2} \cdot \cos x + \sin 2x = 0$ ,  
 $2 \sin 2x \cdot \cos x + \sin 2x = 0$ ,  $\sin 2x(2 \cos x + 1) = 0$ ,  $\sin 2x = 0$  и  
 $2 \cos x + 1 = 0$ ,  $2x = \pi k$ ,  $\cos x = -\frac{1}{2}$ ,  $x = \frac{\pi k}{2}$ ,  $k \in Z$ ;  $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ .

Ответ:  $\frac{\pi k}{2}$ ,  $k \in Z$ ;  $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ .

b)  $\sin x + \sin 3x = 0$ ,  $2 \sin 2x \cdot \cos x = 0$ ,  $\sin 2x = 0$  или  $\cos x = 0$ ,

$$2x = \pi n$$
,  $n \in Z$ ,  $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ ,  $k \in Z$ , значит,  $x = \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in Z$ ;

г)  $\cos(\frac{\pi}{2} + 5x) + \sin x = 2 \cos 3x$ ,  $-\sin 5x + \sin x - 2 \cos 3x = 0$ ,

$$\sin x - \sin 5x - 2 \cos 3x = 0$$
,  $-2 \sin 2x \cdot \cos 3x - 2 \cos 3x = 0$ ,

$$-2 \cos 3x(\sin 2x + 1) = 0$$
,  $\cos 3x = 0$  и  $\sin 2x = -1$ ,  $3x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ ,

$$n \in Z$$
,  $2x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ,  $k \in Z$ ,  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}$ ,  $n \in Z$ ;  $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$ ,  $k \in Z$ .

**156.** a)  $\frac{6}{\operatorname{ctgx} + 2} = 3 - \operatorname{ctgx}$ ;  $\begin{cases} x \neq \pi n, n \in Z, \\ x \neq \operatorname{arcctg}(-2) + \pi n; \end{cases} 6 = 3\operatorname{ctgx} - \operatorname{ctg}^2 x + 6 - 2\operatorname{ctgx}$ ,

$$\operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{ctg} x = 0$$
,  $\operatorname{ctg} x(\operatorname{ctg} x - 1) = 0$ ,  $\operatorname{ctg} x = 0$  и  $\operatorname{ctg} x - 1 = 0$ ,

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$$
,  $k \in Z$ ;  $\operatorname{ctgx} = 1$ ,  $x = \frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $n \in Z$ .

Ответ:  $\frac{\pi}{2} + \pi k$ ,  $k \in Z$ ;  $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $n \in Z$ .

б)  $1 + 2 \cos 3x \cdot \cos x - \cos 2x = 0$ ,  $1 + \cos 2x + \cos 4x - \cos 2x = 0$ ,

$$\cos 4x = -1$$
,  $4x = \pi + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ ,  $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in Z$ .

Ответ:  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in Z$ .

в)  $\frac{15}{\sin x + 1} = 11 - 2 \sin x$ ;  $\sin x \neq -1$ ,  $x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $n \in Z$ ;

$$15 = 11 \sin x + 11 - 2 \sin^2 x - 2 \sin x$$
;  $\sin x = y$ ,

$$2y^2 - 9y + 4 = 0$$
,  $y_1 = 4$ ,  $y_2 = \frac{1}{2}$ ;  $\sin x = 4$  – не имеет смысла;

$$\sin x = \frac{1}{2}$$
,  $x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$ ,  $k \in Z$ . Ответ:  $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$ ,  $k \in Z$ .

г)  $\operatorname{ctgx} + \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 2$ ;  $\begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \cos x \neq -1; \end{cases}$   $\begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ x \neq \pi + 2\pi n, n \in Z; \end{cases}$

$$\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{1 + \cos x} - 2 = 0, \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x - 2 \sin x(1 + \cos x) = 0,$$

$$\cos x + 1 - 2 \sin x - 2 \sin x \cdot \cos x = 0, (\cos x + 1) - 2 \sin x(1 + \cos x) = 0,$$

$$(\cos x + 1)(1 - 2 \sin x) = 0, \cos x = -1 \text{ или } 2 \sin x = 1, x = \pi + 2\pi n, n \in Z - \text{ не удовлетворяет условиям}; \sin x = \frac{1}{2}, x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$$

**157. а)**  $\operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg} x = 0$ ;  $\begin{cases} 3x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; \end{cases}$   $\begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, n \in Z, \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; \end{cases}$

$$\frac{\sin 2x}{\cos 3x \cdot \cos x} = 0, \sin 2x = 0, 2x = \pi n, n \in Z, x = \frac{\pi n}{2}. \text{ Ответ: } x = \frac{\pi n}{2}, n \in Z.$$

б)  $\operatorname{tg} x - \sin x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}; x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = 1 - \cos x,$

$$\sin x - \cos x \cdot \sin x - \cos x + \cos^2 x = 0,$$

$$\sin x(1 - \cos x) - \cos x(1 - \cos x) = 0, (1 - \cos x)(\sin x - \cos x) = 0,$$

$$1 - \cos x = 0 \text{ и } \sin x - \cos x = 0, \cos x = 1, x = 2\pi n, n \in Z; \text{ разделим на } \cos x \neq 0,$$

$$\operatorname{tg} x - 1 = 0, \operatorname{tg} x = 1, x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z. \text{ Ответ: } 2\pi n, n \in Z; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z.$$

в)  $\sin x \cdot \operatorname{tg} x = \cos x + \operatorname{tg} x; x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; \sin x \cdot \operatorname{tg} x - \cos x - \operatorname{tg} x = 0;$

$$\frac{\sin^2 x}{\cos x} - \cos x - \frac{\sin x}{\cos x} = 0, \sin^2 x - \cos^2 x - \sin x = 0, \sin^2 x - 1 + \sin^2 x - \sin x = 0.$$

$$\sin x = y, 2y^2 - y - 1 = 0, y_1 = 1, y_2 = -\frac{1}{2}; \sin x = 1 \text{ и}$$

$$\sin x = -\frac{1}{2}; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z - \text{ не удовлетворяет условиям};$$

$$x = (-1)^k \left( -\frac{\pi}{6} \right) + \pi k, k \in Z.$$

г)  $\sin x + \sin 2x = \operatorname{tg} x, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; \sin x + 2 \sin x \cos x = \frac{\sin x}{\cos x},$

$$\sin x \cos x + 2 \sin x \cos^2 x - \sin x = 0, \sin x(\cos x + 2 \cos^2 x - 1) = 0,$$

$$\sin x = 0, x = \pi k, k \in Z;$$

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0; y = \cos x, 2y^2 + y - 1 = 0, D = 9,$$

$$y_1 = -1, y_2 = \frac{1}{2}, \cos x = -1, x_1 = \pi + 2\pi k, k \in Z, \cos x = \frac{1}{2},$$

$$x_2 = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z. \text{ Ответ: } x = \pi + 2\pi k, k \in Z; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$$

**158. a)**  $\arccos \frac{1+2x}{3} = \frac{2\pi}{3}$ ,  $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ , значит  $\frac{1+2x}{3} = -\frac{1}{2}$ ,

$$2 + 4x = -3, x = -\frac{5}{4}, x = -1 \frac{1}{4}.$$

б)  $\operatorname{arctg}(2x-1) = -\frac{\pi}{4}$ , так как  $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ , то  $2x-1 = -1, 2x = 0, x = 0$ ;

в)  $\arcsin \frac{x+2}{4} = -\frac{\pi}{3}$ ,  $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , то  $\frac{x+2}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

$$2x+4 = -4\sqrt{3}, 2x = -4\sqrt{3} - 4, x = -2\sqrt{3} - 2;$$

г)  $\operatorname{arctg}(2-3x) = \frac{3\pi}{4}$


нет решений, поскольку  $\frac{3\pi}{4} \notin \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .

**159.**

а)  $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, -\cos \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,

$$\cos \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$


Ответ:  $x \in [-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n; \frac{3\pi}{4} + 2\pi n], n \in Z$ .



б)  $\sqrt{3}\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \geq -1, \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \geq -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ;

$$-\frac{\pi}{6} + \pi n \leq \frac{\pi}{4} - x < \frac{\pi}{2} + \pi n,$$

$$-\frac{\pi}{4} - \pi n < x \leq \frac{5\pi}{12} - \pi n, n \in Z.$$



Ответ:  $x \in (-\frac{\pi}{4} - \pi n; \frac{5\pi}{12} - \pi n], n \in Z$ .


158

b)  $\sin 2x \cdot \sin \frac{x}{2} - \cos 2x \cdot \cos \frac{x}{2} > \frac{1}{2}$ ,  $-\cos(2x + \frac{x}{2}) > \frac{1}{2}$ ,

$$-\cos(2.5x) > \frac{1}{2}, \cos 2.5x < -\frac{1}{2}.$$

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi n < 2.5x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z},$$

$$\frac{4\pi}{15} + \frac{4\pi n}{5} < x < \frac{8\pi}{15} + \frac{4\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z};$$




r)  $\sin 3x \cdot \cos x + \sin x \cdot \cos 3x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

$$\sin 4x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$-\frac{4\pi}{3} + 2\pi n \leq 4x \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z},$$


$$-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi n}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}.$$



**160. a)**  $2 \sin^2 x \leq 1, \sin^2 x \leq \frac{1}{2},$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$-\frac{\pi}{4} + \pi n \leq x \leq \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$$




6)  $3 \operatorname{tg}^2 2x \leq 1, \operatorname{tg}^2 2x \leq \frac{1}{3},$

$$-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \operatorname{tg}^2 2x \leq \frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$-\frac{\pi}{6} + \pi n \leq 2x \leq \frac{\pi}{6} + \pi n,$$

$$-\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2};$$



b)  $4 \cos^2 x \leq 3$ ,  $\cos^2 x \leq \frac{3}{4}$ ,

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\frac{\pi}{6} + \pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$



г)  $\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} - 1 \geq 0$ ,  $\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} \geq 1$ ,  $\operatorname{tg} x \leq -1$  и

$$\operatorname{tg} x \geq 1. \quad \frac{\pi}{4} + \pi n \leq \frac{x}{2} < \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq x < \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$\frac{\pi}{2} + \pi n < \frac{x}{2} \leq \frac{3\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\pi + 2\pi n < x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$




Ответ:  $x \in [\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \pi + 2\pi n] \cup (\pi + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n], \quad n \in \mathbb{Z}.$

**161.**

a)  $|\cos x - 1| \leq 0,5$ ,  $-\frac{1}{2} \leq \cos x - 1 \leq \frac{1}{2}$ ,

$$0,5 \leq \cos x \leq 1,5, \quad 0,5 \leq \cos x \leq 1;$$

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$




б)  $\sin x < \cos x$ ,  $\sin x - \cos x < 0$ ,

$$\sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) < 0, \quad \sin(x - \frac{\pi}{4}) < 0;$$


$$-\pi + 2\pi n < x - \frac{\pi}{4} < 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n < x < \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$



b)  $|\sin 2x + \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq \sin 2x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ ,  
 $-1 \leq \sin 2x \leq 0$ ,  $-\pi + 2\pi n \leq 2x \leq 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  
 $-\frac{\pi}{2} + \pi n \leq x \leq \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

Ответ:  $x \in [-\frac{\pi}{2} + \pi n; \pi n]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .



c)  $\operatorname{tg}x + \operatorname{ctg}x > 0$ ,  $\operatorname{tg}x + \frac{1}{\operatorname{tg}x} > 0$ ,  $\frac{\operatorname{tg}^2 x + 1}{\operatorname{tg}x} > 0$  – при всех  $x$ ;


$\operatorname{tg}x > 0$ ,  $\pi < x < \frac{\pi}{2} + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ . Ответ:  $x \in (\pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

162. a)  $\sin x - \sqrt{3} \cos x > \sqrt{3}$ ,  $\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

$-\cos(\frac{\pi}{6} + x) > \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos(\frac{\pi}{6} + x) > -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;

$\frac{5\pi}{6} + 2\pi n < \frac{\pi}{6} + x < \frac{7\pi}{6} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,


$\frac{2\pi}{3} + 2\pi n < x < \pi + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;



б)  $\log_{0,5} \sin x > 1$ ,  $\log_{0,5} \sin x > \log_{0,5} 0,5$ ;

$y = \log_{0,5} t$  – убывает,  $\sin x < 0,5$ .

Ответ:  $x \in (-\frac{7\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .




в)  $\sin x + \cos x < 1$ ,

$\frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,

$\cos(x - \frac{\pi}{4}) < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ;

$\frac{\pi}{4} + 2\pi n < x - \frac{\pi}{4} < \frac{7\pi}{4} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$\frac{\pi}{2} + 2\pi n < x < 2\pi + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ . Ответ:  $x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .




г)

$$\log_{\sqrt{2}} \cos x > -1, \quad \log_{\sqrt{2}} \cos x > \log_{\sqrt{2}} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

$$y = \log_{\sqrt{2}} t - \text{возрастает}, \quad \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Ответ: } x \in \left(-\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{\pi}{4} + 2\pi n\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$



#### 14. Показательные уравнения и неравенства

163. а)  $(0,2)^{x^2-16x-37,5} = 5\sqrt{5}, \quad 5^{-x^2+16x+37,5} = 5\sqrt{5},$

$$-x^2 + 16x + 37,5 = 1,5, \quad x^2 - 16x - 36 = 0, \quad x_1 = 18, \quad x_2 = -2;$$

б)  $2^{x^2-3} \cdot 5^{x^2-3} = 0,01 \cdot (10^{x-1})^3, \quad 10^{x^2-3} = 10^{-2} \cdot 10^{3x-3},$

$$10^{x^2-3} = 10^{-2+3x-3}, \quad x^2 - 3 = 3x - 5, \quad x^2 - 3x + 2 = 0, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = 1;$$

в)  $2^{x^2-6x+0,5} = \frac{1}{16\sqrt{2}}, \quad 2^{x^2-6x+0,5} = 2^{-4,5}, \quad x^2 - 6x + 0,5 = -4,5,$

$$x^2 - 6x + 5 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 5;$$

г)  $\frac{6^{x^2}}{2^{-15}} = \frac{3^{-15}}{6^{12-12x}}, \quad 6^{x^2} \cdot 6^{12-12x} = 2^{-15} \cdot 3^{-15}, \quad 6^{x^2-12x+12} = 6^{-15},$

$$x^2 - 12x + 12 = -15, \quad x^2 - 12x + 27 = 0, \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 9.$$

164. а)  $5^{3x} - 2 \cdot 5^{3x-1} - 3 \cdot 5^{3x-2} = 60, \quad 5^{3x} - \frac{2}{5} \cdot 5^{3x} - \frac{3}{25} \cdot 5^{3x} = 60,$

$$5^{3x} \left(1 - \frac{2}{5} - \frac{3}{25}\right) = 60, \quad 5^{3x} \cdot \frac{12}{25} = 60, \quad 5^{3x} = 125, \quad 5^{3x} = 5^3, \quad 3x = 3, \quad x = 1;$$

б)  $4^x - 3^{x-0,5} = 3^{x-0,5} - 2^{2x-1}, \quad 4^x - \frac{3^x}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot 3^x - \frac{4^x}{2},$

$$2 \cdot \sqrt{3} \cdot 4^x - 2 \cdot 3^x = 2 \cdot 3 \cdot 3^x - 4^x \cdot \sqrt{3}, \quad 2\sqrt{3} - 2 \left(\frac{3}{4}\right)^x = 6 \left(\frac{3}{4}\right)^x - \sqrt{3},$$

$$8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^x = 3\sqrt{3}, \quad \left(\frac{3}{4}\right)^x = \left(\frac{3}{4}\right)^{1,5}, \quad x = 1,5;$$

в)  $2^{5x-1} + 2^{5x-2} + 2^{5x-3} = 896, \quad \frac{2^{5x}}{2} + \frac{2^{5x}}{4} + \frac{2^{5x}}{8} = 896, \quad 2^{5x} \cdot \frac{7}{8} = 896,$

$$2^{5x} = \frac{896 \cdot 8}{7}, \quad 2^{5x} = 1024, \quad 2^{5x} = 2^{10}, \quad x = 2;$$

$$\text{г) } 5^{2x-1} + 2^{2x} = 5^{2x} - 2^{2x+2}, \frac{5^{2x}}{5} + 2^{2x} = 5^{2x} - 4 \cdot 2^{2x},$$

$$5^{2x} + 5 \cdot 2^{2x} = 5 \cdot 5^{2x} - 20 \cdot 2^{2x}, \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} + 5 = 5 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} - 20,$$

$$4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} = 25, \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} = \left(\frac{5}{2}\right)^2, x = 1.$$

**165. а)**  $9^{x^2-1} - 36 \cdot 3^{x^2-3} + 3 = 0, \frac{9^{x^2}}{9} - \frac{36}{27} \cdot 9^{x^2} + 3 = 0,$   
 $3 \cdot 9^{x^2} - 36 \cdot 3^{x^2} + 81 = 0.$  Пусть  $3^{x^2} = y,$  тогда  $3y^2 - 36y + 81 = 0,$

$$y^2 - 12y + 27 = 0, y_1 = 3, y_2 = 9; 3^{x^2} = 3 \text{ или } 3^{x^2} = 3^2, x^2 = 1,$$

$$x^2 = 2, x_1 = 1, x_2 = -1; x_3 = \sqrt{2}, x_4 = -\sqrt{2};$$

б)  $5^{3x+1} + 34 \cdot 5^{2x} = 7 \cdot 5^x, 5 \cdot 5^{3x} + 34 \cdot 5^{2x} - 7 \cdot 5^x = 0. 5^x = y,$

$$5y^3 + 34y^2 - 7y = 0, y(5y^2 + 34y - 7) = 0, y = 0$$

$$5y^2 + 34y - 7 = 0, y = -7 \text{ и } y = \frac{1}{5}; 5^{3x} = 0 \text{ нет корней};$$

$$5^{3x} = -7 \text{ нет корней; } 5^{3x} = 5^{-1}, 3x = -1, x = -\frac{1}{3};$$

в)  $16^x - 50 \cdot 2^{2x} = 896, 4^{2x} - 50 \cdot 4^x - 896 = 0; 4^x = y,$   
 $y^2 - 50y - 896 = 0, y_1 = 64, y_2 = -14; 4^x = 64 \text{ или } 4^{2x} = -14 \text{ нет корней; } x = 3.$

г)  $7^{4\sqrt{x}} - 8 \cdot 7^{\sqrt{4x}} + 7 = 0, 7^{4\sqrt{x}} - 8 \cdot 7^{2\sqrt{x}} + 7 = 0. 7^{2\sqrt{x}} = y,$   
 $y^2 - 8y + 7 = 0, y_1 = 7, y_2 = 1; 7^{2\sqrt{x}} = 7 \text{ или } 7^{2\sqrt{x}} = 1,$   
 $2\sqrt{x} = 1, 2\sqrt{x} = 0, x_1 = \frac{1}{4}; x_2 = 0.$  Ответ: 0; 0,25.

**166. а)**  $3 \cdot 4^x + 2 \cdot 9^x = 5 \cdot 6^x, 3 \cdot 2^{2x} + 2 \cdot 3^{2x} = 5 \cdot 6^x,$  разделим обе части уравнения на  $6^x \neq 0, 3\left(\frac{2}{3}\right)^x + 2\left(\frac{3}{2}\right)^x = 5.$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = y, 3y + \frac{2}{y} - 5 = 0, 3y^2 - 5y + 2 = 0, y_1 = 1, y_2 = \frac{2}{3};$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1 \text{ или } \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{2}{3}, x_1 = 0; x_2 = 1;$$

$$6) 8^x + 18^x = 2 \cdot 27^x, \left(\frac{8}{27}\right)^x + \left(\frac{18}{27}\right)^x = 2, \left(\frac{2}{3}\right)^{3x} + \left(\frac{2}{3}\right)^x - 2 = 0.$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = y, y^3 + y - 2 = 0, y^3 - 1 + y - 1 = 0,$$

$$(y-1)(y^2 + y + 1) + (y-1) = 0, (y-1)(y^2 + y + 1 + 1) = 0,$$

$$(y-1)(y^2 + y + 2) = 0, y=1 \text{ или } y^2 + y + 2 = 0 \text{ - нет корней}; \left(\frac{2}{3}\right)^x = 1, x=0;$$

$$b) 2 \cdot 25^x - 5 \cdot 10^x + 2 \cdot 4^x = 0, 2 \cdot 5^{2x} - 5 \cdot 2^x \cdot 5^x + 2 \cdot 2^{2x} = 0,$$

$$2 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^x + 2 = 0; \quad \left(\frac{5}{2}\right)^x = y, \quad 2y^2 - 5y + 2 = 0, \quad y_1 = \frac{1}{2}; \quad \left(\frac{5}{2}\right)^x = 2$$

$$\text{или } \left(\frac{5}{2}\right)^x = \frac{1}{2}, \quad x = \log_{\frac{5}{2}} 2 \text{ или } x_1 = \log_{\frac{5}{2}} \frac{1}{2}, \quad x_2 = -\log_{\frac{5}{2}} 2;$$

$$g) 3 \cdot 16^x + 2 \cdot 81^x = 5 \cdot 36^x, \quad 3 \cdot 2^{4x} + 2 \cdot 3^{4x} = 5 \cdot 2^{2x} \cdot 3^{2x},$$

$$3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} - 5 = 0. \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = y, \quad 3y + \frac{2}{y} - 5 = 0,$$

$$3y^2 - 5y + 2 = 0, \quad y_1 = 1, \quad y_2 = \frac{2}{3}, \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = 1 \text{ или } \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = \frac{2}{3},$$

$$2x = 0, \quad x = 0; \quad 2x = 1, \quad x = 0,5.$$

$$167. a) 3^{2\sqrt{x}} + 3^{2\sqrt{x}-2} = 11, \quad 3^{2\sqrt{x}} + \frac{3^{2\sqrt{x}}}{3} - \frac{3^{2\sqrt{x}}}{9} = 11, \quad 3^{2\sqrt{x}} \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}\right) = 11,$$

$$3^{2\sqrt{x}} \cdot 1 \frac{2}{9} = 11, \quad 3^{2\sqrt{x}} = \frac{11 \cdot 9}{11}, \quad 3^{2\sqrt{x}} = 3^2, \quad 2\sqrt{x} = 2, \quad \sqrt{x} = 1, \quad x = 1;$$

$$6) 5^{\sin^2 x} - 25^{\cos x} = 0, \quad 5^{\sin^2 x} = 5^{2\cos x}, \quad \sin^2 x = 2\cos x,$$

$$1 - \cos^2 x - 2\cos x = 0; \quad \cos x = y, \quad y^2 + 2y - 1 = 0,$$

$$y_1 = -1 - \sqrt{2}, \quad y_2 = -1 + \sqrt{2}; \quad \cos x = -1 - \sqrt{2} \text{ - не имеет смысла};$$

$$\cos x = -1 + \sqrt{2}, \quad x = \pm \arccos(-1 + \sqrt{2}) + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$b) 2^{\sin^2 x} + 2^{\cos^2 x} = 3, \quad 2^{\sin^2 x} + 2^{1-\sin^2 x} = 3. ; \quad 2^{\sin^2 x} = y,$$

$$y + \frac{2}{y} - 3 = 0, \quad y^2 - 3y + 2 = 0, \quad y_1 = 1, \quad y_2 = 2; \quad 2^{\sin^2 x} = 1, \quad 2^{\sin^2 x} = 2,$$

$$\sin^2 x = 0, \quad \sin^2 x = 1, \quad x_1 = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad \sin x = 1 \text{ или } \sin x = -1,$$

$$x_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z; \quad x_3 = -\frac{\pi}{2} + 2\pi l, \quad l \in Z.$$

Ответ:  $\pi k, \quad k \in Z; \quad \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z; \quad -\frac{\pi}{2} + 2\pi l, \quad l \in Z.$

$$\Gamma) \quad 3 \cdot 9^{\frac{1}{x}} + 6^{\frac{1}{x}} = 2 \cdot 4^{\frac{1}{x}}, \quad 3 \cdot 3^{\frac{2}{x}} + 3^{\frac{1}{x}} \cdot 2^{\frac{1}{x}} - 2 \cdot 2^{\frac{2}{x}} = 0,$$

$$3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{x}} + -2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = y, \quad 3y + 1 - \frac{2}{y} = 0,$$

$$3y^2 + y - 2 = 0, \quad y_1 = -1, \quad y_2 = \frac{2}{3}; \quad \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = -1 \text{ не имеет смысла};$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1}, \quad \frac{1}{x} = -1, \quad x = -1.$$

$$\mathbf{168. a)} \quad \frac{16}{\sqrt{32}} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{3+x}, \quad \frac{2^4}{5} \geq 2^{-3-x}, \quad 2^{1,5} \geq 2^{-3-x}; \quad y = 2^t \text{ - возрастает},$$

$$1,5 \geq -3 - x, \quad x \geq -3 - 1,5, \quad x \geq -4,5. \quad \text{Ответ: } x \in [-4,5; \infty).$$

$$\mathbf{б)} \quad 3^{x^2+x} < 10^{\lg 9}, \quad 3^{x^2+x} < 9, \quad 3^{x^2+x} < 3^2; \quad y = 3^t \text{ - возрастает},$$

$$x^2 + x < 2, \quad x^2 + x - 2 < 0, \quad (x-1)(x+2) < 0, \quad x \in (-2; 1);$$

$$\mathbf{в)} \quad 3 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{2-3x} < \frac{1}{9}, \quad 3 \cdot 3^{-\frac{1}{2}(2-3x)} < 3^{-2}, \quad 3^{1-1+\frac{3}{2}x} < 3^{-2}, \quad 3^{1,5x} < 3^{-2};$$

$$y = 3^t \text{ - возрастает}, \quad 1,5x < -2, \quad x < -\frac{4}{3};$$

$$\Gamma) \quad 4^{x^2+x-11} > 5^{\log_5 4}, \quad 4^{x^2+x-11} > 4; \quad y = 4^t \text{ - возрастает},$$

$$x^2 + x - 11 > 1, \quad x^2 + x - 12 > 0, \quad (x+4)(x-3) > 0, \quad x \in (-\infty; -4) \cup (3; \infty).$$

$$\mathbf{169. а)} \quad 0,04^x - 26 \cdot 0,2^x + 25 \leq 0, \quad (0,2)^{2x} - 26 \cdot 0,2^x + 25 \leq 0;$$

$$0,2^x = y, \text{ то } y^2 - 26y + 25 \leq 0, \quad (y-25)(y-1) \leq 0, \quad 1 \leq y \leq 25;$$

$$1 \leq 0,2^x \leq 25, \quad 5^0 \leq 5^{-x} \leq 5^2; \quad y = 5^t \text{ - возрастает}, \quad 0 \leq -x \leq 2.$$

Ответ:  $x \in [-2; 0].$

$$\mathbf{б)} \quad 9^x - 84 \cdot 3^{-2x} + \frac{1}{3} > 0, \quad 3^{2x} - 84 \cdot 3^{-2x} + \frac{1}{3} > 0. \quad 3^{2x} = y,$$

$$y - \frac{84}{y} + \frac{1}{3} > 0, \quad y > 0, \quad 3y^2 + y - 252 > 0,$$

$3(y + \frac{28}{3})(y - 9) > 0$     $y < -\frac{28}{3}$  или  $y > 9$ ,  $3^{2x} < -\frac{28}{3}$  – не имеет смысла;

или  $3^{2x} > 9$ ,  $3^{2x} > 3^2$ ;  $y = 3^t$  – возрастает,  $2x > 2$ ,  $x > 1$ ;

в)  $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 < 0$ .  $2^x = y$ ,  $y > 0$ ,  $y^2 - 10y + 16 < 0$ ,  
 $(y - 2)(y - 8) < 0$ ,  $2 < y < 8$ ,  $2 < 2^x < 8$ ,  $2^1 < 2^x < 2^3$ ;  $y = 2^t$  –  
 возрастает,  $1 < x < 3$ ;

$$\text{г) } 2^{2x+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+1} - \frac{5}{2} \geq 0. \quad 2^{2x+1} = y, \quad y > 0,$$

$$y + \frac{1}{y} - \frac{5}{2} \geq 0, \quad 2y^2 - 5y + 2 \geq 0, \quad (y - 2)(y - \frac{1}{2}) \geq 0, \quad y \leq \frac{1}{2} \quad \text{или}$$

$$y \geq 2, \quad 2^{2x+1} \leq \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad 2^{2x+1} \geq 2, \quad 2^{2x+1} \leq 2^{-1}; \quad y = 2^t \text{ – возрастает},$$

$$2x+1 \leq -1, \quad 2x \leq -2, \quad x \leq -1; \quad 2x+1 \geq 1, \quad 2x \geq 0, \quad x \geq 0.$$

Ответ:  $x \in (-\infty; -1] \cup [0; \infty)$ .

**170. а)**  $x^2 \cdot 3^x - 3^{x+1} \leq 0$ ,  $3^x(x^2 - 3) \leq 0$ ,  $3^x > 0$  при всех  $x$ , значит,  
 $x^2 - 3 \leq 0$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ .      Ответ:  $x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$ .

$$\text{б) } 3,7^{\frac{x^2+2x-15}{x-4}} > 1; \quad y = 3,7^t \text{ – возрастает}, \quad \frac{x^2+2x-15}{x-4} > 0,$$

$$\frac{(x+5)(x-3)}{x-4} > 0, \quad (x+5)(x-3)(x-4) > 0. \quad \text{Ответ: } x \in (-5; 3) \cup (4; \infty).$$

в)  $x^2 \cdot 5^x - 5^{2+x} < 0$ ,  $5^x(x^2 - 25) < 0$ ,  $5^x > 0$  при любых  $x$ , значит,  
 $x^2 - 25 < 0$ ,  $-5 < x < 5$ ;

г)  $2^{x+2} - 2^{x+3} - 2^{x+4} > 5^{x+1}$ ,  $4 \cdot 2^x - 8 \cdot 2^x - 16 \cdot 2^x > 5 \cdot 5^x - 25 \cdot 5^x$ ,  
 $-25 \cdot 5^x$ ,  $-20 \cdot 2^x > -20 \cdot 5^x$ ,  $2^x < 5^x$ , разделим обе части неравенства  
 на  $5^x > 0$ .  $\left(\frac{2}{5}\right)^x < 1$ ;  $y = \left(\frac{2}{5}\right)^t$  – убывает,  $x \geq 0$ .

## 15. Логарифмические уравнения и неравенства

**171. а)**  $\log_3^2 x = 4 - 3 \log_3 x$ ,  $x > 0$ ;  $\log_3 x = y$ ,  
 $y^2 + 3y - 4 = 0$ ,  $y_1 = -4$ ,  $y_2 = 1$ ;  $\log_3 x = -4$  или  $\log_3 x = 1$ ;  
 $x_1 = \frac{1}{81}$ ,  $x_2 = 3$ ;

$$6) \frac{1}{2} \lg(2x-1) = 1 - \lg \sqrt{x-9}; \quad \begin{cases} 2x-1 > 0, \\ x-9 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > \frac{1}{2}, \\ x > 9; \end{cases} \\ \frac{1}{2} \lg(2x-1) + \frac{1}{2} \lg(x-9) = 1, \quad \frac{1}{2} \lg(2x-1)(x-9) = 1, \quad \lg(2x-10)(x-9) = 2, \\ (2x-10)(x-9) = 100, \quad 2x^2 - 18x - 10x + 90 - 100 = 0, \\ 2x^2 - 28x - 10 = 0, \quad x^2 - 14x - 5 = 0, \quad x_1 = 7 + 3\sqrt{6}, \quad x_2 = 7 - 3\sqrt{6} - \text{не} \\ \text{удовлетворяет ОДЗ.} \quad \text{Ответ: } 7 + 3\sqrt{6}.$$

$$b) \log_3 \sqrt{x-5} + \log_3 \sqrt{2x-3} = 1; \quad \begin{cases} x-5 > 0, \\ 2x-3 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 5, \\ x > \frac{3}{2}; \end{cases} \\ \frac{1}{2} \log_3(x-5) + \frac{1}{2} \log_3(2x-3) = 1, \quad \frac{1}{2} \log_3(x-5)(2x-3) = 1, \\ \log_3(x-5)(2x-3) = 2, \quad (x-5)(2x-3) = 9, \quad 2x^2 - 3x - 10x + 15 - 9 = 0, \\ 2x^2 - 13x + 6 = 0, \quad x_1 = 6, \quad x_2 = \frac{1}{2} - \text{не удовлетворяет ОДЗ.}$$

$$r) 3\lg^2(x-1) - 10\lg(x-1) + 3 = 0; \quad x > 1. \quad \lg(x-1) = y, \\ 3y^2 - 10y + 3 = 0, \quad y_1 = 3, \quad y_2 = \frac{1}{3}; \quad \lg(x-1) = 3 \quad \text{или} \quad \lg(x-1) = \frac{1}{3},$$

$$x-1 = 1000, \quad x = 1001; \quad x-1 = \sqrt[3]{10}, \quad x = 1 + \sqrt[3]{10}.$$

Ответ:  $1 + \sqrt[3]{10}; 1001$ .

$$172. a) 2 \log_5(\lg x) = \log_5(10 - 9 \lg x), \quad x > 0, \quad \lg x > 0, \quad 10 - 9 \lg x > 0, \quad \text{т.е.}$$

$$x > 1, \quad \lg x < \frac{10}{9}; \quad \log_5(\lg x)^2 = \log_5(10 - 9 \lg x), \quad (\lg x)^2 = 10 - 9 \lg x.$$

$\lg x = y, \quad y^2 + 9y - 10 = 0, \quad y = -10 \quad \text{или} \quad y = 1; \quad \lg x = -10, \quad x = 10^{-10} - \text{не} \\ \text{удовлетворяет условиям; } \lg x = 1, \quad x = 10.$

$$6) \lg(3^x + x - 17) = x \lg 30 - x, \quad \lg(3^x + x - 17) = \lg 30^x - x,$$

$$\lg(3^x + x - 17) - \lg 30^x = -x, \quad \lg \frac{3^x + x - 17}{30^x} = \lg 10^{-x},$$

$$\frac{3^x + x - 17}{30^x} = \frac{1}{10^x}, \quad 3^x + x - 17 = 3^x, \quad x - 17 = 0, \quad x = 17.$$

$$b) 2 \lg(\lg x) = \lg(3 - 2 \lg x); \quad \begin{cases} \lg x > 0, \\ 3 - 2 \lg x > 0, \\ x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1, \\ x > 0, \\ \lg x < \frac{3}{2}; \end{cases}$$

$$\lg(\lg x)^2 = \lg(3 - 2\lg x), \quad (\lg x)^2 = 3 - 2\lg x \cdot \lg x = -3 \text{ или}$$

$\lg x = 1, x_1 = 0,001$  – не удовлетворяет ОДЗ;  $x_2 = 10$ .

$$\text{г) } x - x \lg 5 = \lg(2^x + x - 3), \quad x - \lg 5^x = \lg(2^x + x - 3),$$

$$x = \lg(2^x + x - 3) + \lg 5^x, \quad \lg 10^x = \lg((2^x + x - 3) \cdot 5^x),$$

$$10^x = (2^x + x - 3) 5^x, \quad 10^x = 10^x + x \cdot 5^x - 3 \cdot 5^x, \quad x \cdot 5^x - 3 \cdot 5^x = 0, \quad 5^x(x-3)=0, \quad 5^x>0, \quad x=3.$$

$$\text{173. а) } \log_2 x + \frac{4}{\log_x 2} = 5, \quad x \neq 1, \quad x > 0, \quad \log_2 x + 4 \log_2 x = 5, \quad 5 \log_2 x = 5,$$

$$\log_2 x = 1, \quad x = 2.$$

$$\text{б) } \log_3 x + \log_{\sqrt[3]{x}} x - \log_{\frac{1}{3}} x = 6, \quad x \neq 1, \quad x > 0, \quad \log_3 x + 2 + \log_3 x = 6,$$

$$2 \log_3 x = 4, \quad \log_3 x = 2, \quad x = 9.$$

$$\text{в) } 2 \log_{\sqrt{3}} x + \log_x \frac{1}{3} = 3, \quad x \neq 1, \quad x > 0, \quad 4 \log_3 x + \frac{1}{\log_{\frac{1}{3}} x} = 3,$$

$$4 \log_3 x - \frac{1}{\log_3 x} = 3. \quad \log_3 x = y, \quad 4y - \frac{1}{y} - 3 = 0,$$

$$4y^2 - 3y - 1 = 0, \quad y_1 = 1, \quad y_2 = -\frac{1}{4}; \quad \log_3 x = 1 \text{ или } \log_3 x = -\frac{1}{4},$$

$$x = 3; \quad x = 3^{-\frac{1}{4}}, \quad x = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}. \quad \text{Ответ: } 3; \quad \frac{1}{\sqrt[4]{3}}.$$

$$\text{г) } \log_{\sqrt{2}} x + 4 \log_{x^2} x + \log_8 x = 16, \quad 2 \log_2 x + 2 + \frac{1}{3} \log_2 x = 16, \quad x \neq 1,$$

$$x > 0, \quad 2 \cdot \frac{1}{3} \log_2 x = 14, \quad \log_2 x = \frac{14 \cdot 3}{7}, \quad \log_2 x = 6, \quad x = 2^6, \quad x = 64.$$

**174.** а)  $x^{\log_2 x - 2} = 8, \quad x > 0, \quad x \neq 1$ . Прологарифмируем обе части уравнения по основанию 2:  $(\log_2 x - 2) \log_2 x = \log_2 8$ ,

$$\log_2^2 x - 2 \log_2 x = 3. \quad \log_2 x = y, \quad y^2 - 2y - 3 = 0,$$

$$y_1 = 3, \quad y_2 = -1; \quad \log_2 x = 3 \text{ или } \log_3 x = -1, \quad x = 8; \quad x = \frac{1}{3}.$$

$$\text{б) } x^{\log_5 x} = 125x^2, \quad x > 0, \quad x \neq 1. \quad \log_5 x \cdot \log_5 x = \log_5 125 + 2 \log_5 x,$$

$$\log_5^2 x - 2 \log_5 x - \log_5 125 = 0. \quad \log_5 x = y, \quad y^2 - 2y - 3 = 0, \quad y_1 = 3,$$

$$y_2 = -1; \quad \log_5 x = 3 \text{ или } \log_5 x = -1, \quad x = 125; \quad x = \frac{1}{5}.$$

в)  $x^{\lg x} = 10000, \quad x > 0;$

$$\lg x \lg x = \lg 10000, \quad \lg^2 x = 4, \quad \lg x = 2 \text{ или } \lg x = -2, \quad x_1 = 100, \quad x_2 = \frac{1}{100};$$

$$\text{г) } x^{\log_3 x - 3} = \frac{1}{9}, \quad x > 0, \quad x \neq 1. \quad (\log_3 x - 3) \log_3 x = \log_3 \frac{1}{9}; \quad \log_3^2 x - 3 \log_3 x = -2.$$

Пусть  $\log_3 x = 1$  или  $\log_3 x = 2, \quad x_1 = 3; \quad x_2 = 9.$

**175. а)**  $3\log_2^2 \sin x + \log_2(1 - \cos 2x) = 2; \quad 3\log_2^2 \sin x + \log_2(2\sin^2 x) = 2,$

$$3\log_2^2 \sin x + \log_2 2 + 2\log_2 \sin x = 2; \quad \log_2 \sin x = y,$$

$$3y^2 + 2y - 1 = 0, \quad y_1 = -1, \quad y_2 = \frac{1}{3}, \quad \log_2 \sin x = -1 \text{ или } \log_2 \sin x = \frac{1}{3},$$

$$\sin x = \frac{1}{2}, \quad \sin x = \sqrt[3]{2} - \text{не имеет смысла}; \quad x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z;$$

б)  $\log_{0,1} \sin 2x + \lg \cos x = \lg 7; \quad -\lg \sin 2x + \lg \cos x = \lg 7,$

$$\lg \frac{\cos x}{\sin 2x} = \lg 7, \quad \frac{\cos x}{\sin 2x} = 7, \quad \cos x - 7\sin 2x = 0, \quad \cos x(1 - 14\sin x) = 0,$$

$$\cos x = 0 - \text{не удовлетворяет условию}, \quad \sin x = \frac{1}{14},$$

$$x = (-1)^n \arcsin \frac{1}{14} + \pi n, \quad n \in Z. \quad \text{Ответ: } (-1)^n \arcsin \frac{1}{14} + \pi n, \quad n \in Z.$$

в)  $\log_7 5^{\sqrt{x+2}} = (x-4) \log_7 5; \quad \begin{cases} x+2 \geq 0, \\ x-4 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq -2, \\ x \geq 4; \end{cases} \quad x \geq 4;$

$$\log_7 5^{\sqrt{x+2}} = \log_7 5^{x-4}, \quad 5^{\sqrt{x+2}} = 5^{x-4}, \quad \sqrt{x+2} = x-4,$$

$$x+2 = x^2 - 8x + 16, \quad x^2 - 9x + 14 = 0, \quad x_1 = 2 - \text{не удовлетворяет условию}, \quad x_2 = 7;$$

г)  $\lg(3 \cdot 5^x + 24 \cdot 20^x) = x + \lg 18, \quad \lg(3 \cdot 5^x + 24 \cdot 20^x) = \lg 10^x \cdot 18,$

$$3 \cdot 5^x + 24 \cdot 20^x - 10^x \cdot 18 = 0, \quad 5^x(3 + 24 \cdot 4^x - 18 \cdot 2^x) = 0. \quad 5^x \neq 0,$$

$$24 \cdot 2^{2x} - 18 \cdot 2^x + 3 = 0. \quad 2^x = y, \quad 24y^2 - 18y + 3 = 0,$$

$$8y^2 - 6y + 1 = 0, \quad y_1 = \frac{1}{2}; \quad y_2 = \frac{1}{4}; \quad 2^x = \frac{1}{2} \text{ или } 2^x = \frac{1}{4}, \quad x_1 = -1; \quad x_2 = -2.$$

**176. а)**  $\log_2(x^2 - x - 4) < 3; \quad x^2 - x - 4 > 0, \quad x < \frac{1-\sqrt{17}}{2} \text{ или } x > \frac{1+\sqrt{17}}{2};$

$$\log_2(x^2 - x - 4) < \log_2 8; \quad y = \log_2 t - \text{возрастает}, \quad x^2 - x - 4 < 8,$$

$$x^2 - x - 12 < 0, \quad (x-4)(x+3) < 0, \quad -3 < x < 4. \quad \text{Ответ: } x \in (-3; \frac{1-\sqrt{17}}{2}) \cup (\frac{1+\sqrt{17}}{2}; 4).$$

6)  $\log_{\sqrt{3}-1}(5-2x) > 2$ ;  $5-2x > 0, x < 2,5$ ;  $\log_{\sqrt{3}-1}(5-2x) > \log_{\sqrt{3}-1}(\sqrt{3}-1)^2$ ;

$y = \log_{\sqrt{3}-1} t$  — убывает,  $5-2x < (\sqrt{3}-1)^2$ ,

$5-2x < 3-2\sqrt{3}+1, -2x < -1-2\sqrt{3}, x > 0,5+\sqrt{3}$ . Ответ:  $x \in (0,5+\sqrt{3}; 2,5)$ .

в)  $\lg(x^2-x+8) \geq 1$ ;  $x^2-x+8 > 0$  при любых  $x$ ;

$\lg(x^2-x+8) \geq \lg 10$ ;  $y = \lg t$  — возрастает,  $x^2-x+8 \geq 10$ ,

$(x-2)(x+1) \geq 0, x \leq -1$  или  $x \geq 2$ . Ответ:  $x \in (-\infty; -1] \cup [2; \infty)$ .

г)  $\log_{\sqrt{7}-1}(3-2x) < 2$ ;  $3-2x > 0; x < 1,5$ ;  $\log_{\sqrt{7}-1}(3-2x) <$

$< \log_{\sqrt{7}-1}(\sqrt{7}-1)^2$ ;  $y = \log_{\sqrt{7}-1} t$  — возрастает,  $3-2x < (\sqrt{7}-1)^2$ ,

$3-2x < 7-2\sqrt{7}+1, -2x < 8-2\sqrt{7}-3, 2x > 2\sqrt{7}-5$ ,

$x > \sqrt{7}-2,5$ . Ответ:  $x \in (\sqrt{7}-2,5; 1,5)$ .

177. а)  $2\log_2 x < 2 + \log_2(x+3)$ ;  $\begin{cases} x > 0, \\ x+3 > 0; \end{cases} x > 0$ ;  $2\log_2 x < \log_2 4 + \log_2(x+3)$ ,

$\log_2 x^2 < \log_2 4(x+3)$ ;  $y = \log_2 t$  — возрастает;  $x^2 < 4x+12$ ,

$(x-6)(x+2) < 0, -2 < x < 6$ . Ответ:  $(-2; 6)$ .


б)  $\log_{\frac{1}{6}}(10-x) + \log_{\frac{1}{6}}(x-3) \geq -1$ ;  $\begin{cases} 10-x > 0, \\ x-3 > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 10, \\ x > 3; \end{cases}$

$3 < x < 10$ ;  $\log_{\frac{1}{6}}(10-x)(x-3) \geq \log_{\frac{1}{6}}6$ ;  $y = \log_{\frac{1}{6}}t$  — убывает,

$(10-x)(x-3) \leq 6, 10x-30-x^2+3x-6 \leq 0, -x^2+13x-36 \leq 0$ ,  
 $(x-9)(x-4) \geq 0, x \leq 4$  или  $x \geq 9$ . Ответ:  $x \in (3; 4] \cup [9; 10)$ .

в)  $\log_{\frac{1}{3}}(x-2) + \log_{\frac{1}{3}}(12-x) \geq -2$ ;

$$\begin{cases} x > 2, \\ x < 12; \end{cases} 2 < x < 12$$



$\log_{\frac{1}{3}}(x-2)(12-x) \geq \log_{\frac{1}{3}}9$ ;  $y = \log_{\frac{1}{3}}t$  — убывает,


$(x-2)(12-x) \leq 9, 12x-x^2-24+2x-9 \leq 0, x^2-14x+33 \geq 0$ ,

$(x-3)(x-11) \geq 0, x \leq 3$  или  $x \geq 11$ .

Ответ:  $x \in (2; 3] \cup [11; 12)$ .

г)  $\log_{0,5}(4-x) \geq \log_{0,5}2 - \log_{0,5}(x-1)$ ;

$$\begin{cases} 4-x > 0, \\ x-1 > 0; \end{cases} 1 < x < 4$$



$$\log_{0,5}(4-x) + \log_{0,5}(x-1) \geq \log_{0,5}(4-x)(x-1) \geq \log_{0,5} 2 ;$$

$y = \log_{0,5} t$  — убывает,  $(4-x)(x-1) \leq 2$ ,  $4x - 4 - x^2 + x - 2 \leq 0$ ,


 $-x^2 + 5x - 6 \leq 0$ ,  $(x-3)(x-2) \geq 0$ ,  $x \leq 2$  или  $x \geq 3$ .

Ответ:  $x \in (1; 2] \cup [3; 4]$ .

178. а)  $\lg(x^2 + x - 6) - \lg(x + 3) \leq \lg 3$ ;

$$\begin{cases} x^2 + x - 6 > 0, \\ x + 3 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -3, \\ x > -3; \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x > 2, \\ x > 2; \end{cases}$$

$$\lg \frac{(x^2 + x - 6)}{x + 3} \leq \lg 3 ;$$



$y = \lg t$  — возрастает;


$$\frac{x^2 + x - 6}{x + 3} \leq 3, \quad \frac{x^2 + x - 6 - 3x - 9}{x + 3} \leq 0, \quad \frac{x^2 - 2x - 15}{x + 3} \leq 0,$$

$$\frac{(x-5)(x+3)}{x+3} \leq 0, \quad (x-5)(x+3)^2 \leq 0, \quad x \neq -3, \quad x \leq 5. \quad \text{Ответ: } (2; 5].$$

б)  $\log_2 \frac{3x-1}{2-x} < 1$ ;  $\frac{3x-1}{2-x} > 0$ ,  $\frac{1}{3} < x < 2$ ;  $\log_2 \frac{3x-1}{2-x} < \log_2 2$ ;  $\frac{3x-1}{2-x} < 2$ ,

$$\frac{3x-1-4+2x}{2-x} < 0, \quad \frac{5x-5}{2-x} < 0, \quad 5(x-1)(2-x) < 0, \quad x < 1 \text{ или } x > 2.$$

Ответ:  $x \in (\frac{1}{3}; 1)$ .



в)  $\ln(x^2 + 3x - 10) - \ln(x-2) \geq \ln 4$ ;


$$\begin{cases} x^2 + 3x - 10 > 0, \\ x-2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-2)(x+5) > 0, \\ x > 2; \end{cases} \quad x > 2;$$



$y = \ln t$  — возрастает,

$$\frac{x^2 + 3x - 10}{x-2} \geq 4, \quad \frac{x^2 + 3x - 10 - 4x + 8}{(x-2)} \geq 0, \quad \frac{x^2 - x - 2}{(x-2)} \geq 0,$$

$$\frac{(x+1)(x-2)}{(x-2)} \geq 0,$$



$$(x+1)(x-2)^2 \geq 0, \quad x \neq 2, \quad x > -1, \quad x \neq 2. \quad \text{Ответ: } x \in (2; \infty).$$

г)  $\log_3 \frac{3x-5}{x+1} \leq 1$ ;  $\frac{3x-5}{x+1} > 0$ ,  $(3x-5)(x+1) > 0$ ,  $x \in (-\infty; -1) \cup (\frac{5}{3}; \infty)$ ;

$$\log_3 \frac{3x-5}{x+1} \leq \log_3 3; \quad \frac{3x-5}{x+1} \leq 3, \quad \frac{3x-5-3x-3}{x+1} \leq 0, \quad x+1 > 0, \quad x > -1.$$

Ответ:  $x \in (\frac{5}{3}; \infty)$ .



**179. а)**  $\log_2(4^x - 5 \cdot 2^x + 8) > 2$ ;  $4^x - 5 \cdot 2^x + 8 > 0$  при любых  $x$ ;

$$\log_2(4^x - 5 \cdot 2^x + 8) > \log_2 4; 4^x - 5 \cdot 2^x + 8 > 4, 4^x - 5 \cdot 2^x + 4 > 0. 2^x = y, y^2 - 5y + 4 > 0, (y-1)(y-4) > 0, y < 1 \text{ или } y > 4, 2^x < 1, 2^x > 4,$$

$x < 0; x > 2$ . Ответ:  $x \in (-\infty; 0) \cup (2; \infty)$ .

б)  $\log_{0,5}^2 x + 6 \geq 5 \log_{0,5} x, x > 0$ .  $\log_{0,5} x = y$ ,

$$y^2 - 5y + 6 \geq 0, (y-2)(y-3) \geq 0, y \leq 2 \text{ или } y \geq 3; \log_{0,5} x \leq 2 \text{ или}$$

$$\log_{0,5} x \geq 3; y = \log_{0,5} t - \text{убывает}, x \geq 0,25, x \leq 0,125.$$


Ответ:  $x \in (0; 0,125] \cup [0,25; \infty)$ .

в)  $\lg^2 x \geq \lg x + 2, x > 0$ .  $\lg x = y, y^2 - y - 2 \geq 0, (y+1)(y-2) \geq 0$ ,

$$y \leq -1 \text{ или } y \geq 2; \lg x \leq -1 \text{ или } \lg x \geq 2; x \leq \frac{1}{10}, x \geq 100.$$

г)  $\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} (6^{x+1} - 36^x) \geq -2; 6^{x+1} - 36^x > 0, x < 1$ ;

$$\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} (6^{x+1} - 36^x) \geq \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} 5; y = \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} t - \text{убывает},$$



$$6^{x+1} - 36^x \leq \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{-2}, 6^{x+1} - 36^x \leq 5, -6^{2x} + 6 \cdot 6^x - 5 \leq 0.$$

$$6^x = y, y^2 - 6y + 5 \geq 0, (y-5)(y-1) \geq 0, y \leq 1 \text{ или}$$

$$y \geq 5; 6^x \leq 1 \text{ или } 6^x \geq 5, x \leq 0, x \geq \log_6 5.$$

Ответ:  $x \in (-\infty; 0] \cup [\log_6 5; 1)$ .

## 16. Системы рациональных уравнений и неравенств

**180. а)**  $\begin{cases} 2x+3y=-1, \\ 5x+4y=1; \end{cases} \begin{cases} -8x-12y=4, \\ 15x+12y=3; \end{cases} 7x=7, x=1; 2+3y=-1, y=-1$ .

б)  $\begin{cases} 3x-9y=12, \\ 4x-12y=16; \end{cases} \begin{cases} x-3y=4, \\ x-3y=4. \end{cases}$

$x$  и  $y$  – произвольные, бесконечное множество решений.

в)  $\begin{cases} x+2y=7, \\ 2x-3y=5; \end{cases}$   $\begin{cases} -2x-4y=-14 \\ 2x-3y=5; \end{cases} -7y=-9, y=\frac{9}{7}; x+\frac{18}{7}=7,$   
 $x=4\frac{3}{7}.$  Ответ:  $(4\frac{3}{7}; 1\frac{2}{7})$ .

г)  $\begin{cases} 5x-8y=0, \\ x-1,6y=1; \end{cases}$   $\begin{cases} 5(1+1,6y)-8y=0, \\ x=1+1,6y; \end{cases} 5+8y-8y=0, 5\neq 0.$   
 не имеет решений.

**181. а)**  $\begin{cases} \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{13}{6}, \\ x+y=5; \end{cases}$   $\begin{cases} \frac{y}{5-y} + \frac{5-y}{y} = \frac{13}{6}, \\ x=5-y, \end{cases} x\neq 0, y\neq 0,$   
 $\frac{6y^2 + (5-y)^2 \cdot 6 - 13y(5-y)}{y(5-y)\cdot 6} = 0, \frac{25y^2 - 125y + 150}{y(5-y)} = 0,$   
 $y^2 - 5y + 6 = 0, y\neq 0, y\neq 5;$   
 $y(5-y)\neq 0; y_1=2; y_2=3; x_1=3; x_2=2.$  Ответ:  $(3; 2); (2; 3).$   
**б)**  $\begin{cases} x-y=1, \\ x^3-y^3=7; \end{cases}$   $\begin{cases} x-y=1, \\ (x-y)(x^2+xy+y^2)=7; \end{cases}$   $\begin{cases} x-y=1, \\ x^2+xy+y^2=7; \end{cases}$   
 $\begin{cases} x=1+y, \\ (1+y)^2+(1+y)y+y^2=7; \end{cases} 1+2y+y^2+y+y^2+y^2-7=0,$   
 $y^2+y-2=0, (y-1)(y+2)=0, y_1=1, y_2=-2;$   
 $x_1=2, x_2=-1.$  Ответ:  $(2; 1); (-1; -2).$

**в)**  $\begin{cases} \frac{y}{x}=2, \\ (x-1)^2+y^2=1; \end{cases} x\neq 0,$   $\begin{cases} y=2x, \\ (x-1)^2+4x^2=1; \end{cases}$   
 $x^2-2x+1+4x^2-1=0, 5x^2-2x=0, x(5x-2)=0,$   
 $x_1=0 - \text{не удовлетворяет условию} x_2=0,4$   $y=0,8.$  Ответ:  $(0,4; 0,8).$

**г)**  $\begin{cases} x^3+y^3=35, \\ x+y=5; \end{cases}$   $\begin{cases} 5(x^2-xy+y^2)=35, \\ x=5-y; \end{cases}$   
 $(5-y)^2-(5-y)y+y^2=7, 25-10y+y^2-5y+y^2+y^2=7,$   
 $3y^2-15y+18=0, y^2-5y+6=0, y_1=2, y_2=3; x_1=3, x_2=2.$

Ответ:  $(3; 2); (2; 3).$

**182. а)**  $\begin{cases} (x-y)(x^2-y^2)=45, \\ x+y=5; \end{cases}$   $\begin{cases} (x-y)(x-y)(x+y)=45, \\ x+y=5; \end{cases}$   
 $5(x-y)^2=45, (x-y)^2=9, \begin{cases} x-y=3, \\ x+y=5 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x-y=-3, \\ x+y=5; \end{cases}$   
 $2x=8, x_1=4, y_1=1; 2x=2, x_2=1, y_2=4.$  Ответ:  $(4; 1); (1; 4).$

$$6) \begin{cases} x^2y^3 + x^3y^2 = 12, \\ x^2y^3 - x^3y^2 = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2y^2(y+x) = 12, \\ x^2y^2(y-x) = 4; \end{cases} \quad x \neq 0 \text{ и } y \neq 0. \text{ Разделим первое}$$

уравнение на второе.  $\frac{y+x}{y-x} = 3, \quad y+x = 3y-3x, \quad y = 2x;$

$$x^2 \cdot 8x^3 + x^3 \cdot 4x^2 = 12, \quad 8x^5 + 4x^5 = 12, \quad 12x^5 = 12, \quad x = 1, \quad y = 2.$$

$$\text{в)} \begin{cases} x^2y^3 = 16, \\ x^3y^2 = 2; \end{cases} \quad x \neq 0, \quad y \neq 0.$$

$$\frac{y}{x} = 8, \quad y = 8x; \quad x^2 \cdot (8x)^3 = 16, \quad 2^9 \cdot x^5 = 2^4, \quad x^5 = \frac{1}{32}, \quad x = \frac{1}{2}, \quad y = 4.$$

$$\text{г)} \begin{cases} x^2 - xy = 28, \\ y^2 - xy = -12; \end{cases} \quad (x-y)^2 = 16, \quad x-y = 4 \text{ или } x-y = -4,$$

$$x = 4+y \text{ или } x = -4+y, \quad (4+y)^2 - (4+y) \cdot y = 28 \text{ или}$$

$$(-4+y)^2 - (-4+y)y = 28, \quad 16+8y+y^2 - 4y - y^2 = 28, \quad 4y = 12,$$

$$y = 3, \quad x = 7; \quad -4y = 12, \quad y = -3, \quad x = -7. \text{ Ответ: } (7; 3); (-7; -3).$$

$$\text{183. а)} \begin{cases} x^3 + y^3 = 7, \\ x^3 \cdot y^3 = -8; \end{cases} \quad \begin{cases} x^3 = 7 - y^3, \\ (7 - y^3)y^3 = -8; \end{cases} \quad 7y^3 - y^6 + 8 = 0,$$

$$y^6 - 7y^3 - 8 = 0. \quad y^3 = z, \quad z^2 - 7z - 8 = 0,$$

$$z_1 = 8, \quad z_2 = -1; \quad y^3 = 8 \text{ или } y^3 = -1, \quad y_1 = 2, \quad y_2 = -1;$$

$$x_1^3 = 7 - 8, \quad x_2^3 = 7 + 1, \quad x_1 = -1; \quad x_2 = 2. \quad \text{Ответ: } (-1; 2); (2; -1).$$

$$6) \begin{cases} x^2 + y^4 = 5, \\ xy^2 = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{4}{y^4} + y^4 = 5, \\ x = \frac{2}{y^2}, \\ y \neq 0; \end{cases} \quad 4 + y^8 - 5y^4 = 0. \quad y^4 = z,$$

$$z^2 - 5z + 4 = 0, \quad z_1 = 4, \quad z_2 = 1; \quad y^4 = 4, \quad y^4 = 1, \quad y_1 = \sqrt{2},$$

$$y_2 = -\sqrt{2}, \quad y_3 = 1, \quad y_4 = -1; \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = 2.$$

Ответ:  $(1; \sqrt{2}); (1; -\sqrt{2}); (2; 1); (2; -1)$ .

$$\text{в)} \begin{cases} x^3 + y^3 = 9, \\ xy = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{8}{y^3} + y^3 = 9, \\ x = \frac{2}{y}, \\ y \neq 0; \end{cases} \quad 8 + y^6 - 9y^3 = 0. \quad y^3 = z,$$

$$z^2 - 9z + 8 = 0, \quad z_1 = 8, \quad z_2 = 1; \quad y_1^3 = 8, \quad y_2^3 = 1, \quad y_1 = 2, \quad y_2 = 1;$$

Ответ: (1; 2); (2; 1).

г)  $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5, \\ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 13; \end{cases}$   $\begin{cases} \frac{1}{x} = 5 - \frac{1}{y}, \\ \left(5 - \frac{1}{y}\right)^2 + \frac{1}{y^2} = 13, \\ x \neq 0, y \neq 0; \end{cases}$

$$\frac{2}{y^2} - \frac{10}{y} + 12 = 0; \quad \frac{1}{y} = z,$$

$$z^2 - 5z + 6 = 0, \quad z_1 = 2, \quad z_2 = 3; \quad y_1 = \frac{1}{2}, \quad y_2 = \frac{1}{3}, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{1}{3}.$$

Ответ:  $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$ ;  $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\right)$ .

**184.** а)  $\begin{cases} x - 5y = 7, \\ ax - y = -3; \end{cases}$   $\begin{cases} x - 5y = 7, \\ -5ax + 5y = 15; \end{cases}$   $x - 5ax = 22, \quad x(1 - 5a) = 22;$

при  $a \neq \frac{1}{5} - 1$  решение; при  $a = \frac{1}{5} -$  нет решений;

б)  $\begin{cases} x + 2y = a, \\ 2x + 4y = 5; \end{cases}$  если  $a = 2,5 -$  бесконечное множество решений;

если  $a \neq 2,5 -$  нет решений;

в)  $\begin{cases} x + ay = 2, \\ 3x - 2y = -6; \end{cases}$   $\begin{cases} -3x - 3ay = -6, \\ 3x - 2y = -6; \end{cases}$   $-3ay - 2y = 0, \quad y(3a + 2) = 12;$

если  $a = -\frac{2}{3} -$  бесконечное множество решений; если  $a \neq -\frac{2}{3} -$  одно решение;

г)  $\begin{cases} x - y = 2, \\ 2x - 2y = 2a; \end{cases}$  при  $a = 2 -$  бесконечно много решений;

при  $a \neq 2 -$  нет решений.

**185.**

а)  $\begin{cases} 2x > 3 - \frac{13x - 2}{11}, \\ \frac{x}{6} + \frac{2}{3}(x - 7) < \frac{3x - 20}{9}; \end{cases}$   $\begin{cases} 22x > 33 - 13x + 2, \\ 3x + 12(x - 7) < 2(3x - 20); \end{cases}$

$$\begin{cases} 35x > 35, \\ 9x < 44; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1, \\ x < \frac{44}{9}. \end{cases}$$

Ответ:  $x \in (1; 4\frac{8}{9})$ .



$$5) \begin{cases} x - \frac{x+1}{2} - \frac{x+4}{3} \leq \frac{x-1}{4} - 2, \\ 1,5x - 2,5 < x; \end{cases} \quad \begin{cases} 12x - 6(x+1) - 4(x+4) \leq 3(x-1) - 24, \\ 1,5x - x < 2,5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12x - 6x - 6 - 4x - 16 \leq 3x - 3 - 24, \\ 0,5x < 2,5; \end{cases} \quad \begin{cases} -x \leq -5, \\ x < 5; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 5, \\ x < 5. \end{cases}$$

Ответ: нет решений.

b)  $\begin{cases} \frac{x+1}{2} - \frac{x}{3} \geq \frac{x-1}{4} - x - 2, \\ 0,5x < 2-x; \end{cases} \quad \begin{cases} 6(x+1) - 4x \geq 3(x-1) - 12x - 24, \\ 0,5x + x < 2; \end{cases}$

$$\begin{cases} 6x + 6 - 4x \geq 3x - 3 - 12x - 24, \\ 1,5x < 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 11x \geq -33, \\ x < \frac{20}{15}; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq -3, \\ x < \frac{4}{3}. \end{cases}$$

Ответ:  $x \in [-3; 1\frac{1}{3})$ .

$$\text{r) } \begin{cases} 2(3x-1) < 3(4x+1)+16, \\ 4(2+x) < 3x+8; \end{cases} \quad \begin{cases} 6x-2 < 12x+3+16, \\ 8+4x < 3x+8; \end{cases} \quad \begin{cases} -6x < 21, \\ x < 0; \end{cases}$$

$\begin{cases} x > -3,5, \\ x < 0. \end{cases}$       Ответ:  $x \in (-3,5; 0).$

## 17. Системы иррациональных уравнений

$$186. \text{ a) } \begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 4, \\ 2\sqrt{x} + 3\sqrt{y} = 18; \end{cases} \quad \begin{cases} -2\sqrt{x} + 2\sqrt{y} = -8, \\ 2\sqrt{x} + 3\sqrt{y} = 18. \end{cases} \quad 5\sqrt{y} = 10, \quad \sqrt{y} = 2, \quad y = 4,$$

$$\sqrt{x} - 2 = 4, \quad \sqrt{x} = 6, \quad x = 36. \quad \text{Ответ: } (36; 4).$$

$$6) \quad \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 15; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x} = 8 - \sqrt{y}, \\ (8 - \sqrt{y})\sqrt{y} = 15; \end{cases} \quad 8\sqrt{y} - y - 15 = 0.$$

$$\sqrt{y} = z, \quad z^2 - 8z + 15 = 0, \quad z_1 = 3, \quad z_2 = 5,$$

$$\sqrt{y_1} = 3, \quad \sqrt{y_2} = 5, \quad y_1 = 9, \quad y_2 = 25, \quad \sqrt{x_1} = 8 - 3, \quad \sqrt{x_2} = 8 - 5,$$

$$x_1 = 25 \quad x_2 = 9$$

Ответ:  $(25 \cdot 9) \cdot (9 \cdot 25)$

б)  $\begin{cases} 3\sqrt{x} - \sqrt{y} = 8, \\ \sqrt{x} + 2\sqrt{y} = 19; \end{cases} \quad \begin{cases} 6\sqrt{x} - 2\sqrt{y} = 16, \\ \sqrt{x} + 2\sqrt{y} = 19. \end{cases} \quad 7\sqrt{x} = 35, \quad x = 25,$   
 $5 + 2\sqrt{y} = 19, \quad 2\sqrt{y} = 14, \quad \sqrt{y} = 7, \quad y = 49.$  Ответ: (25; 49).

г)  $\begin{cases} \sqrt{xy} = 12, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x} = \frac{12}{\sqrt{y}}, \\ \frac{12}{\sqrt{y}} + \sqrt{y} - 7 = 0. \end{cases} \quad \sqrt{y} = z,$   
 $\frac{12}{z} + z - 7 = 0, \quad 12 + z^2 - 7z = 0, \quad z_1 = 3, \quad z_2 = 4, \quad \sqrt{y_1} = 3, \quad \sqrt{y_2} = 4,$   
 $y_1 = 9, \quad y_2 = 16, \quad \sqrt{x_1} = 7 - 3, \quad \sqrt{x_2} = 7 - 4, \quad \sqrt{x_1} = 4, \quad \sqrt{x_2} = 3, \quad x_1 = 16, \quad x_2 = 9.$

187.

а)  $\begin{cases} x\sqrt{y} + y\sqrt{x} = 30, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{xy}(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 30, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 5; \end{cases} \quad \sqrt{xy} \cdot 5 = 30, \quad \sqrt{xy} = 6,$   
 $\sqrt{x} = \frac{6}{\sqrt{y}}, \quad y \neq 0, \quad \sqrt{y} + \frac{6}{\sqrt{y}} - 5 = 0. \quad \sqrt{y} = z,$   
 $z^2 - 5z + 6 = 0, \quad z_1 = 2, \quad z_2 = 3, \quad \sqrt{y_1} = 2, \quad \sqrt{y_2} = 3, \quad y_1 = 4, \quad y_2 = 9,$   
 $\sqrt{x_1} = 5 - 2, \quad x_1 = 9, \quad \sqrt{x_2} = 5 - 3, \quad x_2 = 4.$  Ответ: (4; 9), (9; 4).

б)  $\begin{cases} x + y - \sqrt{xy} = 7, \\ xy = 9; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y - \sqrt{xy} = 7 \\ \sqrt{xy} = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 7 + 3, \\ xy = 9; \end{cases}$   
 $\begin{cases} x = 10 - y, \\ (10 - y)y - 9 = 0; \end{cases} \quad y^2 - 10y + 9 = 0, \quad \begin{cases} y_1 = 9, \\ x_1 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} y_2 = 1, \\ x_2 = 9. \end{cases}$   

в)  $\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 6, \\ x - y = 12; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 6, \\ (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 12; \end{cases} \quad \begin{cases} (\sqrt{x} - \sqrt{y}) \cdot 6 = 12, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 6; \end{cases}$   
 $\begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 2, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 6; \end{cases} \quad 2\sqrt{x} = 8, \quad \sqrt{x} = 4, \quad x = 16, \quad 4 + \sqrt{y} = 6, \quad \sqrt{y} = 2, \quad y = 4.$

г)  $\begin{cases} xy = 64, \\ x - y + \sqrt{xy} = 20; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{xy} = 8, \\ x - y + 8 = 20; \end{cases} \quad \begin{cases} (12 + y)y = 64, \\ x = 12 + y; \end{cases}$   
 $12y + y^2 - 64 = 0, \quad \begin{cases} y_1 = 4, \\ x_1 = 16; \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} y_2 = -16, \\ x_2 = -4. \end{cases}$

$$188. \text{a}) \begin{cases} \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} = 26, \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} = 6. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (6-v)^2 + v^2 = 26, \\ u = 6 - v; \end{cases} \quad 36 - 12v + v^2 + v^2 = 26,$$

$$v^2 - 6v + 5 = 0, \quad \begin{cases} v_1 = 1, \\ u_1 = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} v_2 = 5, \\ u_2 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[4]{x_1} = 5, \\ \sqrt[4]{x_2} = 1, \end{cases} \quad x_1 = 625, \quad x_2 = 1,$$

$\sqrt[4]{y_1} = 1, \quad \sqrt[4]{y_2} = 5, \quad y_1 = 1, \quad y_2 = 625.$  Ответ:  $(625; 1), (1; 625).$

$$6) \begin{cases} \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 3 \frac{3}{4}, \\ xy = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{\sqrt[3]{y}} - \sqrt[3]{y} - \frac{15}{4} = 0, \\ x = \frac{1}{y}, \\ y \neq 0. \end{cases} \quad \sqrt[3]{y} = z,$$

$$\frac{1}{z} - z - \frac{15}{4} = 0, \quad 4z^2 - 15z + 4 = 0, \quad z_1 = -4, \quad z_2 = \frac{1}{4}, \quad \sqrt[3]{y_1} = -4, \quad \sqrt[3]{y_2} = \frac{1}{4},$$

$$\begin{cases} y_1 = -64, \\ x_1 = -\frac{1}{64}; \end{cases} \quad \begin{cases} y_2 = -\frac{1}{64}, \\ x_2 = -64. \end{cases} \quad \text{Ответ: } (-\frac{1}{64}; -64), (\frac{1}{64}; 64).$$

$$B) \begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 5, \\ \sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y})(\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}) = 5, \\ \sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} = 5, \\ \sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[4]{x} = a, \\ \sqrt[4]{y} = b; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + b = 5, \\ a - b = 1; \end{cases} \quad a = 3, \quad b = 2. \quad \sqrt[4]{x} = 3, \quad x = 81; \quad \sqrt[4]{y} = 2, \quad y = 16.$$

Ответ:  $(81; 16).$

$$g) \begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = -3, \\ xy = 8; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = -3, \\ \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{y} = 2. \end{cases} \quad \text{Пусть } \sqrt[3]{x} = a, \quad \sqrt[3]{y} = b;$$

$$\begin{cases} a + b = -3, \\ ab = 2. \end{cases} \quad \begin{cases} a = -b - 3, \\ (-b - 3)b = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} -b^2 - 3b - 2 = 0, \\ b^2 + 3b + 2 = 0, \end{cases}$$

$$\sqrt[3]{y} = -1, \quad y = (-1)^3, \quad y = -1, \quad \sqrt[3]{x} = -2, \quad x = (-2)^3, \quad x = -8;$$

$$\sqrt[3]{y} = -2, \quad y = -8, \quad \sqrt[3]{x} = -1, \quad x = -1. \quad \text{Ответ: } (-8; -1), (-1; -8).$$

## 18. Системы тригонометрических уравнений

**189. а)**  $\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = 0,25, \\ \sin y \cdot \cos x = 0,75. \end{cases}$

Сложим уравнения, затем вычтем из первого второе уравнение:

$$\begin{cases} \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y = 1, \\ \sin x \cdot \cos y - \cos x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin(x+y) = 1, \\ \sin(x-y) = -\frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z, \\ x-y = (-1)^k \left( -\frac{\pi}{6} \right) + \pi k, \quad k \in Z; \end{cases} \quad 2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n + (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z, \quad n \in Z,$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi n + (-1)^k \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in Z, \quad n \in Z,$$

$$2y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n - (-1)^k \frac{\pi}{6} - \pi k, \quad k \in Z, \quad n \in Z,$$

$$y = \frac{\pi}{4} + \pi n - (-1)^k \frac{\pi}{12} - \frac{\pi k}{2}, \quad k \in Z, \quad n \in Z.$$

Ответ:  $\left( \frac{\pi}{4} + \pi n + (-1)^k \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}; \frac{\pi}{4} + \pi n - (-1)^k \frac{\pi}{12} - \frac{\pi k}{2} \right), k \in Z, n \in Z.$

б)  $\begin{cases} x-y = -\frac{1}{3}, \\ \cos^2(\pi x) - \cos^2(\pi y) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x-y = -\frac{1}{3}, \\ (\cos \pi x - \cos \pi y)(\cos \pi x + \cos \pi y) = 0; \end{cases}$

$$-2 \sin \frac{\pi x + \pi y}{2} \cdot \sin \frac{\pi x - \pi y}{2} \cdot 2 \cos \frac{\pi x + \pi y}{2} \cdot \cos \frac{\pi x - \pi y}{2} = 0,$$

$$\sin(\pi x + \pi y) \sin(\pi x - \pi y) = 0,$$

$$\sin \frac{\pi x + \pi y}{2} = 0, \text{ или } \sin \frac{\pi x - \pi y}{2} = 0, \text{ или } \cos \frac{\pi x + \pi y}{2} = 0, \text{ или}$$

$$\cos \frac{\pi x - \pi y}{2} = 0; \quad \frac{\pi x + \pi y}{2} = \pi m, \quad m \in Z, \quad \frac{\pi x - \pi y}{2} = \pi k, \quad k \in Z,$$

$$\frac{\pi x + \pi y}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi l, \quad l \in Z, \quad \frac{\pi x - \pi y}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in Z.$$

1)  $\begin{cases} x+y = 2m, \quad m \in Z, \\ x-y = -\frac{1}{3}; \end{cases} \quad 2x = 2m - \frac{1}{3}, \quad x = m - \frac{1}{6}, \quad y = m + \frac{1}{6}, \quad m \in Z;$

2)  $\begin{cases} x - y = 2k, \quad k \in Z, \\ x - y = -\frac{1}{3}; \end{cases} \quad k = -\frac{1}{6}, \quad \text{решений нет};$

3)  $\begin{cases} x + y = 1 + 2l, \quad l \in Z, \\ x - y = -\frac{1}{3}; \end{cases} \quad 2x = \frac{2}{3} + 2l, \quad x = \frac{1}{3} + l, \quad y = \frac{2}{3} + l, \quad l \in Z;$

4)  $\begin{cases} x - y = 1 + 2n, \quad n \in Z, \\ x - y = -\frac{1}{3}; \end{cases} \quad n = -\frac{2}{3}, \quad \text{нет решений}.$

Ответ:  $\left(m - \frac{1}{6}; m + \frac{1}{6}\right), \quad \left(\frac{1}{3} + l; \frac{2}{3} + l\right), \quad l \in Z; \quad m \in Z.$

б)  $\begin{cases} 4 \sin x \cdot \sin y = 3, \\ \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cdot \sin y = \frac{3}{4}, \\ \frac{\sin x \cdot \sin y}{\cos x \cdot \cos y} = 3; \end{cases} \quad \frac{\frac{3}{4}}{\cos x \cdot \cos y} = 3,$

$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{4}, \quad \begin{cases} \sin x \cdot \sin y = \frac{3}{4}, \\ \cos x \cdot \cos y = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad \sin x \cdot \sin y + \cos x \cdot \cos y = 1, \quad \cos(x - y) = 1,$

$\sin x \cdot \sin y - \cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}, \quad -\cos(x + y) = \frac{1}{2},$

$\cos(x + y) = -\frac{1}{2}, \quad x + y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in Z; \quad \begin{cases} x - y = 2\pi n, \quad n \in Z, \\ x + y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in Z; \end{cases}$

$2x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n + 2\pi k, \quad k \in Z, \quad n \in Z, \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n + \pi k, \quad k \in Z, \quad n \in Z,$

$y = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n + \pi k - 2\pi n, \quad k \in Z, \quad n \in Z, \quad y = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k - \pi n, \quad k \in Z, \quad n \in Z.$

Ответ:  $(\frac{\pi}{3} + \pi k + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + \pi k - \pi n), (-\frac{\pi}{3} + \pi k + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi k - \pi n), \quad k \in Z, \quad n \in Z.$

г)  $\begin{cases} \sin^2 x = \cos x \cdot \cos y, \\ \cos^2 x = \sin x \cdot \sin y; \end{cases} \quad 1 = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y, \quad \cos(x - y) = 1,$

$x - y = 2\pi n, \quad n \in Z, \quad x = 2\pi n + y, \quad n \in Z; \quad \sin^2(2\pi n + y) =$

$= \cos(2\pi n + y) \cdot \cos y, \quad n \in Z, \quad \sin^2 y = \cos^2 y, \quad \sin^2 y - \cos^2 y = 0,$

$\operatorname{tg}^2 y = 1, \quad \cos y \neq 0, \quad y = \pm \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z, \quad \operatorname{tg} y = \pm 1, \quad x = 2\pi n \pm \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z.$

Ответ:  $(\frac{\pi}{4} + \pi k + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + \pi k), (-\frac{\pi}{4} + \pi k + 2\pi n; -\frac{\pi}{4} + \pi k), \quad k \in Z, \quad n \in Z.$

$$190. \text{a}) \begin{cases} \operatorname{tg}x + \operatorname{tg}y = 2, \\ \cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y} = 2, \\ \cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Перемножив уравнения, получим:

$$\begin{cases} \sin(x+y) = 1, \\ \cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}; \end{cases} \quad x + y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in Z,$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n - y, \quad n \in Z, \quad \cos(\frac{\pi}{2} + 2\pi n - y) \cdot \cos y = \frac{1}{2}, \quad n \in Z,$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - y) \cdot \cos y = \frac{1}{2}, \quad \sin y \cdot \cos y = \frac{1}{2},$$

$$\sin 2y = 1, \quad 2y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in Z, \quad y = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z,$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n - \pi k, \quad k \in Z, \quad n \in Z.$$

$$6) \begin{cases} x + y = \frac{5\pi}{2}, \\ \sin x + \cos 2y = -1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{5\pi}{2} - y, \\ \sin\left(\frac{5\pi}{2} - y\right) + \cos 2y = -1; \end{cases}$$

$$\cos y + \cos 2y = -1, \quad \cos y + 2\cos^2 y - 1 = -1, \quad 2\cos^2 y + \cos y = 0,$$

$$\cos y(2\cos y + 1) = 0, \quad \cos y = 0 \quad \text{или} \quad \cos y = -\frac{1}{2},$$

$$y_1 = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in Z, \quad y_2 = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in Z, \quad y_3 = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in Z;$$

$$x_1 = \frac{5\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \pi n, \quad n \in Z, \quad x_1 = \pi n, \quad n \in Z,$$

$$x_2 = \frac{11\pi}{6} - 2\pi k, \quad k \in Z, \quad x_3 = \frac{19\pi}{6} - 2\pi k, \quad k \in Z.$$

Ответ:  $(\pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n), (\frac{11\pi}{6} - 2\pi k; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k), (\frac{19\pi}{6} - 2\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k)$ ,  $k \in Z, n \in Z$ .

$$\text{в)} \begin{cases} \sin x \cdot \sin y = \frac{1}{4}, \\ \operatorname{ctgx} x \cdot \operatorname{ctgy} y = 3. \end{cases} \quad \text{Перемножим уравнения:}$$

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = \frac{1}{4}, \\ \cos x \cdot \cos y = \frac{3}{4}; \end{cases} \quad \sin x \cdot \sin y + \cos x \cdot \cos y = 1, \quad \cos(x-y) = 1,$$

$$\begin{aligned}
x - y &= 2\pi n, \quad n \in Z, \quad x = 2\pi n + y, \quad n \in Z, \\
\sin(2\pi n + y) \cdot \sin y &= \frac{1}{4}, \quad n \in Z, \quad \sin y \cdot \sin y = \frac{1}{4}, \quad \sin^2 y = \frac{1}{4}, \\
\sin y &= \pm \frac{1}{2}, \quad y = (-1)^k \left( \pm \frac{\pi}{6} \right) + \pi k, \quad k \in Z, \\
x &= 2\pi n + (-1)^k \left( \pm \frac{\pi}{6} \right) + \pi k, \quad k \in Z, \quad n \in Z.
\end{aligned}$$

Ответ:  $((-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k + 2\pi n; (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k), ((-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k + 2\pi n;$

$$(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k) \quad k \in Z, \quad n \in Z.$$

$$\Gamma) \quad \begin{cases} \cos 2y + \cos x = 1, \\ x + y = \frac{\pi}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos 2y + \cos \left( \frac{\pi}{2} - y \right) = 1, \\ x = \frac{\pi}{2} - y; \end{cases}$$

$$\cos 2y + \sin y = 1, \quad 1 - 2\sin^2 y + \sin y = 1,$$

$$-2\sin^2 y + \sin y = 0, \quad \sin y(-2\sin y + 1) = 0, \quad \sin y = 0 \quad \text{или} \quad \sin y = \frac{1}{2},$$

$$y_1 = \pi n, \quad n \in Z, \quad y_2 = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad k \in Z; \quad x_1 = \frac{\pi}{2} - \pi n, \quad n \in Z,$$

$$x_2 = \frac{\pi}{2} - (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z.$$

Ответ:  $(\frac{\pi}{2} - \pi n; \pi n), (\frac{\pi}{2} - (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k; (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k), \quad n \in Z, \quad k \in Z.$

## 19. Системы показательных и логарифмических уравнений

$$191. \text{a}) \quad \begin{cases} 9^{x+y} = 729, \\ 3^{x-y-1} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 9^{x+y} = 9^3, \\ 3^{x-y-1} = 3^0; \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=3, \\ x-y-1=0; \end{cases} \quad 2x=4, \quad x=2, \quad y=1.$$

$$6) \quad \begin{cases} 2^x - 2^y = 16, \\ x+y=9; \end{cases} \quad \begin{cases} 2^{9-y} - 2^y = 16, \\ x=9-y; \end{cases} \quad \frac{2^9}{2^y} - 2^y - 16 = 0.$$

$$2^y = z, \quad \frac{512}{z} - z - 16 = 0, \quad 512 - z^2 - 16z = 0,$$

$$z^2 + 16z - 512 = 0, \quad z_1 = 16, \quad z_2 = -32; \quad 2^{y_1} = 16, \quad 2^{y_2} = -32 - \text{решений нет.}$$

$$y=4, \quad x=5; \quad \text{Ответ: } (5; 4).$$

б)  $\begin{cases} (\sqrt{5})^{x-y} = 25, \\ 6^{6y-x-1} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 5^{\frac{x-y}{2}} = 5^2 \\ 6^{6y-x-1} = 6^0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x-y}{2} = 2, \\ 6y-x-1 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x-y = 4, \\ -x+6y = 1; \end{cases}$

$5y = 5, \quad y = 1, \quad x = 5.$  Ответ:  $(5; 1).$

г)  $\begin{cases} 3^x + 3^y = 28, \\ x-y = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} 3^{3+y} + 3^y = 28, \\ x = 3+y; \end{cases} \quad 27 \cdot 3^y + 3^y = 28, \quad 28 \cdot 3^y = 28,$   
 $y = 0, \quad x = 3.$  Ответ:  $(3; 0).$

**192. а)**  $\begin{cases} 4^{\log_4 2x} - y = -1 \\ 5^{2x-y} + 5^x = 5,2; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - y = -1, \\ 5^{-1} + 5^x = 5,2; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2x + 1, \\ 5^x = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 3, \\ x = 1. \end{cases}$

б)  $\begin{cases} 2^x + 3^y = 17 \\ 2^{x+2} + 3^{y+1} = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} 2^x + 3^y = 17, \\ 4 \cdot 2^x - 3 \cdot 3^y = 5. \end{cases} \quad 2^x = u, \quad 3^y = v,$

$\begin{cases} u+v = 17, \\ 4u-3v = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} -4u-4v = -68, \\ -7v = -63, \end{cases} \quad v = 9, \quad u = 8; \quad 2^x = 8,$

$3^y = 9; \quad x = 3, \quad y = 2.$

б)  $\begin{cases} 3^{\log_3(y+x)} = 2, \\ 2^{2x+y} = 16; \end{cases} \quad \begin{cases} y+x = 2, \\ 2x+y = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x+y = 2, \\ 2x+y = 4; \end{cases} \quad x = 2, \quad y = 0.$

г)  $\begin{cases} \log \sqrt{2} (y-x) = 4, \\ 3^x + 2 \cdot 3^{4+x-2} = 171; \end{cases} \quad \begin{cases} 3^x + 2 \cdot 3^{4+x-2} = 171, \\ y = 4+x; \end{cases}$

$3^x + 2 \cdot 3^{4+x-2} = 171, \quad 3^x + 18 \cdot 3^x = 171, \quad 19 \cdot 3^x = 171, \quad 3^x = 9, \quad x = 2, \quad y = 6.$

**193. а)**  $\begin{cases} 3^x \cdot 7^y = 63, \\ 3^x + 7^y = 16. \end{cases} \quad \begin{cases} 3^x = u; \quad 7^y = v, \\ u+v = 16; \end{cases} \quad \begin{cases} u \cdot v = 63, \\ u+v = 16; \end{cases}$

$\begin{cases} (16-v)v = 63, \\ u = 16-v; \end{cases} \quad 16v - v^2 - 63 = 0, \quad v^2 - 16v + 63 = 0, \quad v_1 = 7, \quad v_2 = 9;$

$u_1 = 9, \quad u_2 = 7; \quad 3^{x^1} = 9, \quad 3^{x^2} = 7; \quad x_1 = 2, \quad x_2 = \log_3 7; \quad 7^{y^1} = 7, \quad 7^{y^2} = 9;$   
 $y_1 = 1, \quad y_2 = \log_7 9.$  Ответ:  $(2; 1); (\log_3 7; \log_7 9).$

б)  $\begin{cases} 3^x - 2^{2y} = 77, \\ \sqrt{3^x} - 2^y = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} 3^x - 2^{2y} = 77, \\ \frac{x}{2} = u, \quad 2^y = v, \end{cases}$

$\begin{cases} u^2 - v^2 = 77, \\ u - v = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} 7(u+v) = 77, \\ u - v = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} u+v = 11, \\ u - v = 7; \end{cases} \quad u = 9, \quad v = 2;$

$\frac{x}{2} = 9, \quad \frac{x}{2} = 2, \quad x = 4, \quad 2^y = 2; \quad y = 1.$  Ответ:  $(4; 1).$

$$\text{в)} \begin{cases} 4^x \cdot 4^y = 64, \\ 4^x - 4^y = 63. \end{cases} \quad 4^x = u, \quad 4^y = v, \quad \begin{cases} u \cdot v = 64, \\ u - v = 63; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (63+v)v = 64, \\ u = 63+v; \end{cases} \quad v^2 + 63v - 64 = 0, \quad v_1 = -64, \quad v_2 = 1; \quad u_1 = -1, \quad u_2 = 64;$$

$4^x = -64$  – уравнение не имеет смысла;  $4^x = 1, \quad x = 0$ ;

$4^y = -1$  – уравнение не имеет смысла;  $4^y = 64, \quad y = 3$ .

$$\text{г)} \begin{cases} \sqrt{2^x} - 3^y = -7, \\ 2^{\frac{x}{2}} - 2^x = -2, \\ 2^x - 2^{\frac{x}{2}} - 2 = 0. \end{cases} \quad \text{Пусть } 2^{\frac{x}{2}} = z,$$

тогда  $z^2 - z - 2 = 0, \quad z_1 = 2, \quad z_2 = -1; \quad 2^{\frac{x}{2}} = 2, \quad 2^{\frac{x}{2}} = -1$  – уравнение не

имеет смысла;  $\frac{x}{2} = 1, \quad x = 2; \quad 2^2 - 3^y = -5, \quad 3^y = 9, \quad y = 2$ .

$$\text{194. а)} \begin{cases} \lg x - \lg y = 1, \\ \lg^2 x + \lg^2 y = 5. \end{cases} \quad \lg x = u, \quad \lg y = v, \quad \begin{cases} u - v = 1, \\ u^2 + v^2 = 5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} u = 1 + v, \\ (1 + v)^2 + v^2 = 5; \end{cases} \quad 1 + 2v + v^2 + v^2 = 5, \quad 2v^2 + 2v - 4 = 0,$$

$$v^2 + v - 2 = 0, \quad v_1 = -2, \quad v_2 = 1; \quad u_1 = -1, \quad u_2 = 2; \quad \lg x = -1, \quad \lg x = 2,$$

$$x_1 0,1, \quad x_2 = 100; \quad \lg y = -2, \quad \lg y = 1, \quad y = 0,01, \quad y = 10.$$

Ответ:  $(0,1; 0,001); (100; 10)$ .

$$\text{б)} \begin{cases} \log_2(x^2 + y^2) = 5, \\ 2 \log_4 x + \log_2 y = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, y > 0, \\ \log_2(x^2 + y^2) = \log_2 32, \\ \log_2 x + \log_2 y = \log_2 16; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, y > 0, \\ x^2 + y^2 = 32, \\ xy = 16; \end{cases}$$

$$x = \frac{16}{y}, \quad \frac{256}{y^2} + y^2 = 32, \quad y^4 - 32y^2 + 256 = 0, \quad (y^2 - 16)^2 = 0,$$

$y_1 = 4, \quad y_2 = -4$  – на удовлетворяет условию  $x > 0$ ;  $x_1 = 4$ . Ответ:  $(4; 4)$ .

$$\text{в)} \begin{cases} \lg x - \lg y = 7, \\ \lg x + \lg y = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ y > 0; \end{cases} \quad 2 \lg x = 12, \quad \lg x = 6, \quad x = 10^6; \quad 6 + \lg y = 5,$$

$$\lg y = -1, \quad y = \frac{1}{10}.$$

Ответ:  $(10^6; 0,1)$ .

$$\text{г)} \begin{cases} \log_2(x+1) = \log_2\left(y + \frac{1}{4}\right), \\ \log_2 x - 2 \log_2\left(y - \frac{1}{2}\right) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x+1 > 0, \\ y + \frac{1}{4} > 0, \\ y - \frac{1}{2} > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x > -1, \\ y > -\frac{1}{4}, \\ y > \frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ y > \frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+1=y+\frac{1}{4}, \\ x=\left(y-\frac{1}{2}\right)^2; \end{cases} \quad \begin{cases} x-y=-\frac{3}{4}, \\ x=\left(y-\frac{1}{2}\right)^2; \end{cases} \quad \begin{cases} \left(y-\frac{1}{2}\right)^2-y=-\frac{3}{4}, \\ y^2-y+\frac{1}{4}-y+\frac{3}{4}=0, \quad y^2-2y+1=0, \quad (y-1)^2=0, \quad y=1, \quad x=0,25. \end{cases}$$

**195. a)**  $\begin{cases} y-\log_3 x=1, \\ x^y=3^{12}; \end{cases} \quad \begin{cases} y=1+\log_3 x, \\ y \log_3 x=12 \log_3 3; \end{cases} \quad \begin{cases} y=1+\log_3 x, \\ (1+\log_3 x) \log_3 x=12. \end{cases}$

$$\log_3 z = z, \quad (1+z)z = 12, \quad z^2 + z - 12 = 0, \quad z_1 = -4, \quad z_2 = 3;$$

$$\log_3 x_1 = -4, \quad \log_3 x_2 = 3; \quad x_1 = \frac{1}{81}, \quad x_2 = 21; \quad y_1 = 1 - 4, \quad y_1 = -3,$$

$$y_2 = 1 + 3, \quad y_2 = 4. \quad \text{Ответ: } \left(\frac{1}{81}; -3\right); (27; 4).$$

б)  $\begin{cases} 3^{1+\log_3(x^2+y^2)}=15, \\ \log_3(x^2-y^2)-\log_3(x-y)=0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2+y^2 \neq 0, \\ x^2-y^2 \neq 0, \\ x > y; \end{cases}$

$$\begin{cases} 3 \cdot 3^{\log_3(x^2+y^2)}=15, \\ \frac{x^2-y^2}{x-y}=1; \end{cases} \quad \begin{cases} 3(x^2+y^2)=15, \\ (x+y)=1; \end{cases} \quad \begin{cases} 3(1-y)^2+3y^2=15, \\ x=1-y; \end{cases}$$

$$3 - 6y + 3y^2 + 3y^2 - 15 = 0, \quad 6y^2 - 6y - 12 = 0, \quad y^2 - y - 2 = 0, \\ y_1 = 2, \quad y_2 = -1; \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 2; \quad (-1; 2) - \text{не является решением системы.}$$

в)  $\begin{cases} \log_5 x + 3^{\log_5 y} = 7, \\ x^y = 5^{12}; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_5 x + y = 7, \\ y \log_5 x = 12 \log_5 5; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 7 - \log_5 x, \\ y(\log_5 x) = 12; \end{cases}$

$$(7 - \log_5 x) \cdot \log_5 x = 12. \quad \log_5 x = z, \quad (7 - z)z = 12,$$

$$7z - z^2 - 12 = 0, \quad z^2 - 7z + 12 = 0, \quad z_1 = 3, \quad z_2 = 4; \quad \log_5 x_1 = 3,$$

$$x_1 = 125, \quad y_1 = 4; \quad \log_5 x_2 = 4, \quad x_2 = 625, \quad y_2 = 3.$$

Ответ: (125; 4); (625; 3).

г)  $\begin{cases} 5^{1+\log_5(x^2-y^2)}=25, \\ \log_5(x^2-y^2)=\log_5(x+y); \end{cases} \quad \begin{cases} 5 \cdot (x^2-y^2)=25, \\ \frac{x^2-y^2}{x+y}=1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2-y^2=5, \\ x-y=1; \end{cases}$

$$\begin{cases} x+y=5, \\ x-y=1; \end{cases} \quad x=3, \quad y=2. \quad \text{Ответ: } (3; 2).$$

$$196. \text{a)} \begin{cases} \log_4 x - \log_2 y = 0, \\ x^2 - 2y^2 = 8; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_4 x - 2 \log_4 y = 0, \\ x^2 - 2y^2 = 8; \\ x > 0, y > 0; \end{cases}$$

$x = y^2$ ,  $y^4 - 2y^2 - 8 = 0$ ,  $y = 2$  или  $y = -2$  – не удовлетворяет условию системы;  $y = 2$ ,  $x = 4$ . Ответ:  $(4; 2)$ .

$$6) \begin{cases} 3^{2\sqrt{x}-\sqrt{y}} = 81, \\ \lg \sqrt{xy} = 1 + \lg 3; \end{cases} \quad \begin{cases} 3^{2\sqrt{x}-\sqrt{y}} = 3^4, \\ \lg \sqrt{xy} = \lg 10 \cdot 3, \\ x > 0, y > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, y > 0, \\ 2\sqrt{x} - \sqrt{y} = 4, \\ \sqrt{xy} = 30; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0, y > 0, \\ 2\sqrt{x} - \sqrt{y} = 4, \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 30. \end{cases} \quad \text{Пусть } \sqrt{x} = u, \sqrt{y} = v, \text{ тогда } \begin{cases} 2u - v = 4, \\ u \cdot v = 30; \end{cases}$$

$$\begin{cases} v = 2u - 4, \\ u \cdot (2u - 4) = 30; \end{cases} \quad 2u^2 - 4u - 30 = 0, \quad u^2 - 2u - 15 = 0, \quad u_1 = 5, \quad u_2 = -3;$$

$v_1 = 6$ ,  $v_2 = -10$ ;  $\sqrt{x} = 5$ ,  $\sqrt{x} = -3$  – уравнение решений не имеет;

$x = 25$ ,  $\sqrt{y} = 6$ ,  $\sqrt{y} = -10$  – уравнение решений не имеет;  $y = 36$ .

$$\text{в)} \begin{cases} \log_9 x - \log_3 y = 0, \\ x^2 - 5y^2 + 4 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, y > 0, \\ x = y^2, \\ x^2 - 5y^2 + 4 = 0; \end{cases} \quad y^4 - 5y^2 + 4 = 0,$$

$y = 2$ ,  $x = 4$ ;  $y = -2$  – не удовлетворяет условию;

$y = 1$ ,  $x = 1$ ;  $y = -1$  – не удовлетворяет условию.

Ответ:  $(4; 2)$ ,  $(1; 1)$ .

$$\text{г)} \begin{cases} 2 \log_2 x - 3^y = 15, \\ 3^y \log_2 x = 2 \log_2 x + 3^{y+1}. \end{cases}$$

$$\text{Пусть } \log_2 x = u, 3^y = v, \text{ тогда } \begin{cases} 2u - v = 15, \\ v \cdot u = 2u + 3v; \end{cases}$$

$$\begin{cases} v = 2u - 15, \\ (2u - 15)u = 2u + 3(2u - 15); \end{cases} \quad 2u^2 - 15u - 2u - 6u + 45 = 0,$$

$$2u^2 - 23u + 45 = 0, \quad u_1 = 9, \quad u_2 = 2.5; \quad v_1 = 3, \quad v_2 = -10; \quad \log_2 x_1 = 9,$$

$\log_2 x_2 = 2.5$ ;  $x_1 = 512$ ,  $x_2 = 2^{2.5}$ ;  $3^y = 3$ ,  $y_1 = 1$ ,  $3^y = -10$  – уравнение не имеет смысла. Ответ:  $(512; 1)$ .

## 20. Задачи на составление уравнений и систем уравнений

**197.** Пусть  $x$  км/ч – скорость автобуса по старому расписанию, тогда  $(x + 10)$  км/ч – скорость по новому расписанию;  $t$  – время движения по старому расписанию;  $(t - \frac{2}{3})$  – время движения по новому расписанию. Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} x \cdot t = 325, \\ (x+10)\left(t - \frac{2}{3}\right) = 325; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{325}{t}, \\ xt - \frac{2}{3}x + 10t - \frac{20}{3} = xt; \end{cases}$$

$$-2x + 30t - 20 = 0, \quad -\frac{325}{t} + 15t - 10 = 0, \quad 3t^2 - 2t - 65 = 0, \quad t_1 = 5,$$

$t_2 = -\frac{26}{6}$  – не является решением по смыслу задачи;

$x = 325 : 5 = 65$  (км/ч);  $x + 10 = 65 + 10 = 75$  (км/ч).

Ответ: скорость автобуса по старому расписанию 65 км/ч, по новому – 75 км/ч.

**198.** Пусть скорость течения  $x$  км/ч, тогда  $(15 - x)$  км/ч – скорость лодки против течения и  $(x + 15)$  км/ч – скорость лодки по течению. Можно составить уравнение по условию задачи.

$$\frac{139\frac{1}{3}}{x+15} + \frac{139\frac{1}{3}}{15-x} = 20, \quad \frac{418}{3(x+15)} + \frac{418}{3(15-x)} = 20, \quad x \neq 15, \quad x \neq -15;$$

$$418(15-x) + 418(x+15) = 60(15^2 - x^2), \quad 418(15 - x + x + 15) = 30(15^2 - x^2),$$

$$209 \cdot 30 = 30 \cdot (15^2 - x^2), \quad 209 = 15^2 - x^2, \quad x^2 = 16, \quad x_1 = -4 – не является решением: x_2 = 4. Ответ: скорость течения 4 км/ч.$$

**199.** Пусть  $x$  км/ч – первоначальная скорость;  $t$  – время в пути, тогда  $x \cdot t = 220$ ;  $(x + 5)$  км/ч – новая скорость,  $(t - 2\frac{1}{6})$  ч – время,

затраченное на оставшийся путь, тогда  $2x + (x + 5)(t - 2\frac{1}{6}) = xt$ .

Получим систему уравнений:

$$\begin{cases} x \cdot t = 220, \\ 2x + (x+5)\left(t - 2\frac{1}{6}\right) = xt; \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{220}{x}, \\ 2x + xt + 5t - 2\frac{1}{6}x - \frac{65}{6} = xt; \end{cases}$$

$$\begin{cases} t = \frac{220}{x}, \\ 5t - \frac{1}{6}x - \frac{65}{6} = 0; \end{cases} \quad \frac{5 \cdot 220}{x} - \frac{x}{6} - \frac{65}{6} = 0, \quad 6600 - x^2 - 65x = 0,$$

$x^2 + 65x - 6600 = 0, \quad x_1 = 55, \quad x_2 = -120$  – не является решением.

Ответ: первоначальная скорость 55 км/ч.

**200.** Пусть  $ч$  км/ч – скорость I теплохода, тогда  $(x + 6)$  км/ч – скорость второго теплохода. Т.к. они двигались перпендикулярно:

$$(2x)^2 + (2(x + 6))^2 = 60^2, \quad 4x^2 + 4(x + 6)^2 = 60^2,$$

$$4x^2 + 4x^2 + 48x + 144 = 3600, \quad x^2 + 6x - 432 = 0, \quad x_1 = 18, \quad x_2 = -24 –$$

не решение.  $x + 6 = 18 + 6 = 24$  (км/ч). Ответ: 18 км/ч, 24 км/ч.

**201.** Пусть  $t$  – время до встречи первого тела;  $(t - 5)$  с – время движения второго тела. Путь первого тела:

$$t \frac{12 + 6(t - 1)}{2} = 6t + 3t^2 - 3t = 3t^2 + 3t.$$

$$\text{Путь второго тела: } 12(t - 5). \quad 3t^2 + 3t + 12t - 60 = 390,$$

$t^2 + 5t - 150 = 0, \quad t_1 = 10, \quad t_2 = -15$  – не является решением, т.к. мы пользуемся положительным временем. Ответ: 10 с.

**202.** Пусть  $n$  – дневная норма по плану; тогда

$$\frac{2160}{n} = \frac{2320 - 3n}{n + 80} + 4, \quad 2160n + 80 \cdot 2160 = 2320n - 3n^2 + 4n^2 + 320n,$$

$n^2 + 480n - 172800 = 0, \quad n_1 = 240, \quad n_2 = -700$  – не может выражать объем грунта. Ответ: 240 м<sup>3</sup>.

**203.** Пусть  $x$  – число дней, необходимое I бригаде, тогда  $x + 6$  – число дней, необходимое второй бригаде. Имеем уравнение:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{4}, \quad x^2 + 6x - 24 = 0, \quad x^2 - 2x - 24 = 0, \quad x_1 = 6, \quad x_2 = -4$$

не может выражать число дней;  $x + 6 = 12$  Ответ: 6 дней, 12 дней.

**204.** Пусть затребовали  $x$  машин; грузоподъемность каждой машины  $\frac{60}{x}$ . Имеем уравнение:

$$\frac{60}{x} - 0,5 = \frac{60}{x+4}, \quad 120(x+4) - (x+4)x = 120x, \quad x^2 + 4x - 480 = 0,$$

$x_1 = 20, \quad x_2 = -24$  – не является решением.

Ответ: 20 машин.

**205.** Пусть  $x\%$  меди в первом куске,  $(x + 15)\%$  меди во втором куске. Имеем уравнение:

$$\frac{5 \cdot 100}{x} + \frac{4 \cdot 100}{x+15} = 30, \quad 50x + 750 + 40x = 3x^2 + 45x, \quad x^2 - 15x - 250 = 0,$$

$x_1 = 25$ ,  $x_2 = -10$  – не является решением. Ответ: 25%

**206.** Пусть  $x$  г – было количество раствора;  $\frac{40}{x}$  – процентное содержание соли в первоначальном растворе;  $x + 200$  – количество нового раствора;  $\frac{40}{x+200}$  – процентное содержание соли в новом растворе. По условию задачи имеем уравнение:  $\frac{40}{x} - \frac{40}{x+200} = 0,1$

$$40x + 8000 - 40x = 0,1(x^2 + 200x), \quad x^2 + 200x - 8000 = 0, \quad x_1 = 200, \quad x_2 = -400 \text{ – не является решением по смыслу задачи.}$$

$$\frac{40}{200} \cdot 100\% = 20\%, \quad 200 - 40 = 160 \text{ (г).} \quad \text{Ответ: } 20\%, \quad 160 \text{ г воды.}$$

**207.** Пусть  $x$  – скорость третьей машины;  $t$  – время движения третьей машины до встречи с первой. Составим систему:

$$\begin{cases} xt = 40 \cdot \frac{1}{2} + 40t, \\ x\left(t + \frac{3}{2}\right) = 50 \cdot 2 + 50t; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{20 + 40t}{t}, \\ xt + \frac{3}{2}x = 100 + 50t; \end{cases}$$

$$100 + 50t - \frac{3}{2}x = 20 + 40t, \quad 80 + 10t = \frac{3}{2}x, \quad 80 + 10t = \left(\frac{20 + 40t}{t}\right) \cdot \frac{3}{2},$$

$$160t + 20t^2 = 60 + 120t, \quad t^2 + 2t - 3 = 0, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = -3 \text{ – не является решением задачи; } x = 20 + 40 = 60 \text{ (км/ч).} \quad \text{Ответ: } 60 \text{ км/ч.}$$

**208.** Пусть  $V$  м/с – скорость поезда;  $S$  м – длина поезда.  $S = 7V$ ,

$$V = \frac{378 + 7V}{25}, \quad 25V = 378 + 7V, \quad 18V = 378, \quad V = 21 \text{ (м/с);}$$

$S = 7 \cdot 21 = 147$  (м). Ответ:  $V = 21$  м/с,  $S = 147$  м.

**209.** Пусть  $V_1$  км/ч – первоначальная скорость первого пешехода;

$V_2$  км/ч – второго пешехода. Имеем:  $5(V_1 + V_2) = 50$ ,

$$V_1 + V_2 = 10, \quad V_2 = 10 - V_1; \quad \frac{5V_1}{V_2 + 1} - \frac{50 - V_1}{V_1 - 1} = 2,$$

$$5V_1(V_1 - 1) - (50 - 5V_1)(V_2 + 1) = 2(V_2 + 1)(V_1 - 1);$$

$V_2 = 10 - V_1$ , поэтому

$$5V_1(V_1 - 1) - (50 - 5V_1)(10 - V_1 + 1) = 2(10 - V_1 + 1)(V_1 - 1),$$

$$V_1^2 + 38V_1 - 264 = 0, \quad V_1 = 6 \text{ км/ч}, \quad V_2 = 4 \text{ км/ч}.$$

Ответ: 6 км/ч, 4 км/ч.

**210.** Пусть двигателей типа  $A$  изготовили  $x$  штук и  $y$  — типа  $B$ .

$$\text{Составим систему: } \begin{cases} 2x + 3y = 130, \\ x + 2y = 80; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 80 - 2y, \\ 160 - 4y + 3y = 130; \end{cases} \quad y = 30, \quad x = 20.$$

Ответ: 20 двигателей типа  $A$ , 30 двигателей типа  $B$ .

**211.** Пусть  $x$  дней нужно первому рабочему, тогда второму необходимо  $25 - x$ . Составим уравнение, приняв всю работу за 1:

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(25-x)}; \quad x(25-x) = 6(25-x) + 6x, \quad 25x - x^2 = 150 - 6x + 6x,$$

$$x^2 - 25x + 150 = 0, \quad x_1 = 15, \quad x_2 = 10. \quad \text{Тогда второй соответственно за 10 и 15 дней.}$$

Ответ: 15 дней и 10 дней.

**212.** Пусть  $x$  масса первой жидкости, тогда масса II в смеси  $60 - x$ .

Объем первой жидкости  $\frac{x}{1,2}$ , объем второй  $\frac{60-x}{1,6}$ , объем всей

смеси  $\frac{x}{1,2} + \frac{60-x}{1,6}$ , плотность смеси равна

$$60 : \left( \frac{x}{1,2} + \frac{60-x}{1,6} \right) = \frac{60 \cdot 4,8}{4x + 3(60-x)} = \frac{288}{x+180}. \quad \text{По условию } 8 \cdot \frac{288}{x+180} = x, \\ \text{откуда } x^2 + 180x - 2304 = 0, \quad x = 12 \quad \text{или} \quad x = -192 \quad \text{не является решением.}$$

Следовательно, при  $x = 12$  плотность смеси равна  $\frac{288}{x+180}$ , то есть  $1,5 \text{ г/см}^3$ ; первой жидкости 12 г, второй — 48 г.

Ответ: 12 г, 48 г,  $1,5 \text{ г/см}^3$ .

**213.** Пусть  $x$  — масса серебра в сплаве, тогда  $m + 3$  серебра составит 90%, а масса серебра в нем равна  $x + 3$ ; таким образом,  $\frac{9}{10}(m+3) = x + 3$ . В сплаве массой  $m + 2$  серебро составит 84%; но

серебра в добавленных 2 кг сплава содержится  $2 \cdot \frac{9}{10} \text{ кг} = \frac{9}{5} \text{ кг}$ ,

поэтому в новом сплаве серебро составит  $\left(x + \frac{9}{5}\right) \text{ кг}$  и

$$\frac{84}{100}(m+2) = x + \frac{9}{5}. \quad \text{Получим систему:}$$

$$\begin{cases} \frac{9}{10}(m+3) = x+3, \\ \frac{84}{100}(m+2) = x + \frac{9}{5}; \end{cases} \quad \begin{cases} 9(m+3) = 10(x+3), \\ 21(m+2) = 25(x + \frac{9}{5}); \end{cases} \quad \begin{cases} 9m+27 = 10x+30, \\ 21m+42 = 25x+45; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 9m = 10x+3, \\ 21m = 25x+3; \end{cases} \quad \begin{cases} m = \frac{10x+3}{9}, \\ 21 \cdot \frac{10x+3}{9} = 25x+3; \end{cases} \quad \begin{aligned} \frac{7}{3}(10x+3) &= 25x+3, \\ 70x+21 &= 75x+9, 5x = 21-9, x = \frac{12}{5}, x = 2,4, m = \frac{10 \cdot 2,4 + 3}{9}, m = \frac{27}{9}, \end{aligned}$$

$$m = 3. 2,4\% - a\%, 3 - 100\%, a = \frac{2,4}{3} \cdot 100 = 80\%.$$

Ответ: масса сплава 3 кг, процентное содержание серебра 80%.

**214.** Пусть первая точка делает оборот за  $x$  с, тогда вторая – за  $(x+5)$

с. Тогда за 1 мин. первая точка сделает  $\frac{60}{x}$  оборотов, вторая  $\frac{60}{x+5}$

оборотов. По условию  $\frac{60}{x} - \frac{60}{x+5} = 1$ , значит  $60(x+5-x) = x(x+5)$ ,

$x^2 + 5x - 300 = 0$ ,  $x = -20$  (не подходит) или  $x = 15$ . Получили, что первая точка делает полный оборот за 15 с, вторая за 20 с. Скорость первой точки 4 м/с, второй 3 м/с. Ответ: 4 м/с, 3 м/с.

**215.** Пусть число десятков  $a$ , число единиц  $b$ . Число равно  $10a+b$ .

$$a^2 + b^2 = 13; 10a + b - 9 = 10b + a. \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 13, \\ 9a - 9b = 9; \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 13, \\ a - b = 1; \end{cases}$$

$$(b+1)^2 + b^2 = 13, b^2 + 2b + 1 + b^2 = 13, 2b^2 + 2b - 12 = 0, b^2 + b - 6 = 0,$$

$b = 2$  или  $b = -3$  – не цифра. По смыслу  $b > 0$ , поэтому  $b = 2$ ,  $a = 3$   
и исходное число равно 32. Ответ: 32.

**216.**

$a^2 - b^2 = 55$ ,  $a, b \in N$ .  $(a-b)(a+b) = 55$ , причем  $a-b$ ,  $a+b$  –  
натуральные числа. Но  $55 = 55 \cdot 1 = 5 \cdot 11$ , поэтому либо

$$\begin{cases} a-b = 1, \\ a+b = 55, \end{cases} \text{ либо} \quad \begin{cases} a-b = 5, \\ a+b = 11. \end{cases}$$

Из первой системы  $2b = 54$ ,  $b = 27$  и  $a = 28$ ;  
из второй системы  $2a = 16$ ,  $a = 8$  и  $b = 3$ .

Ответ: 27 и 28; 3 и 8.

## § 5. Производная, первообразная, интеграл и их применения

### 21. Производная

**217. а)**  $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ,

$$\Delta f = \frac{1}{2}(1,1)^2 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}(1,1^2 - 1^2) = \frac{1}{2} \cdot 0,21 = 0,105, \quad \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{0,105}{0,1} = 1,05;$$

$$б) \Delta f = \sqrt{2,21-1} - \sqrt{2-1} = 1,1 - 1 = 0,1, \quad \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{0,1}{0,21} = \frac{10}{21};$$

$$в) \Delta f = 3 - 2(2,2) - (3 - 2 \cdot 2) = 3 - 4,4 - 3 + 4 = -0,4, \quad \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{-0,4}{0,2} = -2;$$

$$г) \Delta f = \frac{1}{1,1+1} - \frac{1}{1} = \frac{1}{2,1} - 1 = \frac{10}{21} - 1 = -\frac{11}{21},$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{-\frac{11}{21}}{0,1} = -\frac{11 \cdot 10}{21} = -\frac{110}{21} = -5\frac{5}{21}.$$

**218.**

$$а) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - 4(x + \Delta x) - (1 - 4x)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - 4x - 4\Delta x - 1 + 4x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-4\Delta x}{\Delta x} = -4;$$

$$б) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1,5(x + \Delta x)^2 - 1,5x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1,5x^2 + 3x\Delta x + 1,5\Delta^2 x - 1,5x^2}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(3x + 1,5\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x + 1,5\Delta x) = 3x; \text{ при } x_0 = 2 \text{ имеем } f'(x_0) = 6;$$

$$в) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3(x + \Delta x) + 2 - 3x - 2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x + 3\Delta x + 2 - 3x - 2}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x}{\Delta x} = 3;$$

$$г) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^3 + 1 - x^3 - 1}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2\Delta x + 3x\Delta^2 x + \Delta^3 x + 1 - x^3 - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(3x^2 + 3x\Delta x + \Delta^2 x)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x^2 - 3x\Delta x + \Delta^2 x) = 3x^2; \text{ при } x_0 = -1 \text{ имеем } f'(x_0) = 3.$$

**219. a)**  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + 5$ ,  $f'(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ ;

б)  $f(x) = (4 - x^2)\sin x$ ,  $f'(x) = (4 - x^2)' \cdot \sin x + (4 - x^2)(\sin x)' = -2x \cdot \sin x + (4 - x^2)\cos x$ ;

в)  $f(x) = (x^2 + 5)(x^3 - 2x + 2)$ ,  $f'(x) = 2x(x^3 - 2x + 2) - (x^2 + 5)(3x^2 - 2) = 2x^4 - 4x^2 + 4x - 3x^4 + 2x^2 - 15x^2 + 10 = -x^4 - 17x^2 + 4x + 10$ ;

г)  $f(x) = \frac{\cos x}{2 - x^3}$ ,

$$f'(x) = \frac{-\sin x(2 - x^3) - \cos x \cdot (-3x^2)}{(2 - x^3)^2} = \frac{-2 \sin x + x^3 \sin x + 3x^2 \cos x}{(2 - x^3)^2}.$$

**220. а)**  $f(x) = \frac{3}{x^3} - \frac{5}{\sqrt[5]{x}} + \frac{5}{\sqrt[3]{x}} = 3 \cdot x^{-3} - x^{\frac{1}{5}} + 5 \cdot x^{-\frac{1}{3}}$ ,

$$f'(x) = 3 \cdot (-3x^{-4}) - \frac{1}{5}x^{-\frac{4}{5}} + 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot x^{-\frac{1}{3}} = -\frac{9}{x^4} - \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}} - \frac{5}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

б)  $f(x) = (2 - \sqrt{x})\operatorname{tg} x$ ,  $f'(x) = \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\operatorname{tg} x + \frac{2 - \sqrt{x}}{\cos^2 x}$ ;

в)  $f(x) = \frac{x^3 - 3x}{1 - 2x}$ ,

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 3)(1 - 2x) - (x^3 - 3x)(-2)}{(1 - 2x)^2} = \frac{3x^2 - 6x^3 - 3 + 6x + 2x^3 - 6x}{(1 - 2x)^2} = \frac{-4x^3 + 3x^2 - 3}{(1 - 2x)^2}$$

г)  $f(x) = \frac{\sin x}{1 - 2 \cos x}$ ,  $f'(x) = \frac{\cos x(1 - 2 \cos x) - \sin x \cdot 2 \sin x}{(1 - 2 \cos x)^2} = \frac{\cos x - 2}{(1 - 2 \cos x)^2}$ .

**221. а)**  $f(x) = 2^x + \lg x$ ,  $f'(x) = 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 10}$ ;

б)  $f(x) = e^{-3x} + 2 \log_3 2x$ ,  $f'(x) = -3e^{-3x} + \frac{4}{2x \ln 3} = -3e^{-3x} + \frac{2}{x \ln 3}$ ;

в)  $f(x) = x^2 \cdot 5^{2x}$ ,  $f'(x) = 2x \cdot 5^{2x} + x^2 \cdot 2 \cdot 5^{2x} \cdot \ln 5 = 2 \cdot 5^{2x} \cdot x(1 + x \ln 5)$ ;

г)  $f(x) = \frac{\ln x}{e^x + e^{-x}}$ ,  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(e^x + e^{-x}) - \ln x(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2}$ .

**222.**

а)  $f(x) = \sin 3x + \cos 5x$ ,  $f'(x) = 3 \cos 3x - 5 \sin 5x$ ;

б)  $f(x) = \sqrt[4]{1 + x^2} + \frac{1}{(2x - 1)^3}$ ;  $f'(x) = \frac{2x}{4\sqrt[4]{(1 + x^2)^3}} - \frac{6}{(2x - 1)^4}$ ;

в)  $f(x) = (3 - 2x^3)^5$ ,  $f'(x) = 5(3 - 2x^3)^4 \cdot (-6x^2) = -30x^2(3 - 2x^3)^4$ ;

г)  $f(x) = \lg(3x) + 3\operatorname{tg}(2x - \frac{\pi}{4})$ ,

$$f'(x) = \frac{3}{3x \ln 10} + \frac{3 \cdot 2}{\cos^2\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{x \ln 10} + \frac{6}{\cos^2\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}.$$

**223.**

а)  $f'(x) = 4x^3 - 4x$ ,  $4x^3 - 4x = 0$ ,  $4x(x^2 - 1) = 0$ ,  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 1$ ,  $x_3 = -1$ ;

б)  $f'(x) = 3 \cos 2x - 5 \cos x - 1$ ,  $3 \cos 2x - 5 \cos x - 1 = 0$ ,

$$6 \cos^2 x - 3 - 5 \cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = y, \quad 6y^2 - 5y - 4 = 0,$$

$$y_1 = 1 \frac{1}{12}, \quad y_2 = -\frac{1}{2}; \quad \cos x = 1 \frac{1}{12} \text{ не имеет смысла};$$

$$\cos x = -\frac{1}{2}, \quad x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

в)  $f'(x) = -x^4 + 10x^2 - 9$ ,  $-x^4 + 10x^2 - 9 = 0$ ,  $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ ;

Пусть  $x^2 = y$ , тогда  $y^2 - 10y + 9 = 0$ ,  $y_1 = 9$ ,  $y_2 = 1$ ;  $x^2 = 9$ ,  $x^2 = 1$ ;  
 $x_1 = 3$ ,  $x_2 = -3$ ,  $x_3 = 1$ ,  $x_4 = -1$ ;

г)  $f'(x) = 1 - 2 \sin 2x$ ,  $1 - 2 \sin 2x = 0$ ,  $\sin 2x = \frac{1}{2}$ ,  $2x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**224.**

а) 1) а)  $f'(x) > 0$  в точке  $x_3$ ;

б)  $f'(x) < 0$  в точках  $x_1$ ,  $x_5$ ;

в)  $f'(x) = 0$  в точках  $x_2$  и  $x_4$ .

2) а)  $f'(x) > 0$  при  $x \in (x_2; x_4)$ ;

б)  $f'(x) < 0$  при  $x \in (a; x_2) \cup (x_4; b)$ ;

в)  $f'(x) = 0$  при  $x_2$  и  $x_4$ .

3) Функция имеет производную во всех точках  $(a; b)$ .

б) 1) а)  $f'(x) > 0$  в точках  $x_1$  и  $x_8$ ;

б)  $f'(x) < 0$  в точке  $x_6$ ;



в)  $f'(x) = 0$  в  $x_2, x_3, x_4, x_5, x_7$ .

2) а)  $f'(x) > 0$  при  $x \in (a; x_2) \cup (x_7; b)$ ;

б)  $f'(x) < 0$  при  $x \in (x_5; x_7)$ ;

в)  $f'(x) = 0$  при  $x \in (x_2; x_5)$  и в  $x_7$ .


3) Функция не имеет производной во всех  $x_2, x_5$ .



- в) 1) а)  $f'(x) > 0$  в  $x_1$  и  $x_4$ ;  
     б)  $f'(x) < 0$  в  $x_3, x_6$ ;  
     в)  $f'(x) = 0$  в  $x_2$ , и  $x_5$ .
- 2) а)  $f'(x) > 0$  при  $x \in (a; x_2) \cup (0; x_5)$ ;  
     б)  $f'(x) < 0$  при  $x \in (x_2; 0) \cup (x_5; b)$ ;  
     в)  $f'(x) = 0$  в  $x_2$  и  $x_5$ .
- 3) Производная не существует в точке 0.
- г) 1) а)  $f'(x) > 0$  в  $x_3$ ;  
     б)  $f'(x) < 0$  в  $x_1, x_5, x_6$ ;  
     в)  $f'(x) = 0$  в  $x_4$ .
- 2) а)  $f'(x) > 0$  при  $x \in (x_2; x_4)$ ;  
     б)  $f'(x) < 0$  при  $x \in (a; x_2) \cup (x_4; b)$ ;  
     в)  $f'(x) = 0$  в  $x_4$ .
- 3) Производная не существует в  $x_2$ .


**225.**

- а)  $y'(x_1) > y'(x_2)$ ;  
     б)  $y'(x_1) > y'(x_3)$ ;  
     в)  $y'(x_2) = y'(x_4)$ ;  
     г)  $y'(x_3) < y'(x_5)$ .



**226.**

- а)  $y'(x_1) < y'(x_2)$ ;  
     б)  $y'(x_3) > y'(x_5)$ ;  
     в)  $y'(x_4) = y'(x_5)$ ;  
     г)  $y'(x_2) > y'(x_4)$ .



**227.**

$$(uvw)' = (u \cdot (vw))' = u'(vw) + u(vw)' = u'vw + u(v'w + vw') = u'vw + uv'w + uw' ,$$

что требовалось доказать.

## 22. Применение производной к исследованию функций

**228.**  $f(x) \approx (x_0) + f'(x_0)\Delta x$ ; а)  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ ,  $f'(x) = x^2 - 1$ ,

$$f(x_1) \approx f(2) + f'(2) \cdot 0,0057 = \frac{8}{3} - 2 + 3 \cdot 0,0057 = \frac{2}{3} + 0,0171 =$$

$$= 0,6667 + 0,0171 = 0,6838 ;$$

$$f(x_2) \approx f(2) - f'(2) \cdot 0,021 \approx 0,6667 - 0,063 \approx 0,6037 \approx 0,604;$$

6)  $f(x) = 2 + 4x - x^2 + \frac{1}{4}x^4, \quad f'(x) = 4 - 2x + x^3; \quad x_1 = 3 + 0,005,$   
 $f(x_1) \approx f(3) + 0,005f'(3) = 2 + 12 - 9 + \frac{1}{4} \cdot 81 + 0,005(4 - 6 + 27) =$

$$= 5 + 20 \frac{1}{4} 0,005 \cdot 25 = 5 + 20,25 + 0,125 = 25,375; \quad x_2 = 2 - 0,02,$$

$$f(x_2) \approx f(2) - 0,02f'(2) = 2 + 8 - 4 + \frac{1}{4} \cdot 16 - 0,02(4 - 4 + 8) =$$

$$= 10 - 0,02 \cdot 8 = 10 - 0,16 = 9,84.$$

229. a)  $\sqrt{9,009} = \sqrt{9(1+0,001)} = 3\sqrt{1+0,001} \approx 3\left(1 + \frac{1}{2} \cdot 0,001\right) = 3 + 0,0005 = 3,0005;$

б)  $1,0001^{15} = (1 + 0,0001)^{15} = 1 + 15 \cdot 0,0001 = 1,0015;$


в)  $0,999^{-5} = (1 - 0,001)^{-5} \approx 1 - 0,001 \cdot (-5) = 1,005;$

г)  $\sqrt[3]{8,008} = \sqrt[3]{8(1,001)} = 2\sqrt[3]{1+0,001} \approx 2\left(1 + \frac{1}{3} \cdot 0,001\right) \approx 2 + \frac{2}{3} \cdot 0,001 \approx$   
 $\approx 2 + 0,666 \cdot 0,001 = 2,006.$

230.

а)  $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 7x + 18, \quad D(f) = (-\infty; \infty), \quad f'(x) = -x^2 + 8x - 7.$

критические точки:



$$f'(x) = 0, \quad -x^2 + 8x - 7 = 0, \quad x^2 - 8x + 7 = 0, \quad x_1 = 7, \quad x_2 = 1;$$

$$f'(0) < 0, \quad f(2) > 0, \quad f'(8) < 0;$$

$f(x)$  возрастает при  $x \in [1; 7]$ , убывает при  $x \in (-\infty; 1] \cup [7; \infty)$ ;

$$x_{\min} = 1, \quad x_{\max} = 7.$$

б)  $f(x) = \frac{2x^2}{3-x}, \quad D(f) = (-\infty; 3) \cup (3; \infty),$

$$f'(x) = \frac{4x(3-x) + 2x^2}{(3-x)^2} = \frac{-4x^2 + 12x + 2x^2}{(3-x)^2} = \frac{-2x^2 + 12x}{(3-x)^2}.$$

Критические точки:  $\frac{-2x^2 + 12x}{(3-x)^2}$


$$-2x^2 + 12x = 0, \quad -x(2x - 12) = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 6;$$

$$f'(-1) < 0, \quad f'(1) > 0, \quad f'(4) > 0, \quad f'(7) < 0;$$

$f(x)$  возрастает при  $x \in [0;3]$  и  $(3;6]$ , убывает при  $x \in (-\infty;0] \cup [6;\infty)$ ;  
 $x_{\min} = 0, \quad x_{\max} = 6;$

в)  $f(x) = \frac{x(x^3 - 4)}{2} = \frac{1}{2}(x^4 - 4x), \quad D(f) = (-\infty; \infty),$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (4x^3 - 4) = 2x^3 - 2; \quad f'(x) = 0, \quad 2x^3 - 2 = 0,$$



$$2(x^3 - 1) = 0, \quad x^3 = 1, \quad x = 1.$$

$f'(0) < 0, \quad f'(2) > 0; \quad f(x)$  возрастает при  $x \in [1; \infty)$ , убывает при  $x \in (-\infty; 1]$ ;  $x_{\min} = 1$ ;

г)  $f(x) = \frac{x}{4-x}, \quad D(f) = (-\infty; 4) \cup (4; \infty),$

$$f'(x) = \frac{4-x-x(-1)}{(4-x)^2} = \frac{4-x+x}{(4-x)^2} = \frac{4}{(4-x)^2}; \quad \text{при любом } x \neq 4 \quad x > 0,$$

поэтому функция возрастает на  $D(f)$ , экстремумов нет.

231. а)  $f(x) = \cos 2x - 2 \cos x, \quad D(f) = (-\infty; \infty),$

$$f'(x) = -2 \sin 2x + 2 \sin x; \quad -4 \sin x \cdot \cos x + 2 \sin x = 0,$$

$$-2 \sin x(2 \cos x - 1) = 0, \quad \sin x = 0 \quad \text{или} \quad 2 \cos x = 1, \quad x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{или}$$

$$\cos x = \frac{1}{2}, \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad f(x) \text{ возрастает при}$$

$$x \in \left[ -\frac{\pi}{3} + 2\pi n; 0 + 2\pi n \right] \cup$$

$$\cup \left[ \frac{\pi}{3} + 2\pi n; \pi + 2\pi n \right], \quad n \in \mathbb{Z},$$


убывает на

$$x \in \left[ -\pi + 2\pi n; -\frac{\pi}{3} + 2\pi n \right] \cup \left[ 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right], \quad n \in \mathbb{Z},$$


$$x_{\min} = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad x_{\max} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad x_{\max} = 0 + 2\pi n;$$

б)  $f(x) = 2 - \sin \frac{x}{2}, \quad D(f) = (-\infty; \infty), \quad f'(x) = -\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}; \quad -\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} = 0,$

$$\cos \frac{x}{2} = 0, \quad \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$



$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0, \quad f'\left(\frac{3\pi}{2}\right) > 0;$$




возрастает при  $x \in [\pi + 4\pi n; 3\pi + 4\pi n]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , убывает при  $x \in [-\pi + 4\pi n; \infty + 4\pi n]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_{\min} = \pi + 4\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$x_{\max} = 3\pi + 4\pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$\text{в)} \quad f(x) = 2 \sin x + 2 \cos 2x, \quad D(f) = (-\infty; \infty), \quad f'(x) = 2 \cos x - 2 \sin 2x;$$

$$2 \cos x - 2 \sin 2x = 0,$$

$$2 \cos x - 4 \sin x \cdot \cos x = 0,$$



$$2 \cos x (1 - 2 \sin x) = 0, \quad \cos x = 0 \quad \text{или} \quad \sin x = \frac{1}{2},$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad \text{возрастает при}$$

$$x \in \left[ -\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right], \quad n \in \mathbb{Z},$$

убывает при


$$x \in \left( \frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) \cup \left( \frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n \right), \quad x_{\max} = \frac{\pi}{6} + 2\pi n;$$

$$x_{\max} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad x_{\min} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{г)} \quad f(x) = 3x - \cos 3x, \quad D(f) = (-\infty; \infty), \quad f'(x) = 3 + 3 \sin 3x;$$

$$3 - 3 \sin 3x = 0, \quad \sin 3x = 1, \quad 3x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z},$$



$$f'(0) > 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0; \quad \text{возрастает на } (-\infty; \infty).$$


$$\text{232. а)} \quad f(x) = x^2(x-2)^2 = x^4 - 4x^3 + 4x^2;$$

$$1) \quad D(f) : x \in (-\infty; \infty); \quad 2) \quad E(f) : y \in (-\infty; 0];$$


$$3) \text{ нули: } x^2(x-2)^2 = 0,$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 2;$$

$$4) \text{ промежутки знакопостоянства:}$$



$$f(-2) > 0; \quad f(5) > 0; \quad f(1) > 0, \quad y \geq 0 \quad \text{при любом } x;$$



5)  $f(-x) = (-x)^2(-x-2)^2 = x^2(-x-2)^2 \neq f(x) \neq -f(x)$ ,

ни четная, ни нечетная;


6)  $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x$ ; найдем критические точки:

$$4x^3 - 12x^2 + 8x = 0, 4x(x^2 - 3x + 2) = 0, x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0,$$

возрастает при

$$x \in [0; 1] \cup [2; \infty],$$

убывает при  $x \in (-\infty; 0] \cup$



$$\cup [1; 2], x_{\min} = 0, x_{\max} = 2, x_{\text{max}} = 1, f'(3) > 0, f(0) = 0,$$

$$f(1) = 1, f(2) = 0;$$


6)  $f(x) = \frac{8}{x} + \frac{x}{2} = \frac{16+x^2}{2x}$ ;

1)  $D(f) : x \in (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$ ; 2)  $E(f) : y \in (-\infty; 4) \cup (4; \infty)$ ;

3) нулей нет;

4) знакопостоянство:

$$y > 0 \text{ при } x > 0, y < 0 \text{ при } x < 0;$$




5)  $f(-x) = \frac{16+(-x)^2}{2(-x)} = -\frac{16+x^2}{2x} = -f(x)$  —

нечетная;

6)  $f'(x) = \frac{2x \cdot 2x - (16+x^2)2}{4x^2} =$

$$= \frac{4x^2 - 32 - 2x^2}{4x^2} =$$

$$= \frac{2x^2 - 32}{4x^2} = \frac{x^2 - 16}{2x^2};$$




7) критические точки:  $\frac{x^2 - 16}{2x^2} = 0, x_1 = 4, x_2 = -4$ ;

$$f'(-4) > 0, f(1) < 0, f'(-1) < 0, f'(-5) > 0; x_{\max} = -4,$$

$$f(-4) = -4, x_{\min} = 4,$$


$$f(4) = 4,$$



возрастает при  $x \in (-\infty; -4] \cup [4; \infty)$ ,

убывает при  $x \in [4; 0) \cup (0; 4]$ ;

- в)  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ ;
- 1)  $D(f) : x \in (-\infty; \infty)$ ;
  - 2)  $E(f) : y \in (-\infty; \infty)$ ;
  - 3) нули:  $x^3 - 3x^2 - 9x = 0$ ,  
 $x(x^2 - 3x - 9) = 0$ ,  
 $x_1 = 0$ ,  
 $x_2 = \frac{3+3\sqrt{5}}{2}$ ,  $x_3 = \frac{3-3\sqrt{5}}{2}$ ;



4) знак:  $f(20) > 0$ ;

$$\begin{array}{ccccccc} - & + & - & + \\ \hline -\circ & \circ & -\circ & +\circ \\ \frac{3-3\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3+3\sqrt{5}}{2} \end{array} \rightarrow$$

5)  $f'(-x) = (-x)^3 - 3(-x^2) - 9(-x) = -x^3 - 3x^2 + 9x \neq f(x) \neq -f(x)$  –  
ни четная, ни нечетная;

6)  $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ ; найдем критические точки:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 6x - 9 &= 0, \\ x^2 - 2x - 3 &= 0, \\ x_1 = 3, \quad x_2 = -1; \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccc} + & - & + \\ \hline -\circ & \circ & +\circ \\ -1 & 3 \end{array} \rightarrow$$

возрастает при  $x \in (-\infty; -1] \cup [3; \infty)$ , убывает при  $x \in [-1; 3]$ ,

$x_{\max} = -1$ ,  $x_{\min} = 3$ ,  $f(-1) = 5$ ,  $f(3) = -27$ ;

г)  $f(x) = \frac{x}{4-x^2}$ ;

- 1)  $D(f) : x \in (-\infty; 2) \cup (-2; 2) \cup (2; \infty)$ ;
- 2)  $E(f) : y \in (-\infty; \infty)$ ;


3) нули:  $\frac{x}{4-x^2} = 0$ ,  $x = 0$ ,

4) знак:

$$\begin{array}{ccccc} + & - & + & - \\ \hline +\circ & \circ & -\circ & +\circ \\ -2 & 0 & 2 \end{array} \rightarrow$$


$f(3) < 0$ ,  $f(1) > 0$ ,  $f(-1) < 0$ ,  $f(-3) > 0$ ;

5)  $f(-x) = \frac{-x}{4-(-x)^2} = -\frac{x}{4-x^2}$  – функция нечетная;



$$6) f(x) = \frac{4-x^2 - x(-2x)}{(4-x^2)^2} = \frac{4-x^2 + 2x^2}{(4-x^2)^2} = \frac{x^2 + 4}{(4-x^2)^2};$$

$x = \pm 2$  – точки разрыва функции;



возрастает при  $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; \infty)$ ,  $f(5) > 0$ ,

$f'(0) > 0$ ,  $f'(-5) > 0$ , экстремумов нет.

**233.**

a)  $f(x) = 1 - 2 \sin 2x$ ;

1)  $D(f) : x \in (-\infty; \infty)$ ;

2)  $E(f) : y \in [-1; 3]$ ;



3) нули:  $1 - 2 \sin 2x = 0$ ,

$$\sin 2x = \frac{1}{2}, \quad 2x =$$

$$= (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z,$$

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z,$$

4) знак:




5)  $f(-x) = 1 - 2 \sin(-2x) = 1 + 2 \sin 2x \neq f(x) \neq -f(x)$  – ни четная, ни нечетная;

6)  $f'(x) = -4 \cos 2x$ ;

критические точки:  $-4 \cos 2x = 0$ ,  $2x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ ,  $n \in Z$ ,  $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$ ,

$n \in Z$ ; возрастает при

$$x \in \left[ -\frac{3\pi}{4} + \pi n; -\frac{\pi}{4} + \pi n \right], \quad n \in Z,$$



убывает при  $x \in \left[ -\frac{\pi}{4} + \pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n \right]$ ,  $n \in Z$ ,

$$x_{\max} = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in Z, \quad x_{\min} = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in Z, \quad f\left(-\frac{\pi}{4} + \pi n\right) = 3, \quad n \in Z,$$

$$f\left(\frac{\pi}{4} + \pi n\right) = -1, \quad n \in Z;$$

7) периодическая с  $T = \pi$ ;

b)  $f(x) = \cos^2 x - \cos x$ ;

1)  $D(f) : x \in (-\infty; \infty)$ ;



2)  $E(f) : y \in [-\frac{1}{4}; 2]$ ;

3) нули:  $\cos^2 x - \cos x = 0$ ,  
 $\cos x(\cos x - 1) = 0$ ,

$$\cos x_1 = 0 \text{ или } \cos x_2 - 1 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\cos x_2 = 1, \quad x_2 = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z};$$

4) знак:



5)  $f(-x) = \cos^2(-x) - \cos(-x) = \cos^2 x - \cos x$  – четная;


6)  $f'(x) = -2 \cos x \cdot \sin x + \sin x = \sin x(1 - 2 \cos x)$ ;

критические точки:  $\sin x(1 - 2 \cos x) = 0$ ,  $\sin x_1 = 0$  или

$$1 - 2 \cos x = 0, \quad x_1 = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \cos x = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$x_3 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$x_{\max} = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$



$$x_{\min} = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad x_{\max} = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z};$$


$$f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{4}, \quad f(0) = 0, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}, \quad f(\pi) = 2; \text{ возрастает при}$$

$$x \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; 0 + 2\pi n\right] \cup \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \pi + 2\pi n\right], \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\text{убывает при } x \in \left[2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right] \cup \left[\pi + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n\right], \quad n \in \mathbb{Z};$$

7) периодическая с  $T = 2\pi$ ;

b)  $f(x) = 3 - \cos \frac{x}{2}$ ;




1)  $D(f) : x \in (-\infty; \infty)$ ; 2)  $E(f) : y \in [2; 4]$ ;

3) нули:  $3 - \cos \frac{x}{2} = 0, \cos \frac{x}{2} = 3$ , нет корней;

4)  $y > 0$  при всех  $x \in D(f)$ ;

5)  $f(-x) = 3 - \cos(-\frac{x}{2}) = 3 - \cos \frac{x}{2}$  – четная;

6)  $f'(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$ ;



критические точки:  $\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} = 0, \frac{x}{2} = \pi n, x = 2\pi n, n \in Z$ ;

возрастает на  $[0 + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n], n \in Z$ , убывает на

$[2\pi + 2\pi n; 4\pi + 2\pi n], n \in Z$ ;  $x_{\max} = 2\pi + 4\pi n, n \in Z$ ,

$f(2\pi) = 4, x_{\min} = 4\pi n, n \in Z, f(0) = 2$ .

7) периодическая с  $T = 4\pi$ ;

г)  $f(x) = \sin^2 x - \sin x$ ;

1)  $D(f) : x \in (-\infty; \infty)$ ;


2)  $E(f) : y \in [-\frac{1}{4}, 2]$ ;

3) нули:

$$\sin^2 x - \sin x = 0, \sin x(\sin x - 1) = 0,$$

$$\sin x_1 = 0 \text{ или } \sin x_2 = 1, x_1 = \pi n, n \in Z, x_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z;$$

4) знак:




5)  $f(x) = \sin^2(-x) - \sin(-x) = \sin^2 x + \sin x \neq f(x) \neq -f(x)$  –

ни четная, ни нечетная;

6)  $f'(x) = 2 \sin x \cdot \cos x - \cos x$ ;

критические точки:  $2 \sin x \cdot \cos x - \cos x = 0$ ,

$$\cos x(2 \sin x - 1) = 0, \cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \sin x = \frac{1}{2},$$



$x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$ , возрастает при

$$x \in \left[ \frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n \right], \text{ убывает при}$$

$$x \in \left[ -\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right], n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z},$$

$$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, x_{\min} = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{4}, f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2.$$

7) периодическая с  $T_0 = 2\pi$ .

**234.**

a)  $f(x) = \sqrt{x} \ln x ; 1) D(f): x \in (0; \infty);$

2)  $E(f): y \in \left[ -\frac{2}{e^2}; \infty \right);$

3) нули:  $\sqrt{x} \ln x = 0, x_1 = 0,$

$x_2 = 1; 0 \in D(f);$

4) знак:

5) ни четная, ни нечетная;


6)  $y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x};$

критические точки:

$$\frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} = 0, \frac{x \ln x + 2x}{2x\sqrt{x}} = 0, x \ln x + 2x = 0, x(\ln x + 2) = 0,$$

$x_1 = 0, \ln x_2 = -2, 0 \in D(f), x_2 = e^{-2};$  возрастает при  $x > e^{-2},$

убывает при  $x \in (0; e^{-2}); x_{\min} = e^{-2}, f\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e}.$






7) не периодическая.

6)  $f(x) = \frac{e^x}{x}; 1) D(f): x \in (-\infty; 0) \cup (0; \infty);$

2)  $E(f): y \in (-\infty; 0) \cup [e; \infty);$

3) нулей нет;

4) знак:



$y > 0$  при  $x > 0$ ,  $y < 0$  при  $x < 0$ ;

5)  $f(-x) = \frac{e^{-x}}{-x} = -\frac{1}{xe^x} \neq f(x) \neq -f(x)$  — ни четная, ни нечетная;

6)  $f'(x) =$  критические точки:

$$\frac{e^x x - e^x}{x^2} = 0, \quad \frac{e^x(x-1)}{x^2} = 0, \quad x=1, \quad \begin{array}{c} - \\ 0 \\ + \end{array} \quad \begin{array}{c} - \\ 1 \\ + \end{array}$$

убывает при  $x \in (-\infty; 0)$  и  $(0; 1]$ , возрастает при

$x \in [1; \infty)$ ;  $x_{\min} = 1$ ,  $f(1) = e$ ;

7) не периодическая;

в)  $f(x) = 2^{x^2-4x}$ ;

1)  $D(f) : x \in (-\infty; \infty)$ ;

2)  $E(f) : y \in [\frac{1}{16}; \infty)$ ;


3) нулей нет;

4)  $y > 0$  при всех  $x \in D(f)$ ;

5)  $f(-x) = 2^{(-x)^2-4(-x)} = 2^{x^2+4x} \neq f(x) \neq -f(x)$  — ни четная, ни нечетная;

6)  $f'(x) = 2^{x^2-4x} \cdot \ln 2 \cdot (2x-4)$ ;

$$2^{x^2-4x} \cdot \ln 2 \cdot (2x-4) = 0, \quad \begin{array}{c} - \\ 2 \\ + \end{array}$$



возрастает при  $x \in [2; \infty)$ , убывает при  $x \in (-\infty; 2]$ ,

$x_{\min} = 2$ ,  $f(2) = \frac{1}{16}$ ;

7) не периодическая;

г)  $f(x) = x - \ln x$ ;

1)  $D(f) : x \in (0; \infty)$ ; 2)  $E(f) : y \in [1; \infty)$ ; 3) нулей нет;

4) знак  $y > 0$  при всех  $x$ ;

5) ни четная, ни нечетная;

6)  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ ;

критические точки:


$$\frac{x-1}{x} = 0, \quad x = 1,$$

убывает при  $x \in (0; 1]$ ,

возрастает при  $x \in [1; \infty)$ ,

$x_{\min} = 1$ ,  $f(1) = 1$ ;

7) не периодическая.



**235.** а) Найдем значения функции на концах промежутка:

$$f(1) = 18 \cdot 1 + 8 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = 18 + 8 - 3 = 23, \quad f(3) = 18 \cdot 9 + 8 \cdot 27 - 3 \cdot 81 = 135.$$

Критические точки функции:

$$f'(x) = 36x + 24x^2 - 12x^3, \quad 36x + 24x^2 - 12x^3 = 0,$$

$$3x + 2x^2 - x^3, \quad x(3 + 2x - x^2) = 0, \quad x_1 = 0,$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0, \quad x_2 = 3, \quad x_3 = -1, \quad -1 \in [1; 3].$$

Значение функции в критической точке:  $f(0) = 0$ .

Ответ: наибольшее значение функции равно 135, наименьшее – 0.

б)  $f(0) = 2 \cos 0 - \cos 0 = 2 - 1 = 1, \quad f(\pi) = 2 \cos \pi - \cos 2\pi = -2 - 1 = -3,$

$$f'(x) = -2 \sin x + 2 \sin 2x, \quad -2 \sin x + 2 \sin 2x = 0, \quad -2 \sin x + 4 \sin x \cdot \cos x = 0,$$

$$-2 \sin x(1 - 2 \cos x) = 0, \quad \sin x = 0, \quad \cos x = \frac{1}{2}, \quad x = \pi, \quad x = \frac{\pi}{3},$$

$$f(\pi) = -3, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{3} = 1 \frac{1}{2}.$$

в)  $f(x) = \frac{2}{x} + x^2, \quad [\frac{1}{2}; 1],$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 + \frac{1}{4} = 4 \frac{1}{4}, \quad f(1) = \frac{2}{1} + 1 = 3, \quad f'(x) = -\frac{2}{x^2} + 2x,$$

$$f'(x) = 0, \quad -\frac{2}{x^2} + 2x = 0, \quad -2 + 2x^3 = 0, \quad x^3 = 1, \quad x = 1, \quad f(1) = 3.$$

г)  $f(x) = \sin x - x, \quad [-\pi; \pi], \quad f(-\pi) = \sin(-\pi) - (-\pi) = \pi,$

$$f(\pi) = \sin \pi - \pi, \quad f'(x) = \cos x - 1, \quad \cos x - 1 = 0, \quad \cos x = 1, \quad x = \frac{\pi}{2}, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Ответ: наибольшее значение функции  $\pi$ , наименьшее  $-\pi$ .

**236.** Если первое слагаемое  $x$ , то второе слагаемое  $10 - x$ .

Исследовав функцию  $y = x^3 + (10 - x)^3$  на  $[0; 10]$ , найдем её

а) наибольшее; б) наименьшее значения на этом промежутке.

$$f(0) = 1000, \quad f(10) = 1000, \quad f'(x) = 60x - 300, \quad 60x - 300 = 0, \quad x = 5;$$

$$f(5) = 125 + 125 = 250.$$

**237.** Пусть первый катет  $x$  см, тогда второй  $20 - x$  см. Исследуем


функцию  $S(x) = \frac{1}{2}x(20 - x)$ , равную площади этого треугольника,

найдем её наибольшее значение на  $D(S)$ .

$$S'(x) = 10 - x, \quad S'(15) < 0, \quad S'(5) > 0,$$

10 – точка максимума.


Ответ: I, II катеты по 10 см.



**238.** Пусть одна диагональ  $x$  см, вторая  $12 - x$  см. Сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех его сторон.  
 $P(x) = x^2 + (12 - x)^2$  на  $D(P)$ .

$$P'(x) = 4x - 24, \quad 4x - 24 = 0, \quad x = 6,$$

$x = 6$  – точка минимума, значит,  $S(6) = 72$  – наименьшее значение.  
 Ответ:  $72 \text{ см}^2$ .




**239.**

Пусть первая машина находится в пункте  $B$ , а вторая в пункте  $A$ . Когда первая машина прибудет в пункт  $D$ , а вторая машина в пункт  $E$ . Это время обозначим  $t$ .

$$DC = 2 - 40t, \quad EC = 3 - 50t,$$

$$DE = \sqrt{(2 - 40t)^2 + (3 - 50t)^2}.$$




Рассмотрим функцию  $S(t) = \sqrt{(2 - 40t)^2 + (3 - 50t)^2}$  и найдем её наименьшее значение на  $M(S)$ .

$$S'(t) = \frac{8200t - 460}{2\sqrt{(2 - 40t)^2 + (3 - 50t)^2}}, \quad 8200t - 460 = 0, \quad t = \frac{23}{410},$$

$$(2 - 40t)^2 + (3 - 50t)^2 = 4 - 160t + 1600t^2 + 9 - 300t + 2500t^2 = 4100t^2 - 460t,$$

$\frac{23}{410}$  – точка минимума, значит,  $S\left(\frac{23}{410}\right)$  – наименьшее.



**240.**

Пусть наблюдатель находится за  $x$  м от стены в точке  $O$ .  $\angle EOB$ ;


$\angle EOB = \angle EOA - \angle BOA$ , поэтому:

$$\operatorname{tg} \angle EOB = \operatorname{tg}(\angle EOA - \angle BOA) =$$

$$= \frac{\frac{3,2}{x} - \frac{1,8}{x}}{1 + \frac{3,2}{x} \cdot \frac{1,8}{x}} = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76},$$

$$f(x) = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76}. \quad \text{Так как } 0 < \angle EOB < \frac{\pi}{2} \text{ и при } \alpha \in (0; \frac{\pi}{2}); \operatorname{tg} \alpha$$

возрастает, то найдем  $x$ , при котором  $f(x)$  принимает наибольшее значение на  $(0; \infty)$ .




$$f'(x) = \frac{(x^2 + 5,76) - x \cdot 2x}{(x^2 + 5,76)^2} \cdot 1,4 = \frac{1,4(5,76 - x^2)}{(x^2 + 5,76)^2}; \quad f'(x) = 0 \text{ при } x = 2,4.$$

При  $x \in (2,4; \infty)$   $f'(x) < 0$ , при  $x \in (2,4; \infty)$   $f(x) < f(2,4)$ .  
аналогично,  $f(x) < f(2,4)$  для  $x \in (0; 2,4)$ . Значит,  $f_{\max} = f(2,4)$ .

### 241.

Пусть наблюдатель находится за  $x$  м от статуи в точке  $O$ .

$$\begin{aligned} \angle AOB &= \angle AOC - \angle BOC, \quad BC = 4 \text{ м.} \\ \operatorname{tg} \angle AOB &= \operatorname{tg}(\angle AOC - \angle BOC) = \\ &= \frac{\frac{8}{x} - \frac{4}{x}}{1 + \frac{8}{x} \cdot \frac{4}{x}} = \frac{4x}{x^2 + 32} = f(x). \end{aligned}$$



$\angle AOB \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ , а на  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$   $\operatorname{tg} \alpha$  возрастает.

$$f'(x) = \frac{4(x^2 + 32) - 4x \cdot 2x}{(x^2 + 32)^2} = \frac{128 - 4x^2}{(x^2 + 32)^2} = \frac{4(32 - x^2)}{(x^2 + 32)^2};$$

$f' = 0$  при  $x = \pm\sqrt{32} = \pm 4\sqrt{2}$ .  $f_{\max} = f(4\sqrt{2})$ . Ответ:  $4\sqrt{2}$  м.

**242.** По теореме Пифагора  $R^2 = l^2 - h^2$ ,  $R^2 = 400 - h^2$ , где  $l$  – образующая;  $R$  – радиус оснований;  $h$  – высота конуса. Объем конуса равен:  $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi(400h - h^3)$  (см<sup>3</sup>). Таким образом, нужно найти наибольшее значение функции  $f(h) = 400h - h^3$  на  $[0; 20]$ .

$$f'(h) = 400h - h^3, \quad f'(h) = 0 \text{ при } h = \frac{20}{\sqrt{3}}. \quad \text{Имеем } f(0) = f(20) = 0,$$

а  $f\left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right) > 0$ , поэтому наибольшее значение  $f(h)$  при  $h = \frac{20}{\sqrt{3}}$ .

### 243.


Из теоремы Пифагора:

$$\Delta AOB : AB^2 = AO^2 - BO^2, \text{ т.е.}$$

$$r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}, \quad \text{где } r \text{ – радиус основания}$$

цилиндра;  $h$  – высота;

$$V = \pi r^2 h = \pi(R^2 h - \frac{h^3}{4}).$$



Определим наибольшее значение функции  $V(h) = \pi(R^2 h - \frac{h^3}{4})$  на  $[0; 2R]$ .

$$V'(h) = \pi(R^2 - \frac{3}{4}h^2), V'(h) = 0 \text{ при } 3h^2 = 4R^2, \text{ т.е. при } h = \frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

Т.к. как  $V(0) = V(2R) = 0$ , а  $V\left(\frac{2R}{\sqrt{3}}\right) = V_{\max}$ , то функция  $V(h)$

достигает наибольшего значения при  $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ . Ответ:  $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ .


**244.** Пусть  $h$  высота цилиндра, тогда  $\frac{r}{R} + \frac{h}{H} = \frac{OB}{OA} + \frac{AB}{OA} = 1$ .

Преобразовав, получим

$$h = \frac{(R-r)H}{R}. \quad \text{Далее полная поверхность}$$

цилиндра равна:

$$\begin{aligned} S(r) &= 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi \left(r^2 + \frac{r(R-r)H}{R}\right) = \\ &= 2\pi \frac{r^2(R-H) + rRH}{R} \end{aligned}$$



Найдем наибольшее значение  $S(r)$  при  $V \in (0; R)$ . Функция  $S$  квадратичная при  $R \neq H$ , поэтому она может достигать наибольшего значения, если «ветви» параболы направлены вниз и абсцисса  $r_0$  вершины параболы лежит на этом интервале.

$$r_0 = -\frac{RH}{2(R-H)}, \text{ и: 1) } R-H < 0 \text{ и 2) } -\frac{RH}{2(R-H)} < R, \text{ т.е. } H < 2(H-R),$$

значит  $R < \frac{H}{2}$ . При  $R = H$  получаем, что  $S(r) = 2\pi r H$ , функция не имеет наибольшего значения на  $(0; R)$ . Ответ:  $R = H$ .


**245.** Пусть  $h$  и  $r$  высота и радиус основания цилиндра, соответственно, а  $H$  и  $R$  высота и радиус основания конуса. Получим:

$$\frac{r}{R} + \frac{h}{H} = \frac{OB}{OA} + \frac{AB}{OA} = 1, \text{ откуда}$$

$$H = \frac{Rh}{R-2}, V(R) = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{\pi R^2 h}{3(R-r)}.$$

Найдем наименьшее значение функции  $V(R)$  на  $(2; \infty)$ .

$$V'(R) = \frac{\pi h(2R^3 - 3R^2 r)}{3(R-r)^2};$$



$V'(R) = 0$  при  $2R^3 = 3R^2r$ ,  $R = 1,5r$ . Итак,  $V(1,5r) = V_{\min}$  на  $(r; \infty)$ , так как  $V$  убывает на  $(r; 1,5r)$  и возрастает на  $[1,5; \infty)$ .

**246.**

Рассмотрим осевое сечение конуса.

$$\Delta OEA \sim \Delta BEC.$$

$$\text{Отсюда: } \frac{OA}{EO} = \frac{BC}{EB}, \text{ т.е.}$$

$$\frac{R}{H-R} = \frac{x}{\sqrt{H^2+x^2}}, \text{ значит, } \frac{R^2}{(H-R)^2} = \frac{x^2}{H^2+x^2}.$$

$$R^2 H^2 + R^2 x^2 = (H-R)^2 x^2, \quad x^2((H-R)^2 - R^2) = R^2 H^2, \text{ откуда}$$

$$x^2 = \frac{R^2 H}{H-2R}. \text{ Таким образом, } V = \frac{1}{3} \pi x^2 H = \frac{1}{3} \frac{\pi R^2 H^2}{H-2R}.$$

Найдем наименьшее значение  $V(H)$  на  $(2R; \infty)$ .

$$V'(H) = \frac{\pi R^2 (H^2 - 4RH)}{3(H-2R)^2} \quad \text{и} \quad V'(H) = 0 \quad \text{при} \quad H=4R. \quad V \text{ убывает при}$$



$H \in (2R; 4R)$  и возрастает при  $H \in (4R; \infty)$ , значит  $V(4R) = V_{\min}$  на  $(2R; \infty)$ .  
Ответ:  $4R$ .

**247.** Рассмотрим осевое сечение конуса.  $\Delta AOC \sim \Delta OBC$ , значит:

$$\frac{x^2}{\sqrt{H^2+x^2}} = \frac{R}{H}, \text{ поэтому } x^2 = \frac{H^2 R^2}{H^2 - R^2};$$

$$V(H) = \frac{1}{3} \pi x^2 H = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot \frac{H^3}{H^2 - R^2};$$

$$V'(H) = \frac{\frac{1}{3} \pi R^2 ((H^2 - R^2) 3H^2 - H^3 2H)}{(H^2 - R^2)} = \\ = \frac{\pi R^2 (H^4 - 3H^2 R^2)}{3(H^2 - R^2)^2}.$$



$V'(H) = 0$  если  $H = R\sqrt{3}$ , Ответ:  $H = R$ .

**248.**  $h^2 = D^2 - b^2$ . Прочность балки  $R$  выражается формулой  $R = kh^2$ . Также  $R(b) = kb(D^2 - b^2) = kb(1600 - b^2)$ . Найдем наибольшее значение функции  $R(b)$  на промежутке  $[0; 40]$ .

$$R'(b) = k(1600 - 3b^2) \text{ и } R'(b) = 0 \text{ при } b = \frac{40}{\sqrt{3}}.$$

$$R(0) = R(40) = 0, \quad R\left(\frac{40}{\sqrt{3}}\right) > 0, \quad \text{значит, наибольшее значение } R$$

достигает при  $b = \frac{40}{\sqrt{3}}$ , при этом  $h = 40\sqrt{\frac{2}{3}}$ .

**249.**

Пусть периметр равен  $P$ . Площадь окна

$$\begin{aligned} S(R) &= 2R \cdot \frac{1}{2}(P - 2R - \pi R) + \frac{1}{2}\pi R^2 = \\ &= PR - 2R^2 - \pi R^2 + \frac{1}{2}\pi R^2 = PR - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)R^2. \end{aligned}$$

Функция  $S(R)$  – квадратичная  $a_0 < 0$ , следовательно, имеет точку максимума:

$$S'(R) = P - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 2R = P - (4 + \pi)R, \quad S'(R) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad 2R = \frac{P}{4 + \pi}$$

при  $R = \frac{P}{4 + \pi}$ .

$$\text{Тогда } \frac{1}{2}(P - (2 + \pi)R) = \frac{1}{2}(P - \frac{2 + \pi}{4 + \pi}P) = \frac{1}{2}P \cdot \frac{4 + \pi - 2 - \pi}{4 + \pi} = \frac{P}{4 + \pi}, \quad \text{т.е.}$$

прямоугольная часть окна на самом деле имеет форму квадрата.

**250.**

Пусть  $BC = 2x$ , а  $AH = y$ . Тогда  $S = xy$ . Далее в прямоугольном  $\Delta ABE$ , поэтому  $BH^2 = EH \cdot HA$ , или  $x^2 = y(2R - y)$  и  $S^2 = x^2y^2 = y^3(2R - y)$ .


Найдем наибольшее значение функции  $f(y) = y^3(2R - y)$  на  $[0; 2R]$ .

$$f'(y) = -4y^3 + 6Ry^2, \quad f'(y) = 0 \quad \text{при } y = 0 \text{ и}$$

$$y = 1,5R. \quad f(0) = f(2R) = 0, \quad f(1,5R) = \frac{27}{16}R^4.$$

Таким образом, площадь треугольника наибольшая, если хорда проведена на расстоянии  $1,5R$  от точки касания.

Ответ:  $1,5R$  от точки касания.




**251.**

Если основание треугольника  $2b$ , и угол при основании  $2\alpha$ , то  $r = OH = HC \cdot \operatorname{tg}\alpha = b \operatorname{tg}\alpha$ . Выразим  $b$  через заданную площадь  $S$

$$\text{треугольника: } S = 0,5 \cdot AC \cdot BH = b \cdot b \operatorname{tg}\alpha, \quad \text{значит, } b^2 = \frac{S}{\operatorname{tg}2\alpha}. \quad \text{Найдем}$$

наибольшее значение квадрата радиуса:



$$r^2 = b^2 \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{S \operatorname{tg}^2 \alpha}{\frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha) \operatorname{tg}^2 \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha}.$$


Пусть  $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}^3 \alpha = u(\alpha)$ . Найдем наибольшее значение функции  $u(\alpha)$  на  $[0; \frac{\pi}{4}]$ .

$$u'(a) = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{3 \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha};$$

$$u'(a) = 0 \text{ при } \operatorname{tg} \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \text{ т.е. при } \alpha = \pi k \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}. x_0 = \frac{\pi}{6},$$

$$x_0 \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]. \text{ Далее: } u(0) = u\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 \text{ и } u\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}. u_{\max}(\alpha) = u\left(\frac{\pi}{6}\right).$$


при вершине равен  $\pi - 4\alpha = \frac{\pi}{3}$ .



**252.**

Расстояние между точкой на параболе и данной точкой  $A$  равно:

$$r(x) = \sqrt{(2-x)^2 + \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2}.$$



$f(x) = r^2(x)$ ; так как  $r(x) > 0$  для всех  $x$ , их минимумы должны совпадать.

$$f'(x) = 2(2-x)(-1) + 2\left(x^2 - \frac{1}{2}\right) \cdot 2x = -4 + 2x + 4x - 2x = 4x^3 - 4 = 4(x^3 - 1), f'(x) = 0$$

при  $x = 1$ , причем при  $x < 1$  имеем  $f'(x) < 0$ , при  $x > 1$  имеем  $f'(x) > 0$ , значит  $x = 1$  – точка минимума функции  $f(x)$  и,

следовательно, функции  $r(x)$ .

Ответ:  $(1; 1)$ .

**253.** Если сторона основания  $x$ , то площадь основания  $\frac{x^2 \sqrt{3}}{4}$ , а

$$\text{объем равен: } \frac{hx^2 \sqrt{3}}{4} \quad (h - \text{высота призмы}), \text{ значит } h = \frac{4V}{x^2 \sqrt{3}}.$$

Поверхность  $S(x) \quad x \in (0; \infty)$ .  $S'(x) = x\sqrt{3} - \frac{4V\sqrt{3}}{x^2}$ .  $S'(x) = 0$  при

$x^3 = 4V$ .  $S(x)$  убывает при  $x \in (0; \sqrt[3]{4V})$  и возрастает при  $x \in (\sqrt[3]{4V}; \infty)$ , значит  $S(\sqrt[3]{4V})$  – наименьшее значение  $S$  на  $(0; \infty)$ . Ответ:  $\sqrt[3]{4V}$ .

## 23. Применения производной в физике и геометрии

**254.** а)  $x_1(t) = 2 \frac{2}{3} t^3$ ,  $x_2(t) = 2t - 3$ ;

$$x'_1(t) = 8t^2, \quad x'_2(t) = 2, \quad v_1(t) < v_2(t) \quad \text{при}$$

$$8t^2 < 2, \quad 4t^2 < 1, \quad t^2 < \frac{1}{4}, \quad -\frac{1}{4} < t < \frac{1}{4}.$$

б)  $x_1(t) = 9t^2 + 1$ ,  $x_2(t) = t^3$ .  $v_1(t) = 18t$ ,  $v_2(t) = 3t^2$ ,  $v_1(t) < v_2(t)$  при  
 $18t < t^2$ ,  $t^2 - 18t > 0$ ,  $t(t-18) > 0$ ,  $t > 0$  и  $t > 18$ .

**255.**  $\varphi(t) = 0,1t^2 - 0,5t + 0,2$ ;  $\omega(t) = \varphi'(t) = 0,2t - 0,5$ ;

$$\omega(20) = 0,2 \cdot 20 - 0,5 = 3,5 \left( \frac{\text{рад}}{\text{с}} \right).$$

**256.**

$$r'(t) = 0,01(\text{см}/\text{с}), \quad S(t) = \pi r^2(t), \quad S'(t) = 2\pi r(t)r'(t); \quad \text{при } r = 2 \text{ см}$$


$$S' = 2\pi \cdot 2 \cdot 0,01 = 0,04\pi \text{ см}^2/\text{с}.$$

**257.**

$$s_1(t) = 5t, \quad s_2(t) = 2t^2 - t.$$

Найдем расстояние между телами

$$\begin{aligned} s^2(t) &= s_1^2(t) + s_2^2(t) - \\ &- 2s_1(t)s_2(t) \cdot \cos 60^\circ = \\ &= s_1^2(t) + s_2^2(t) - s_1(t)s_2(t), \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} s(t) &= \sqrt{s_1^2(t) + s_2^2(t) - s_1(t)s_2(t)} = \sqrt{25t^2 + (2t^2 - t)^2 - 5t(2t^2 - t)} = \\ &= \sqrt{25t^2 + 4t^4 - 4t^3 + t^2 - 10t^3 + 5t^2} = \sqrt{4t^4 - 14t^3 + 31t^2}; \end{aligned}$$

скорость удаления тел друг от друга равна:

$$\begin{aligned} s'(t) &= \frac{1}{2}(4t^4 - 14t^3 + 31t^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (16t^3 - 42t^2 + 62t) = \frac{2(8t^3 - 21t^2 + 31t)}{2\sqrt{4t^4 - 14t^3 + 31t^2}} = \\ &= \frac{t(8t^2 - 21t + 31)}{t\sqrt{4t^2 - 14t + 31}} = \frac{8t^2 - 21t + 31}{\sqrt{4t^2 - 14t + 31}}. \quad \text{При } t = 3: \\ s'(3) &= \frac{8 \cdot 9 - 21 \cdot 3 + 31}{\sqrt{4 \cdot 9 - 14 \cdot 3 + 31}} = \frac{72 - 63 + 31}{\sqrt{36 - 42 + 31}} = \frac{40}{\sqrt{25}} = 8 \text{ (км/ч)}. \end{aligned}$$

**258.**

Пусть  $A$  удалена от нуля на  $x$  м,

$$x(t) = 2t \text{ (м)};$$

Расстояние от  $B$  до начала координат

$$y(t) = \sqrt{25 - x^2(t)} = \sqrt{25 - 4t^2}.$$

Скорость  $B$  равна:

$$y'(t) = \frac{-8t}{2\sqrt{25-4t^2}} = \frac{-4t}{\sqrt{25-4t^2}};$$

в момент, когда  $x = 3$  (м),  $t = \frac{3}{2}$  (с),

$$\text{значит, } y'\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{4 \cdot \frac{3}{2}}{\sqrt{25 - 4 \cdot \frac{9}{4}}} = -\frac{6}{\sqrt{25-9}} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}.$$

**259.  $x(t) = 2t$**

Верхний конец лестницы находится на высоте  $y = \sqrt{25 - x^2}$ ,

$$y(t) = \sqrt{25 - 4t^2};$$

скорость движения верхнего конца

$$y'(t) = \frac{1}{2}(25 - 4t^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-8t) = \\ = \frac{-8t}{2\sqrt{25-4t^2}} = -\frac{4t}{\sqrt{25-4t^2}};$$

скоростью конца лестницы является  $\frac{4t}{\sqrt{25-4t^2}}$ ; Найдем ускорение:


$$y''(t) = \frac{4\sqrt{25-4t^2} - 4t \cdot \frac{-4t}{\sqrt{25-4t^2}}}{\sqrt{25-4t^2}} = \frac{4(25-4t^2+4t^2)}{(25-4t^2)\sqrt{25-4t^2}} = \frac{100}{\sqrt{(25-4t^2)^3}}.$$

Ответ:  $\frac{4t}{\sqrt{25-4t^2}}$ ;  $\frac{100}{\sqrt{(25-4t^2)^3}}$ .

**260.  $m(x) = kx^2$ ;  $m(2) = 10$ ,  $10 = k \cdot 4$ ,  $k = 2,5$ .**

1)  $m(12) = 2,5 \cdot 144 = 360$ ;  $\rho(x) = m'(x) = 5x$ .

2)  $\rho(0) = 0$ ;  $\rho(12) = 60$ .



Ответ: 1) 360 г;  $5x$  г/см; 2) 0 г/см; 60 г/см.

**261.**  $\varphi(t) = kt^2$ ; при  $t = 8$  имеем  $\varphi(t) = 2\pi$ ,  $2\pi = k \cdot 64$ ,  $k = \frac{\pi}{32}$ .

Угловая скорость колеса равна:

$$\omega(t) = \varphi'(t) = \frac{\pi}{32} \cdot 2t = \frac{\pi}{16}t; \quad \omega(48) = \frac{\pi}{16} \cdot 48 = 3\pi.$$

**262.**  $x(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 t + x_0$ ,  $v_0 = 40 \text{ м/c}$ ,  $x_0 = 10 \text{ м}$ ,  $g = 10 \text{ м/c}^2$ ;

$$x(t) = -5t^2 + 40t + 10.$$

a)  $x(5) = -5 \cdot 25 + 40 \cdot 5 + 10 = 210 - 125 = 85 \text{ (м)}$ .

б) Тело в наивысшей точке при  $v(t) = 0$ ,

$$v(t) = x'(t) = -10t + 40, \quad -10t + 40 = 0, \quad t = 4\text{c};$$

$$x(4) = -5 \cdot 16 + 40 \cdot 4 + 10 = -80 + 160 + 10 = 90 \text{ (м)}.$$

**263.** Угловой коэффициент касательной  $-f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$ . Так как

$\alpha = 45^\circ$ , то  $\operatorname{tg}\alpha = 1$ , найдем  $x_0$ , в которой

a)  $f'(x_0) = 1$  и б)  $f'(x_0) = -1$ .

$$f'(x_0) = -x. \quad \text{а) } -x = 1, \quad x = -1, \quad f(-1) = -1,5; \quad \text{б) } -x = -1, \quad x = 1, \quad f(1) = -1,5.$$

Ответ: а)  $x_0 = -1$ , б)  $x_0 = 1$ ,  $M_1(-1; -1,5)$ ;  $M_2(1; -1,5)$ .

**264.**  $\operatorname{tg}135^\circ = -1$ .

$$f'(x) = 3x^2 + x - 1, \quad 3x^2 + x - 1 = -1, \quad 3x^2 + x = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = -\frac{1}{3}.$$

**265.**  $f'(x) = 3x^2 + x - 1$ ,  $3x^2 + x + 1 = 0$ ,  $D < 0$ , нет корней; угловой коэффициент касательной не обращается в ноль, касательная не параллельна оси  $Ox$ , поэтому пересекает эту ось.

**266.**  $f'(x) = 5x^4 + 2$ ;  $f'(x)$  принимает положительные значения при всех  $x$ , значит, угловые коэффициенты всех касательных положительны, все касательные образуют с осью  $Ox$  острый угол.

**267.**  $(x+2)^2 = 2-x^2$ ,  $x^2 + 4x + 4 = 2 - x^2$ ,  $2x^2 + 4x + 2 = 0$ ,  $x^2 + 2x + 1 = 0$ ,  $(x+1)^2 = 0$ ,  $x = -1$ ;

при  $x = -1$   $f(x) = g(x)$ , это и означает, что точка с абсциссой  $x_0 = -1$  есть общая точка для графиков этих функций. Запишем уравнения касательных и графиков этих функций в точках с абсциссой, равной  $-1$ .

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0.$$

$$f'(x) = 2x + 4, \quad f'(-1) = 2, \quad f(-1) = 1, \quad y_1 = 2(x+1) + 2 = 2x + 2 + 1 = 2x + 3;$$

$$g'(x) = -2x, \quad g'(-1) = 2, \quad g(-1) = 1, \quad y_2 = 2(x+1) + 1 = 2x + 3$$

$y_1 = 2x + 3$  и  $y_2 = 2x + 3$ . Графики имеют общую касательную.

## 24. Первообразная

**268.** а)  $F(x) = -4 \cos x + \frac{1}{3} \sin 3x + c$ ; б)  $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^{-4}}{4} + \frac{x^{3+\sqrt{3}}}{3+\sqrt{3}} + c$ ;

в)  $F(x) = 2x + 3 \ln |x-1| + c$ ; г)  $F(x) = \operatorname{tg} 2x - \operatorname{ctg} 3x + c$ .

**269.** Найдем  $c$ .

а)  $F(x) = 2 \ln |x| + c$ ,  $2 = 2 \ln \frac{1}{e} + c$ ,  $2 = -2 + c$ ,  $c = 4$ ;  $F(x) = 2 \ln |x| + 4$ ;

б)  $F(x) = -\frac{1}{x} + \sin x + c$ ,

$$-\frac{2}{\pi} = -\frac{1}{\frac{\pi}{2}} + \sin \frac{\pi}{2} + c, \quad -\frac{2}{\pi} = -\frac{2}{\pi} + 1 + c, \quad c = -1; \quad F(x) = -\frac{1}{x} + \sin x - 1;$$

в)  $F(x) = -\frac{1}{3x^3} + c$ ,  $-3 = -\frac{1}{24} + c$ ,  $c = -2 \frac{23}{24}$ ;  $F(x) = -\frac{1}{3x^3} - 2 \frac{23}{24}$ ;

г)  $F(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + c$ ,  $1 = -\frac{1}{2} \cos 0 + c$ ,  $1 = -\frac{1}{2} + c$ ,  $c = 1,5$ ;

$$F(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + 1,5.$$

**270.**  $f'(x) = 2x - 3$ ,  $f(x) = x^2 - 3x + c$ . Найдем  $c$ :  $f(2) = 2$ , откуда  $c = 4$ .

Ответ:  $f(x) = x^2 - 3x + 4$ .

**271.**  $F(x) = x^3 + C$ , значит при  $x = 2$  и  $y = 3$ . Получаем  $3 = 2^3 + C$ ,  $C = -5$ ;  $y = x^3 - 5$ .

**272.**  $x'(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$ , поэтому  $x(t) = -\frac{1}{4} \cos 2t + c$ .

$$3 = -0,25 \cos \frac{\pi}{2} + c, \text{ откуда } c = 3; \quad x(t) = -0,25 \cos 2t + 3.$$

## 25. Интеграл

**273.** а)  $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \cos(1,5\pi + 0,5x) dx = 2 \sin(1,5\pi + 0,5x) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} =$

$$= 2 \sin(1,5\pi + \frac{3\pi}{4}) - 2 \sin(1,5\pi + \frac{\pi}{2}) = -2 \cos \frac{3\pi}{4} - 2 \sin 2\pi = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 = \sqrt{2};$$

б)  $\int_1^2 (x^{-2} + x^2) dx = \left( -\frac{1}{x} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} + \frac{8}{3} + 1 - \frac{1}{3} = \frac{17}{6} = 2 \frac{5}{6};$

$$\text{в)} \int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} (\cos 3x - \sin 2x) dx = \left( \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) \Big|_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} = \\ = \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi}{6} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \sin \left( \frac{3\pi}{12} \right) - \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7}{12} - \frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4};$$

$$\text{г)} \int_{-5}^{-2} (5 - 6x - x^2) dx = \left( 5x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-5}^{-2} = -10 - 12 + \frac{8}{3} - (-25 - 75 + \frac{125}{3}) = \\ = -22 + \frac{8}{3} + 100 - \frac{125}{3} = 78 - 39 = 39.$$


$$\text{274. а)} \int_0^a \cos \frac{x}{2} dx = 2 \sin \frac{x}{2} \Big|_0^a = 2 \sin \frac{a}{2} - 2 \sin 0 = 2 \sin \frac{a}{2};$$

- 1) наибольшее значение: 2 при  $a = \pi + 4\pi n$  – интеграл равен 2,  
 2) наименьшее значение: -2 при  $a = -\pi + 4\pi n$  – интеграл равен -2.

$$\text{б)} \int_0^{a+\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x \Big|_0^{a+\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \left( \sin 2(a + \frac{\pi}{2}) - \sin 2 \cdot 0 \right) = \\ = \frac{1}{2} \sin(\pi + 2a) = -\frac{1}{2} \sin 2a;$$

- 1) наибольшее значение:  $\frac{1}{2}$ ;  $a = -\frac{\pi}{4} + \pi n$ ;  
 2) наименьшее значение:  $-\frac{1}{2}$ ;  $a = \frac{\pi}{4} + \pi n$ .

**275. а)**





Пределы интегрирования:

$$0,5x^2 - 2x + 3 = 7 - x, \quad 0,5x^2 - 2x + 3 + x - 7 = 0, \quad x^2 - 2x - 8 = 0, \quad x_1 = -2, x_2 = 4;$$

$$S = \int_{-2}^4 (7-x)dx - \int_{-2}^4 (0,5x^2 - 2x + 3)dx = \left(7x - \frac{x^2}{2}\right) \Big|_{-2}^4 - \left(\frac{x^3}{6} - x^2 + 3x\right) \Big|_{-2}^4 = \\ = 28 - 8 + 14 + 2 - \left(\frac{64}{6} - 16 + 12 + \frac{8}{6} - 4 + 6\right) = 10;$$

б)  $S = \left(4x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_0^2 - \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x\right) \Big|_0^2 = \\ = 8 - \frac{8}{3} - \left(\frac{8}{3} - 8 + 8\right) = 8 - \frac{16}{3} = 2\frac{2}{3};$


в) Пределы интегрирования:



$$x^2 - 3x + 4 = x + 1, \quad x^2 - 4x + 3 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 3;$$

$$S = \int_1^3 (x+1)dx - \int_1^3 (x^2 - 3x + 4)dx = \left(\frac{x^2}{2} + x\right) \Big|_1^3 - \left(\frac{x^3}{3} - 3\frac{x^2}{2} + 4x\right) \Big|_1^3 = \\ = \frac{9}{2} + 3 - \frac{1}{2} - 1 - \left(9 - \frac{27}{2} + 12 - \frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 4\right) = 6 - 4\frac{2}{3} = 1\frac{1}{3};$$

г) Пределы интегрирования:




$$x^2 - 2x + 2 = 2 + 4x - x^2, \quad 2x^2 - 6x = 0, \quad 2x(x-3) = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 3;$$

$$S = \int_0^3 (2+4x-x^2)dx - \int_0^3 (x^2-2x+2)dx = \left(2x + 4x^2 - \frac{x^3}{3}\right)_0^3 - \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 2x\right)_0^3 = \\ = 6 + 18 - 9 - (9 - 9 + 6) = 15 - 6 = 9.$$

Ответ:  $S = 9$ .

**276.**



$$S_1 = \int_{-4}^4 8dx - \int_{-2}^4 (x+4)dx = 8x \Big|_{-4}^4 - \left(\frac{x^2}{2} + 4x\right) \Big|_{-2}^4 = \\ = 32 + 32 - (8 + 16 - 2 + 8) = 64 - 30 = 34;$$

$$S_2 = \int_{-2}^4 (x+4)dx - \int_{-2}^4 \frac{1}{2}x^2dx = 30 - \left(\frac{x^3}{6}\right) \Big|_{-2}^4 = 30 - \left(\frac{64}{6} + \frac{8}{6}\right) = 30 - 12 = 18;$$


$$S_3 = \int_{-4}^{-2} \frac{1}{2}x^2dx = \frac{x^3}{6} \Big|_{-4}^{-2} = -\frac{8}{6} + \frac{64}{6} = \frac{56}{6} = 9\frac{1}{3};$$

$$S_{\text{I части}} = 34 - 9\frac{1}{3} = 24\frac{2}{3}, S_{\text{II части}} = 18.$$

**277.** Уравнение касательной:

$$y' = 2 - x,$$


$$y'(3) = -1, \quad y(3) = 4, \quad y = -1(x-3) + 4 = -x + 7.$$



$$\begin{aligned}
S &= \int_{-1}^3 (-x+7)dx - \int_{-1}^3 (2,5+2x-0,5x^2)dx = \left( -\frac{x^2}{2} + 7x \right) \Big|_{-1}^3 - \\
&- \left( 2,5x + x^2 - \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{-1}^3 - \frac{9}{2} + 21 + \frac{1}{2} + 7 - \left( 7,5 + 9 - \frac{9}{2} + 2,5 - 1 - \frac{1}{6} \right) = \\
&= 24 - 13 \frac{5}{6} = 10 \frac{1}{6} \text{ (кв.ед.)}.
\end{aligned}$$

**278.** Уравнения касательных:

$$y'(x) = 2x - 4, \quad y'(1) = -2, \quad y(1) = 2, \quad y_1 = -2(x-1) + 2 = -2x + 2 + 2 = -2x + 4;$$



$$\begin{aligned}
S &= \int_1^3 (x^2 - 4x + 5)dx - \int_1^2 (2x + 4)dx - \int_2^3 (2x - 4)dx = \left( \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 5x \right) \Big|_1^3 - \\
&- (-x^2 + 4x) \Big|_1^2 - (x^2 + 4x) \Big|_2^3 = 9 - 18 + 15 - \frac{1}{3} + 2 - 5 - (-4 + 8 + 1 - 4) - \\
&- (9 - 12 - 4 + 8) = 2 \frac{2}{3} - 1 - 1 = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$


**279.**

Введем систему координат так, что вершина параболы проходит через точку  $(0; 0)$ , и уравнение парабола

$$y = kx^2, \quad k = \frac{4}{a}; \quad y = \frac{4 \cdot x^2}{a};$$


$$S_1 = 2 \int_0^{a/2} \frac{4}{a} x^2 dx = \frac{8}{a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{a/2} = \frac{8}{a} \cdot \frac{a^3}{8 \cdot 3} = \frac{a^2}{3};$$

$$S_2 = a^2 - \frac{a^2}{3};$$



$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{a^2}{3} \cdot \frac{3}{2a^2} = \frac{1}{2}.$$

**280.**



$$S = \int_0^2 (x^2 + 4x + a) dx - S_{OABC} = \left( \frac{x^3}{3} + 2x^2 + ax \right) \Big|_0^2 - 4 = \\ = \frac{8}{3} + 8 + 2a - 4 = 2a + \frac{20}{3}, \text{ значит, } 2a + \frac{20}{3} = 12, \text{ поэтому } a = \frac{8}{3}.$$

**281.**

$$f'(x) = a \cdot \pi \cos \pi x;$$

$$\int_0^2 (a \sin \pi x + b) dx = \left( -\frac{a}{\pi} \cos \pi x + bx \right) \Big|_0^2 = -\frac{a}{\pi} \cdot 1 + 2b + \frac{a}{\pi} = 2b.$$

$$f'(2) = 2, \quad 2 = a \pi \cos 2\pi, \quad 2 = a\pi, \quad a = \frac{2}{\pi}.$$

$$\int_0^2 f(x) dx = 4, \quad 2b = 4, \quad b = 2. \quad \text{Ответ: } a = \frac{2}{\pi}, \quad b = 2.$$